# No. 25.

# HAUPTPREISCOURANT

UND

# Jubelkatalog

DER

## Treibegärtnerei & Baumschule

zu PLANITZ bei Zwickau in Sachsen.

**Herausgeber**

G. Geitner,

Besitzer des Etablissements, Ehren- & correspondirendes Mitglied mehrerer naturwissenschaftlichen Vereine.

**1862 — 1864.**

Die nächste Publication erfolgt Ende Juni und wird ausser den best renommirtesten **Holländer Blumenzwiebeln** die inzwischen erworbenen Neuheiten und eingetretenen Preisermässigungen enthalten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, und in Zwickau durch die, der Herren Gebrüder Thost.

# Allgemeine Bemerkungen.

**Wer nicht selbst von diesem Preis-Courant Gebrauch machen kann, verbindet mich durch Verbreitung desselben im Kreise seiner Freunde zu besonderem Dank.**

Die Preise sind in Preuss. Courant: 1 Thlr. = 30 Ngr. 4 Thlr. = 7 fl. rhn., österr. Fl. zu 16 Ngr., Gold nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. avancire ich durch die Post. **Ziel 3 Monat.** Aufträge von unbekannten Bestellern bleiben, ohne beigefügten Betrag (oder Rimesse auf gute Häuser und Plätze) stets unberücksichtigt. **Aufträge und Geldsendungen werden franco erbeten; ebenso deutliche Namensunterschrift.**

Der Transport der Waaren geschieht **stets und ohne Ausnahme (also auch da, wo ausnahmsweise die Bahnen, sich gegenüber, das Gegentheil bescheiniget verlangen), auf Kosten und Gefahr der Empfänger. Reclamationen sind nur unmittelbar nach Empfang der Sendung zulässig.** Colli's unter 10 Pfd. werden der Post, darüber der Eisenbahn direct (also ohne Vermittelung eines Spediteurs) zur Beförderung als Eilgut übergeben. **Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe der, dem Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, wo eine Spediteurvermittelung nothwendig oder gewünscht wird, Aufgabe einer betreffenden Firma.** Zur Beschleunigung der Effectuirung ist es erforderlich, die Commission auf ein besonderes Blatt zu verzeichnen.

---

## Zeichenerklärung.

Nachstehende öfters hier vorkommende Zeichen bedeuten: **r.** rankend, **z.** zwiebelartige, **k.** knollige, **b.** im Freien ausdauernd, **e.** unter Decke, **f.** auf Sommergruppen, *gigantische Form, † grosse Blattform.

---

## Einiges über die Behandlung frisch angekommener Pflanzen.

Weitere Reisen, plötzlich eintretende Kälte, meist aber verfehlte Behandlung nach dem Auspacken der Pflanzensendungen — rauben oft das Beste! es mögen daher nachstehende Andeutungen dem weniger Eingeweihten zum Anhalt dienen.

Bei gut ankommenden Sendungen halte ich sofortiges Verpflanzen für sehr gerathen, und selbst kalten Pflanzen, wird dann ein wenig Bodenwärme und gesperrte feuchte Luft dienlich sein. Für kranke Pflanzen ist die erste Bedingung: kein Luftzug, wenig Bodenwärme, feuchte Atmosphäre, nothdürftiges Giessen, keine Sonne, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf Anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Sauggefässe erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reicherem Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Gehölzsendungen dürfen, wenn sie ausgefroren ankommen, an keinen Ort gebracht werden, der mehr als 4—6° R. Wärme hält. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte Vorwurf unterbleiben!

Erfahrungen traurigster Art, sowohl für mich, als auch für die resp. Herren Besteller machen es unumgänglich, bei Aufträgen aus fernen Landen, und von noch neuen Geschäftsfreunden, **der Durchsicht vorstehender Bemerkungen volle Aufmerksamkeit zu widmen.**

# Vorwort.

Wie immer dieser Abschnitt einem Rückblick aufs vergangene Jahr gewidmet war, so auch in diesem! Bisher wurden die meisten Opfer dem inneren Ausbau, d. h. der Complettirung der Sammlungen zugewendet, dies Jahr noch ausserdem der Umgestaltung und Erweiterung des Ganzen. Das Etablissement hat sich in demselben mit Ausschluss der Baumschule um's Doppelte in seinem Flächenraum erweitert, aber auch sonst sein Aeusseres so zum Vortheil verändert, dass die an Zeit und Geld gebrachten Opfer augenfällig sind. Da, wo das immerhin unerlässliche Erdmagazin den oberen Eingang verunzierte, hat eine nette Anlage Platz genommen, die in Mitten gelegene Eingangstreppe ist vermauert und dafür noch ein Eingang am unteren Ende geschaffen, der beengende Zaun ist auf der Südseite (cca. 600 F. Länge) gefallen, was wenig bedeuten würde, wenn dahinter ein nur in Cultur zu nehmendes Stück Land aufs Neue zu verzäunen gewesen. So aber wurde dort früher der, jede Culturfähigkeit zerstörende Kohlenbergbau betrieben, was an jener Stelle um so bleibendere Spuren hinterliess, als die Kohlen zu Tage gelegen, so dass der Abraum mit seiner geringen Erddecke die durch den Abbau entstandenen Untiefen füllen helfen musste und nur Hügel sowie Tiefen mit Kohlenabraum und Letten vermengt, den Platz erfüllten, der nun von regelrechten Wegen und Staudenquartieren durchschnitten wird. Hatte es schon seine Schwierigkeit, das Ganze nur in betriebsfähige Lage zu bringen, dann aber ausreichend mit Humus zu bedecken, wobei die ganzen Ersparnisse zweier Decennien fast spurlos verschwanden, so gab es in der ganzen. jetzt durch 6 und 8 Ellen hohe Böschungen bezeichneten Grenze entlang, Hügel von oft mehr als 6 Ellen Höhe und 20 Ellen Breite abzutragen, dazu meist in Grauwacke, einer der schwerst zu bearbeitenden Bodenarten. Ist nun schon vor 10 Jahren Hand angelegt worden, diese Fläche mindestens dem Feldbau dienstbar zu machen, so gehörte in diesem, immer noch die Arbeit von meist 14 Mann während 5 Monaten dazu, das Werk zu vollenden.

Haben wir hiermit angedeutet, dass das verflossene Jahr, wenn auch reich an Resultaten — denn auch die Sammlungen sind reicher an Species und Seltenheiten geworden, wie z. B. Cycasstämme von 9 & 10 Fuss Höhe belegen — so doch ein Jahr voller Mühe, Arbeit und immensen Opfern gewesen, so sei uns gestattet, dies Mal einen noch weiteren und wichtigeren Rückblick zu halten, denn es sind nun

**fünfundzwanzig Jahre,**

dass die zu jener Zeit aus einem kleinen holländer Kasten und angebautem Gärtnerhäus'chen bestandene Versuchsstätte sich zu dem emporarbeitete, was sie jetzt ist.

Es ist sattsam bekannt, dass meinem seligen Vater weil. Dr. E. A. Geitner das Verdienst gebührt, vor also nun 25 Jahren, die der Erde nutzlos entströmenden Dämpfe der Gartenkunst dienstbar gemacht zu haben; sowie dass ich um dieselbe Zeit ihm und seinen Ideen zu Liebe dies Fach ergriff; über das Ganze aber existirt meist nur Unzusammenhängendes! Den vielen Freunden und Gönnern meiner Anstalt dürfte daher die Kunde doppelt angenehm sein, dass gleichzeitig mit diesem Jubelcatalog ein Wegweiser durch die Treibegärtnerei und Baumschule (im Verlage des schon durch sein trefflich colorirtes Werk „Album sächsischer Industrie“ rühmlichst bekannten Louis Oeser in Neusalza) erscheint. Dessen Inhalt führt uns an der Geschichte des Brandes und der des Gartens vorüber, und schliesst mit einer erklärenden Führung durch die

Treibegärtnerei und Baumschule, während 7 trefflich colorirte Tafeln die Ansichten von Garten und Baumschule, drei Grundpläne beider, ferner einen Flötzdurchschnittsplan, der die Lagen des Gebirges, bis auf den Herd des Feuers veraugenscheinlicht, sowie endlich ein zu Bruch gegangenes zerklüftetes Brandschieferflötz darstellen. Letzteres um anschaulich zu machen, in welcher Weise die mehrere 100 Ellen vom Garten durch Wassereinfall durchs Feuer erzeugten Wasserdämpfe demselben zugeführt werden. Das Portrait des Gründers ist dem Texte beigedruckt, auch ein Gartenplan aus dem Jahre 1839 beigegeben. Den in Oelfarbendruck ausgeführten Umschlag zieren die beiden grössten Palmenstämme des Etablissements, während dessen Rückseite die so seltene Ouvirandra schmückt, die bekanntlich durch mich auf dem Continent zuerst vermehrt und verbreitet wurde.

Es hiesse dem Werkchen vorgreifen, wollten wir uns weiter darüber verbreiten, wir können es allen Freunden und Gönnern der Anstalt um so mehr empfehlen, als nach Inhalt und Ausstattung der dafür geforderte Preis von 15 Ngr. ein verhältnissmässig geringer ist.

Mit der Bitte, mir auch im neuen Zeitabschnitt Ihr ehrendes, aufmunterndes Wohlwollen zu erhalten — ohne welches es mir nicht möglich sein würde, das mir vorgesteckte Ziel auch nur zu verfolgen — scheidet

Hochachtungsvollst

G. Geitner.

---

# Subscriptions-Eröffnung

über

# zwei hier gezüchtete brillante Neuheiten.

---

### Cupressus Lindleyana W. B. albis spiculis Gtn.

Unter mehr als 6000 Sämlingen zeigte sich obige Form so auffällig, dass sie schon als kleine Samenpflanze bemerkt wurde; man denke sich diese ohnehin graziöse Species, dazu die jungen Triebspitzen im reinsten Weiss, die, je nachdem sich die einzelnen Blättchen mehr und mehr ausbilden, dieselben nicht nur mit weissen Spitzen erscheinen lassen, sondern oft noch als weisse Einfassungen zu beiden Seiten bis herab zur Basis laufen.

1 nette vorjährig veredelte und verzweigte Pflanze 3 Thlr.
6 — — — — — Pflanzen 12 „

### Rosa canina L. foliis variegatis Gtn.

Wer in der Letztzeit meine Baumschule sah, wird bezeugen können, dass mehr denn 25,000 Sämlinge im besten Wachsthum stehen, und unter diesen beobachtete ich lange Zeit einen, dem ich mich endlich bewogen fand, obigen Namen beizulegen. Nicht ein rein grünes Blatt zeigte sich, ja viele fast rein weiss oder gelblich, die meisten aber ganz gescheckt; dass sie bei ihrem sonst robusten Wuchs eine ausgezeichnete Acquisition für Anlagen sein wird, steht wohl jetzt schon fest. Ausgabe im Juni. 1 im Frühjahr veredelte Pflanze 2 Thlr.

Beide Neuheiten à 1 Exemplar 4 Thlr.

# Warmhauspflanzen.

Thlr. Ngr.

**Acacia arabica** *W.* . . . — 20

— **tortuosa** *W.* . . . — 20

**Achyranthes porrigens** *Jacq.* — 5

**Adamia cyanea.** *Wall.* . . . — 8

— **versicolor** *Fortune* . — 10

Schöner Blumenschmuck und frühes, dankbares Blühen empfehlen diese Pflanze.

**Allamanda cathartica** *L.* . r. — 10

— **nerifolia** *Ad. Brogn.* r. — 10

— **verticillata** *Desf.* r. — 10

Wegen leichter Cultur und dankbarem Blühen wird diese Gattung viel gesucht; überraschend wird der Effect, wenn sie ausgepflanzt werden kann.

**Ampelopsis texana.** *Hort.* . — 10

**Ardisia acuminata** *W.* . . . — 15

— **complanata** *Wall.* . — 20

— **crenulata** *Vent.* . — 5-10

— — **fructu albo** — 10

— **hymenandra** *Wall.* . $\frac{1}{3}$-1 —

— **punctata** *L.* . . . — 25

— **solanacea** *Roxb.* . 1 —

Ardisia crenulata und fr. alb. bedeckt mit rothen oder weissen Früchten zählen zu den beliebtesten Zimmerpflanzen; hymenandra ist eine ausgezeichnet schöne Blattpflanze.

**Argyreia argentea** *A. Chois.* r. — 5

Schön geformtes Blatt mit silberweisser Rückseite.

**Aristolochia caudata** *L.* . . r. — 10

— **fimbriata** *Cham.* . r. 1 —

— **gigas** *Hartw.* et. *Skir.* — 5

— **picta** *Karst.* . . r. — 8

— **saccata** *Wall.* . r. — 10

Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Formen und buntes Colorit der Blumen, fimbr. durch das der Blätter aus.

**Aristolochia spec. e. Brasilia** r. — 20

Als sehr schön und grossblättrig bezeichnet.

**Artocarpeae spec. e. Surinam** 3 —

Blätter fusslang herabhängend, eine Prachtpflanze.

**Asclepias curassavica** *L.* . *f.* — 5

Im Sommer, ins Freie ausgepflanzt, sind bis Herbst grosse Büsche, bedeckt mit gelben und hochorange Blüthenbüscheln.

**Astrapaea Ameliae** *Hort. v. H,t.* — 15

† — **mollis** *Hrt.* . . . . —10-20

* — **Wallichii** *Lindl.* . . $\frac{1}{2}$-1 —

Ausserdem besitze ich eine sehr grosse und schöne Pflanze von 16 Fuss Höhe und 10 Fuss Kronendurchmesser, welche alljährlich kostbar blüht. — Preis 25 Thlr.

**Balsamina latifolia** *D. C.* . — 10

**Bambusa bistorta** . . . — 20

— **fol. aur.** *var.* . . 1 —

Thlr. Ngr.

**Bambusa Metake** *Sieb.* . . — 10

— **mitis** . . . . . — 20

— **spinosa** *Hamilt.* . . — 20

— **scriptoria** . . . — 20

— **spathiflora** . . — 20

— **variegata** *Hort.* . 1 —

— **verticillata** *W.* . 1 —

**Banisteria argentea** *Sp.* (Heteropsis *H. B. K.*) . . r. — 10

**Barbacenia hybrida** *Ant.* . — 15

**Barringtonia acutangula** *G.* (Eugenia acutangula *L.* racemosa *Roxb.* Stravadium rubrum *P.* coccineum *D. C.*) Columb. 3 —

**Barnadesia floribunda** *Hort.* . — 5

— **grandiflora** *Hort.* . — 8

— **rosea** *Lind.* . . — 5

Dankbare Winterblüher.

**Bauhinia anatomica** H. Angl. *Lk.* r. 1 —

Gehört mit ihren nach den verschiedensten Richtungen hin ausgeschnittenen Blättern zu den orginellsten Blattpflanzen.

**Bignonia Carolinae** *Lindl.* r. — 5

— **grandiflora** *Jacq.* . r. — 10

— **speciosa** *Ldl.* (picta *Hook.*) r. — 8

— **Tweediana** *Lindl.* . r. — 10

**Biophytum sensitivum** *D. C.* — 10

Dieses kleine Pflänzchen ist ein Seitenstück zu Mimosa pudica; nur legt sie bei der Berührung ihre Blätter rückwärts zusammen; aber auch der ganze Bau der Pflanze ist orginell, denn die mehrere Zoll langen, gefiederten Blättchen stehen schirmartig im Kreise um das Stämmchen.

**Blighia sapida** *Koenig* . . 4 —

**Blumea balsamifera** *Dcsne* . 1 15

Auffallend durch raschen Wuchs und stattliche fusslange Blättter.

***Bonapartea juncea** *Ruiz.* et *Pav.* (Littaea geminiflora. *Brign.* Agave) . . . . . . . 3 —

***Brexia chrysophylla** *Swt.* . — 20

* — **madagascariensis** *Ker.* — 20

* — **serrata** *Lindl.* . . — 20

* — **umbellata** *Hort.* . . 1 —

Sie zeichnen sich durch Form und Haltung der Blätter aus, die der chrysophylla sind zart colorirt.

†**Brownea coccinea** *Jacq.* . 1-2 —

† — **erecta** *Hort.* e(Theophrasta pinnata *Jacq.*) . . 10 —

† — **grandiceps** *Jacq.* . 10 —

— **arhiza** . . . 8 —

† — **latifolia** *Jacq.* . . 5 —

— **leucantha** *Jacq.* . 3 —

† — **prinzeps** *Hort.* . . 10 —

Während des Triebes der B. sind Farbe, Form und Haltung der Blätter höchst originell und werden stets die grössten Zierden unserer Häuser bleiben.

Thlr. Ngr.

Brucelia violacea *Hort.* (Phytolacca) . . . . . — 5

Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Cultur, mit fusslangen rothem Blüthenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.

Bruckea grandiflora *Hort.* . . — 15
Brugmansia arborea *P.* fl. pl. (Knightii) . . . — 8
— suaveolens *H. B. K.* var. arbuscula . . . — 8

Blüht als kleine Pflanze; der ganzen Gattung wird bei weiten die verdiente Aufmerksamkeit noch nicht zugewendet.

Bryophyllum calycinum *Salisb.* — 5

Höchst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.

Bryophyllum proliferum *Hort. angl.* 1 —
Buddlia macrantha . . . — 10
Buginvillea spectabilis *Juss.* r. (bracteata *P.* — brasiliensis *Rausch* — Josepha augusta Arabida) . . . — 10

Blühend eine der prachtvollsten Pflanzen, bedarf jedoch zum Blühen magrer Cultur.

†Calodracon heliconiaefolium *Planch.* (Cordyline *Otto* et *Dietr.* Dracaena brasiliensis *Hort.* Cord. Eschscholziana *Mart.*) . 1/6-1 —
† — Jacquinii *Planch* var. atrosanguineum *Goepp.* (Drac. ferrea *L.*) . . . . 1/6-1 —
† — variegatum *Goepp.* (Drac. terminalis var. purpurea *Hort.* 1/4-1 —
† Siebodii *Plansch.* (Drac. nobilis et Sieboldii *Hort.* 1/8-2 —

Unter den alten Namen Dracaena, die dauernsten beliebtesten Zimmerpflanzen.

Campylobotrys smaragdina . 1 15
Canarina Campanula *L.* . r. — 15

Schön eigenthümlich roth blühende Schlingpflanze.

Capparis calophylla . . . 1 —
†Carolinea fastuosa *Sesté* . . 3 —
Cassia laevigata *C. W.* (grdifl. *Dsf.*) . . . . . . — 10
†Cecropia palmata *W.* . . . 1 —
— peltata *L.* . . . 1-3 —

Mit gefingerten Blättern und fast schneeweisser Rückseite, während die Blattrippen bei jungen Blättern rothbraun sind.

Centrostemma floribunda *Hort.* — 10
— Lindleyana *Desn.* — 10
Cephallotus follicularis *La Bill* 8 —

Diese kleine originelle Schlauchpflanze legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schläuche rings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.

Cerbera Ahovai *L.* . . . — 15
Cereus flagelliformis *Mill.* . — 10
— grandiflorus *Mill.* . — 15
— peruvianus monstrosus *D. C. L.* (heptagonus *Hort.* — 15
— triangularis Haw. *L.* . — 15

Thlr. Ngr.

Ceropegia elegans. *Wall.* . . r. — 10

Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelienblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle diese Ceropegie.

Charlwoodia angustifolia *Miq.* (ensifolia *Hort.*) . — 15
— cannaefolia *Brown.* . 1 —
— congesta *Sweet.* (Arista *Hort.* Drac. *Swt.* Cordyline *Knth.*( . . — 5-10
† — longifolia *Goepp.* Cordyline *Hort. Belg.*) . — 10
† — rubra *Planch.* (Cord. *Hüg.*) — 5-10
† — spectabilis *Planch.* (Cord. *Knth.* et *Bouché.* Cord. dracaenoides *Knth.* Dracaena stricta *Hort. B.* del. splendens *Hort.*) . — 15
— stricta *Hort. Berol.* (Drc. *bot. Mag.* Cordyline stricta *Knth.*) . . . . — 10

Zur Zimmerdecoration empfehlen sie sich besonders durch Dauer und Schönheit der Formen und wie oben meist unter Dracaena bekannt.

Chlorophytum Orchideastrum *Ldl.* — 5
— Sternbergianum *Stendel.* (Cordyline vivipara *Hort.*) . . . . — 5-10

Eine sehr eigenthümliche doch wegen ihrer Dauer sehr beliebte Ampelpflanze, wie die Erdbeere rankend und an diesen, junge Pflänzchen bildend.

*Cineraria spec.? (var. Senecio?) — 20

Eine prächtige Blattplanze.

Cinnammomum eucalyptoides *N.* ab *Esb.* . . 1 —
— sericeum *Sieb.* . 4 —

Die übrigen s.: technische Pflanzen.

†Cissus discolor *Blume* (marmorea *Hort.*) . . r. — 5-10

Ihr Ruf ist ein so anerkannter, dass sie, obwohl zu Tausenden verbreitet, immer mehr Gönner wirbt; denn selbst im gewöhnlichen Zimmern verliert sie kaum von ihrem prachtvollen Colorit.

— spec. e Surinam . r. — 15

Sehr stark rankend.

— velutina *h. Belg.* . r. — 5
Citharexylon quadrangulare *L.* — 10
Clerodendron capitatum *Schum.* — 15
— emirnense *Hook* (— floribundum *Ldl.* non *R. Br.*) — 5
— foetidum Bunge (Cl. Bungei *Steud.*) . . — 5-10
— fortunatum *L.* . . — 20
— fragrans *W.* (Volkameria fragrans *Vent.* — Volkmannia japonica *Jacq.* . — 5
— var. purpurea simplex — 5
— glaucum *Wall.* . . — 8
† — hastatum *Wall.* . — 10
— Kaempferi *Siebold.* . 1 —
— laevifolium *Bl.* . — 10
— ligustrinum. *R. Br.* . — 5
— paniculatum *L.* (pyramidale *Andr.* . . . — 15
— sinense *Hort.* ? . . — 8

Thlr. Ngr.

Clerodendron squamatum *Vahl.* (speciosissimum Baxt) — 20
— tomentosum *R. Br.* . — 10
— villosum *Bl.* (infortunatum *Dennst.* non *L.*) — 10
— volubile *P. B.* . . . — 8

Im Winter stelle man sie sämmtlich trocken (selbst wenn sie die Blätter werfen) und kühl, lasse sie ordentlich ruhen, und man wird sich im Sommer durch deren Blüthenpracht reich belohnt finden.

Clitoria dichotoma *Hort.* . r — 15

Eine ausgezeichnete Schlingpflanze, die selbst ganz jung schon durch ihre eben so schönen als originellen Blumen einen hohen blumistischen Werth hat.

†Clusia spec. Columb. . 6 —

Schon ausgezeichnet als Decorationspflanze.

†Coccoloba excoriata *L.* . . — 20
† — macrophylla *Desv.* . 2 —
* — pubescens *L.* . . 8 —

Gehören unstreitig zu den imponirendsten Blattpflanzen.

†Coleus Blumei *Benth.* (Plectranthus versicolor Pl. scutellarioides *Bl.*) . . . — 6
— Persoonii *Benth.* . — 5

Vorstehende Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.

†Colea floribunda Boj. *Lindl.* 5 —
rCombretum adenophyllum *Mart.* 1 —
— argenteum *Wall.* . r — 8
— purpureum *Vahl.* . r — 15
Conocarpus nauclecaefolius . 1 —
Convolvulus pentanthus *Jacq.* r — 5
— scaber *Hort.* . . r — 10
†Cordyline arborea *Goepp.* (Dracaena *Lk.* Aletris arborea *Willd.*) vera! . . . . 5 —
— arborea *Hort.* . . . 1/6-1 —
— australis *Bth.* (Dracaenopsis *Bl.* Dracaena *Hk.*) . . 1/3-1 —
— cannaefolia *R. B.* . . 1 —
— concinna *Hort.* . . . 2-4 —
† — Fontanesiana *Planch.* (Dr. elliptica *Desf.* Drac. nigra *Hort.* Drac. Fontanesiana *Schott.*) . . . . . — 15
† — fragrans *Planch.* (Drac. fragrans *Ker.* Aletris arbor. *L.*) . . . . . . 1/3-3 —
† — fruticosa *Goepp.* (Drac. fruticosa h. *Berl.* Dr. excelsa *Ten.*) . . . . . — 20
* — indivisa *Steud.* (Dr. *Forst.* Charlw. *Swt.*) . . . 6-10 —
† — marginata *Goepp.* (Drac. marginata *Lam.* Drac. tessellata *Willd.* Drac. mauritiana *Hort.* Drac. gracilis *Hort.*) 1-2 —
† — reflexa *Planch.* (Dracaena *Lam.* Drac. purpurea & cernua h. *Berol.*) . . . — 10
† — salicifolia *Goepp.* (Dr. linifolia et salicifolia *Hort.* Dr. pumila *Hort.*) . . — 5-10
*Cordyline umbraculifera *Goepp.* (Dr. umbraculifera *Jacq.*) . 3-5 —

Aus unsern beliebten Dracaenen sind meist Cordylinen, Charlwoodien und Calodracon geworden. Sie sind und bleiben demungeachtet unsere unentbehrlichsten Decorationspflanzen. Im düstersten Winkel des Blumentisches halten sie Jahre lang unverdrossen aus.

Corynocarpus laevigatus *Forst.* 1 —
*Crescentia montana h. Columb. 2 —
Croton pictum *Hort.* (Codiaeum chrysostictum *Sprgl.* Cod. pictum *Hook.*) . . — 10

Dunkelgrüne Blätter mit hellgrünen Blattrippen und lichten Blattstielen machen sie zu einer effectvollen Blattpflanze.

— variegatum *Hort.* . — 20
*Curculigo recurvata *Dryand* — 5-10
* — Summatrana *Roxb.* . — 10-20

Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer und palmenartigen Wuchses wegen unentbehrlich.

Crytoceras Gibsoni *Hort. Angl.* (Hoya *Hort.*) . . . — 8
— laevis . . . . — 20
Cyanophyllum magnificum . 2 —
Cyperus elegans *Vahl.* . — 5
F — Paramatta *Mart.* spectabilis *Lk.*) . . . — 10
— surinamensis *Roxb.* — 5
Dalbergia scandens *Roxb.* . r 1 —
Desmodium gygrans *DC.* . 1 —

In ihr besitzen wir das grösste physiologische Räthsel der gesammten Pflanzenwelt; denn mögen andere Pflanzen noch so empfindlich gegen äussere Einflüsse sein, so ist es die hier noch nicht erklärte Kraft, welche die Blätter dieser Pflanze auf-, ab- und seitwärts sich bewegen lässt, so lange es tagt, — während sie des Nachts, wie erschöpft vom Tagewerk, — die Blättchen rückwärts herabhängend — auszuruhen scheinen.

— molle . . . . — 15
†Dichorisandra ovalifol. *Prest K.* — 10
† — ovata *Mart. K.* . . . — 10
— pumila *Hort.* . . 1 —

Die ganze Gattung zeichnet sich nicht nur durch schöne, theilweise mit seltenem Colorit überzogene Blätter, sondern auch, durch effectvolle Blumen aus.

Dichromena puberula . . — 5

Sehr zierliches Ampelgewächs.

Dictyanthus campanulatus *Rchb.* (D. Pavoni *Desn.*) . . r — 10

Hält in Bezug auf seine Blüthen einen Vergleich mit den originellen Stapelien aus, ohne deren keineswegs angenehmen Geruch zu besitzen.

*Dillenia speciosa *Thunb.* . 1 15

Eine der ausgezeichnetsten Blattpflanzen.

Dionaea Muscipula *Ellis.* . 1/2-3 —

Wem wäre nicht diese zierliche, wunderbar ausgerüstete „Fliegenfalle der Venus“ bekannt? Ein Wunder der Schöpfung! Wie mir selbst viele Damen

Thlr. Ngr.

versichern, die nobelste, zierlichste und interessanteste Nipptischpflanze, welche existirt, und im Zimmer cultivirt nur einer kleinen Glasglocke und eines Untersetzers bedürfend, um die zu ihrem Gedeihen nöthige regelmässige Feuchtigkeit zu erhalten. Ich kenne solche Pflanzen, die auf diese Weise Jahre lang sich hielten, und selbst bei Solchen, die nicht zu Pflanzenfreunden zählen, Beifall und Staunen erwecken.

Dioscorea alata *L.* . . . *r* — 5
— discolor *Otto.* (vera) *r k* — 10

Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur, üppiger Wuchs und das bunte Colorit empfehlen sie; die letztere rankte im Palmenhause in einem Holzkasten gepflanzt, in wenig Wochen 24 Fuss hoch, zeugte auch ellenlange weitverzweigte Blüthentrauben und erregte allgemeine Bewunderung.

Dipladenia urophylla *Hook.* (Echites *Hook.*) . . . *r* — 15
Disandra prostrata *L.* . . . *r* — 5
Dolichos giganteus *Hort. v.* — 10
Dorstenia arifolia *Lam.* . — 15
— Ceratosanthes *Lodd.* — 20
— — var. Riedeliana *Rgl.* — 20
— Contrayerva *L.* . — 15

Höchst originelle Blüthen.

Doryanthes excelsa *Corr.* . 3 —
†Dracaena Boerhavii *Ten.* . 2-4 —
— Draco *L.* (yuccaeformis *Vand.* canariensis *Hort.*) Sämlinge . . . 3 —
— Lenneana *Fintelm.* . 4 —
Drymispermum laurifolium *Dcsn.* (Dristubiosa *Dcsn.*) . 3 —

Verdient alle Aufmerksamkeit, denn die prächtig carminrothen Früchte halten sich lange Zeit, wie bei den Ardisien.

Duranta Ellisi *L.* . . . . — 5
Echinolaena polystachya *H. K.* — 10

Hübsche Ampelpflanze.

Echites difformis *Wall.* (Buddlia) *r* — 10
* — melaleuca (picta) *Hort.* *r* — 8-12
— nutans *Anders.* . *r* — 15
— purpurea *Hort.* (Tylophora flavescens *Hort.* lutescens *Dcsn.*) . . . . *r* — 10
— sinensis *Hort.* . . *r* — 10

Mehrere Echites zeichnen sich durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber E. nutans, auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut gezeichnet erscheint, wogegen sinensis geeignet ist, in kurzer Zeit die grössten Wandflächen mit seinem dichten massigen Laubwerk zu bedecken.

Elaeocarpus cyaneus *Sims.* 1 15
†Elephantopus sp. Grossblättrige Blattpflanze . . . . 2 —
Epiphyllum Altensteini *Pfeiffr.* — 8
— truncatum *Haw.* . — 8
— — *Haw.* var multiflorum 10
Eugenia rubricaulis . . — 25

Thlr. Ngr.

Euphorbia fulgens *Karw.* (jacquiniaeflora *Hort.*) . . — 10
— meloniformis *Ait.* . — 20
† — pulcherrima *W.* (Poinsettia *Grah.*) . . . . . — 10
— splendens *Boj.* . . — 10

Schlanker Wuchs, feurige Blumen, zeichnen diese Gattung aus.

Exostemma floribundum *W.* 1 —
†Ferdinandia eminens *Lag.* (Cosmophyllum cacaliaefolium *C. Koch & Bouché.* Podachenium paniculatum *Benth.*) . — 15

Eine stattliche raschwüchsige Blattpflanze.

*Ficus aborta . . . . — 25
— acuminata *Hamilt.* (cerasiformis *H. Hask.*) . . — 15
† — Afzelii *G. Don.* . — 15
— aquatica *W.* . . — 5
— arbutifolia *Lk.* . . — 10
† — australis *W.* . . 1/3-1 —
† — bengalensis *L.* (Urostigma *Miq.*) . . . . — 20
— cerasiformis *Parment.* — 15

Zeichnet sich durch sehr schöne Früchte aus.

— citrifolia *Lam.* . . . — 10
— cornifolia *H. B. K.* . — 20
— cuspidata *Desf.* . — 8
† — diversifolia *Blume.* (Sinoccia *Miq.*) . . . . — 8
* — elastica *Roxb.* (Urostigma *Miq.*) . . . — 10-20
* — ferruginea *Miq.* (Urost.) 2 —
— glabrata *H. B. K.* . — 15
† — heterophylla *Lam.* . — 10
* — indica *L.* . . . — 10
* — Leopoldii . . . 1 —
* — leuconeura (Covellia *Miq.*) — 10
— lucida *Ait.* . . . — 8
* — macrophylla *Roxb.* (Roxburghii *Hort.* Covellia *Miq.*) 1-3 —
† — martinicensis *Hort.* (Brosimum microcarpum ? *Schott.*) — 10-15
* — maxima *Mill.* . . — 12

Die grossen mit weisser Mittelrippe gezeichneten Blätter reihen ihn unter den schönsten F.

* — Murrayana h. *Berol.* — 10-20
— nitida *Thbg.* . . — 10
— oblongata *Lk* . . — 15
— pergamaea (Urostigma *Miq.* Ficus lucida *Hort.* . — 20
— periplocifolia . . 1 —
— quercifolia *Lodd.* . — 5-10
— religiosa *L.* Urostigma *Miq.*) . . . . . — 10
— scabra *Forst.* . . — 8
* — Schottii *H. Berol.* . — 10
— spuria . . . . — 8
— sp. e. Brasilia . . — 15
— — e. Venezuela . 2 —

Blätter wie Melastoma geadert.

— stipulata *Thbg.* (scandens *Lam.*) . . . . . *r.* — 5-10
— sp. e. Java . . 1 20

Da wo feuchte Wände sind, ist zu deren Bekleidung nichts empfehlenswer-

ther, auch sonst schon durch Stellung und Colorit der Blätter sehr beliebt.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| * — subpanduraeformis *De Vriese?* (leonensis et sp. d'Afriqueh. *V. Houtte.* Urostigma *Miq.*) | — | 10-15 |
| † — tomentosa *Roxb.* (barbata *Wall.*) . r. | — | 5 |

Wächst rasch an feuchten Wänden empor, und macht durch seine grossen atlasschimmernden, zu beiden Seiten dicht und dachziegelförmig stehenden Blätter einen köstlichen Effect.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — venosa *Ait.* (infectoria *W.*) | — | 10 |

Die ganze Gattung verleiht durch ihre meist dunkelgrünen lederartigen Blätter und grossen mannichfaltigsten Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck, der in keiner Sammlung fehlen dürfte.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Flacourtia inermis *Roxb.* | — | 8 |
| †Franciscea acuminata *Pohl.* | — | 10 |
| † — calycina *Hk.* (laurifolia, Brunfelsia *Bth.*) | — | 20 |
| — elegans (rubescens) | 4 | — |
| — eximia *Scheidw.* | 1 | — |
| — confertiflora *Moore.* | — | 15 |
| — Hopeana *Hk.* (unniflora *Pohl.*) | — | 10 |
| — latifolia *Pohl.* (Brunfelsia *Benth.*) | 1 | — |
| * — macrophylla *Cham.* et *Schl.* Brunfelsia *Benth.* | 1 | — |

Die Gattung schon verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. Hopeana ist aber der schönste Zimmerschmuck, sie gönnt sich oft nur wenig Wochen Ruhe, um aufs Neue. Aug' und Geruchsnerven angenehm zu berühren.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Galipea odoratissima *Lindl.* | 2 | — |
| Galphimia splendens *h. Berol.* | — | 5 |
| Gardenia Baumanni *Hort.* (Baumannia geminiflora *D. C.*) | — | 15 |
| — floribunda e Shangai | 1 | 10 |
| † — florida *L.* | — | 5-10 |
| — latifolia *Benth.* | — | 10 |
| — radicans *Thbg.* | — | 5 |
| — — veredelte Halbstämme | 1/2-1 | — |
| — Sherbourniae *Hook.* | — | 5-15 |
| — Thunbergii *L.* | — | 10 |
| — Whitefieldii *Lindl.* (malleifera *Hook.*) | 1-2 | — |

Kaum bedürfen sie der Empfehlung, selbst bahnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpool und zieren dort mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigen, süss duftenden Blumen, zu jedem Feste die schöne Welt. Von G. radicans ziehe ich Halbstämme à 1/3—1/2 Thlr.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Goethea cauliflora *Nees ab Es.* | — | 10 |

Originell durch die aus dem alten Holze aufsprossenden hochrothen Blüthen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Gelonium denticulatum *h. Bezol* | — | 20 |
| Gmelina arborea *Roxb.* | — | 10 |
| Guazuma ulmifolia *Lam.* (Bubroma) | — | 10 |
| Hamelia chrysantha *Sbr.* | — | 5 |
| Hebeclinium ianthinum *Hook.* (Conoclinium *DC.*) | — | 5-10 |

Bei leichter Cultur entwickelt sie sich ungemein rasch zu grossen Büscheln, an deren Spitze sie in grossen Dolden ihre Blüthen entfaltet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Helicteris Ixora *L.* | — | 15 |
| Heliotropium *L.* Anna Turrel | — | 5 |
| — Gem. | — | 5 |
| — lilacinum | — | 5 |
| — Mme. Rendatler *Lemoine* | — | 5 |
| — Triomphe de Faubourg | — | 5 |
| — — de Liège | — | 5 |

Wegen des köstlichen Geruchs der Blüthen unter den Namen „Vanille" allbekannt.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *Heritiera macrophylla *H. Belg.* (grandis *Fisch.*) | 3-6 | — |

Imposante Blattpflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hibiscus Abelmoschus *L.* | — | 15 |
| — coccineus | — | 15 |
| — diversifolius *Jacq.* | — | 10 |
| — Cameroni fulgens | — | 8 |
| — — Van Houtteanus *Ranniger.* | — | 8 |

Vom Vorstehenden und Fulerianus gezogen — daher ausgezeichnet von Colorit.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — lilliflorus *Cav.* (puniceus *Hort.*) | — | 8 |
| — Manihot *L.* | — | 10 |
| — mutabilis *L.* . *f* | — | 5 |
| — pedunculatus *Cav.* | — | 10 |
| — regius *V. Houtte.* | — | 8 |
| — Rosa sinensis *L.* fl. rubro pl. | — | 10 |
| — — — *L.* | — | 5 |
| — — — flavo pleno. | — | 10 |
| — speciosus *Ait.* . *h* | — | 5-10 |
| — splendens | — | 10 |
| — sp. insulae Capensis | — | 10 |
| — Telefosii | — | 10 |
| — tricolor du Japon. *H. Belg.* . *f* | — | 8 |
| — virgineus *Hort.* . *k* | — | 12 |

Die grossen feurig leuchtenden und mannigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hingginsia elegans *Planch.* | — | 5 |
| Homalanthes populifolius *Grah* | 2 | — |
| Hoya bella *Hook.* | — | 8 |
| — Bidwilliana *Hort.* . r | — | 10 |
| — cinnamomifolia *Hook.* | — | 10 |
| — carnosa *R. Br.* (Asclepias *L.* Schollia crassifolia *Jcq.*) r | — | 5 |
| — clandestina *Hort.* . r | — | 8 |
| — coccinea *Hort.* . r | — | 8 |
| — Cunninghami *Hort.* r | — | 10 |
| — fraterna *Blume.* . r | 1 | — |
| — fructiosa *Hort.* . r | — | 10 |
| — imperialis *Lindl.* (Asc. Sussuela *Roxb.*) . r | 1 | — |
| r — macrophylla *Bl.* | 5 | — |
| — mollis *Hort.* . r | — | 8 |

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| r Hoya Motoskei *Teysm. & Binn.* | | 1 | 15 |
| — pendula *W. & A.* (Asclp. *Roxb.*) | v | — | 8 |
| — picta *Sieb.* | r | — | 15 |
| — Pottsii *Lindl.* | r | — | 8 |
| — rotundifolia *Sieb.* | r | — | 8 |
| — Sieboldii *Hort.* | r | — | 15 |
| — trinervis *Hort.* | r | — | 12 |
| — suaveolens *Hort.* | r | — | 12 |
| — variegata *de Vriese* | r | — | 12 |

Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte carnosa der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedliche oder gigantische Form der Blüthen empfehlen die neueren Species.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Imatophyllum Aitoni *Hook.* (Clivia nobilis *Lindl.*) | | — | 15-30 |
| Impatiens Hookeri *Walp.* | | — | 8 |
| — Jerdoniae *Wight.* | | — | 10-20 |

Gedeihen schattig feucht gehalten; bei sehr mässiger Wärme blühen sie dankbar und gereichen jeder Sammlung zur Zierde.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Inga pulcherrima *Cervant.* | | — | 10 |

Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch die hohe Grazie und Zartheit der Blumen lassen sie jeder Sammlung werth sein.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| — ligustrina *W.* (Calliandra | | — | 15 |
| † — Saman *W.* Columb. | | — | 10 |
| 0 Impomoea Learii *Paxt* | r | — | 5 |
| — Lindleyana | | — | 15 |
| r — quercifolia (muricata ?) | | — | 15 |
| — Sellowii *Penny* | | — | 10 |
| F — truncata | r | 1 | 15 |
| 0 — tyrianthina *Lindl.* | r | — | 5-10 |

Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — Ipomoeen sind würdig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen; ihre volle Pracht erlangen sie aber, wenn sie im Sommer ausgepflanzt werden, wozu sich besonders die mit 0 bezeichneten eignen.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Isolepis prolifera *R. Br.* | | — | 5 |
| — pygmaea *Kunth.* | | — | 5 |

Sehr beliebte Ampelpflanzen.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Ixora cuneifolia *Roxb.* | | 1 | — |
| Jacquinia mexicana *Hort.* (ruscifolia *Jcq.*) | | — | 10 |
| Jasminum multiflorum *Roxb.* | r | — | 8 |
| — Sambac *L.* | r | — | 8 |
| — — fl. plenissimo | r | — | 10 |
| — — grand Duc de Toscana | r | — | 10 |
| — — Maid of Orleans | r | — | 10 |

Die drei letzten sind die schönsten dichtest gefüllten aller Jasminen, blühen schon als Stecklinge und duften gleich dem Sambac.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| † Jatropha multifida *L.* | | 1 | — |
| Jochroma coccinea | | — | 10 |
| — Warszewicii *Rgl.* | | — | 10 |
| Kirganellia elegans *Juss.* | | — | 10-20 |

Eine sehr zierliche Pflanze.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Lacepedea insignis *H. B.* | | — | 15 |
| Lantana Anton-Humann *H.* | | — | 5 |
| F — aurantiaca *B.* | | — | 10 |
| — alba grandiflora | | — | 5 |
| — Bonardii *B.* | | — | 10 |
| — Cesar Portier *Bouch.* | | — | 10 |
| — crocea superba *Hort.* | f | — | 5 |
| — delicatissima *Hort.* | f | — | 5 |
| — gigantea *Hort.* | f | — | 5 |
| — l'ami Pêcheur *Rend.* | | — | 5 |
| — lutea superba *B.* | | — | 10 |
| — Mme. Berniau *B.* | | — | 10 |
| — — Rendatler *B.* | | — | 10 |
| — Ninon *B.* | | — | 10 |
| — Sellowi *Lk.* | f | — | 5 |
| — varriegata grandiflora | | — | 5 |

Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben - Nüancirung den schönsten Schmuck.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Lebretonia Helleri *Hort.* | | — | 8 |
| Leguminosa sp. e. Ind. or. | | — | 20 |

Sehr zierlich.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Leucaena glauca *Benth.* (Acacia) | | — | 10 |
| † Lomatophyllum rufocinctum *Swt.* | | 1 | — |
| — macrum *Lk.* | | — | 10 |
| Ludolphia glaucescens *W.* (Arundinaria *P. B.*) | | — | 10 |
| †Macropiper excelsum *Miq.* | | — | 25 |

In Habitus und Belaubnng einem grossblättrigen dunkellaubigen Epheu zu vergleichen.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Macrostigma tupistroides *Knth.* | | — | 20 |
| †Magnolia adoratissima (Talauma Candollei) | | 1 | 10 |
| — pumila *Andr.* (Talauma) | | 1 | — |
| Malpighia coccifera, *L.* microphylla *Hort.*) | | — | 10 |
| Malvaviscus mollis *D. C.* (Achania mollis *Ait.* | | — | 20 |
| Manettia bicolor *Ldl.* | | — | 5 |
| — glabra *Schld.* | r | — | 5 |
| — latifolia | r | — | 5 |
| Marica coerulea *Ker.* | | — | 10 |
| — humilis *Herb.* | | — | 10 |
| — virgata | | — | 15 |
| Mariscus aggregatus *Willd.* | | — | 10 |

Wächst ausgezeichnet im Wasser und ist mit seinen fahlbarbigen Blüthenbüscheln ein sehr imponirendes Gras.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| *Montanoa mollissima *Noack*-Linclaisia discolor *Hook & Arnott.* Liabum discolor *Schult.*) | | — | 15 |

Ausgezeichnet schöne weissblättrige Blattpflanze.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| Mikania odorata *Lehm.* | r | — | 5 |
| — speciosa *Hort.* | r | — | 10 |

Thlr. Ngr.

Mimosa pudica *L.* . . . — 5

Bekannt genug unter dem Namen; „Rühr mich nicht an."

rMimosa sensitiva *L.* . . . — 20
Mimusops trifoliata *Hort.* . 2 —
Mitscherlichia spectabilis *Knth.* (Neea Mitscherlichii *Steud.* — 15
— verticillata *R.* et *Pav.* — 20
Morrenia odorata *Lindl* . r— 8
Murraya exotica *L.* . . . — 10
Napoleona imperialis *P. B.* (Whitfieldii *Hook.*) . 1 —

Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird über Farbenpracht und originelle Bildung der Blumen staunen.

Nepenthes destillatoria *L.* r 5-10 —

Bekannt unter dem Namen „Kannenträger" bildet er die Krone auserwählter Sammlungen; meine alte über 40 Fuss lange Pflanze trägt solche Kannen, fast von Fusslänge.

— laevis *Lindl.* . . . r 5 —
— Phyllamphora *Willd.* r 5 —

Oxalis Bowei *Bot. Reg. Z.* . — 6

Sehr reich blühend.

— tropaeoloides *Hort.* . — 5

Blätter schwarzroth. Ampelpflanze.

— fruticosa *Radd.* (rusciformis *Mikan.*) . . . . . — 10

Panicum altissimum *Mey.* . — 20
— plicatum *Lam.* . . . — 5

Passiflora Actinia *Hook.* . r— 8
— albo-nigra *Card.* . r— 10
— amabilis *Ch. Lem.* . r— 8
— amatissima *Hort.* . *f* r— 5-15
— aurantia *Forst.* (Disemma *Lind.* Murucuja *P*) r— 10
— Beleottii *Hort.* . . r— 8
— Bedfordiana *Hort.* . r— 8
— capsularis *L.* . . . r— 10
— cinnabarina *Hort.* . r— 10
— coerulea *L.* . . . r— 5
— — Colvilli *Swt.* . r— 8
— — racemosa *Sabine* r— 5
— Comte de Nesselrode r— 8
— „ „ Woronzoff r— 8
— Deroscordiana *Hort.* r— 10
— edulis *Sab.* . . . r— 5
— Hartwissiana *Hort* . r— 8
— holosericea *L.* . . . r— 5
— Imperatrice Eugenie r— 10
— kermesina major *Hort.* r— 10
— Kotletzii . . . . r— 10
— laurifolia *L.* . . . r— 5
— Lowii *Hook.* . . . r— 8
— Loudoni *Atkins* . r— 8
— lunata *Sm.* mondförmige Blätter . . . . . r— 10
— marmorea *Linden* . r— 10
— Mayana *Loud.* . . *f* r— 8
— ochroleuca *Hort.* . r— 8
— princeps *Lodd.* (racem.) r— 10
— quadrangularis Decaisneana *Gt.* . . . r— 10
— — insignis *L.* var. r— 10
— racemosa rubra *L* . r— 10

Passiflora Schlachteri *Hort.* r— 8
— Skinneri *Hort.* . r— 8

Die Passionsblumen, an denen man schon seit den 17. Jahrhundert die Zeichen der Leiden Christi versinnlicht glaubt, kommen ungemein, wegen ihrer unbestritten originellen Blumen in Aufnahme, wesshalb ich mich mühte, meinen geehrten Kunden eine reiche Auswahl vorzuführen.

Pavetta indica *L.* . . . . r— 10

Peliosanthes Teta *Andr.* . — 5

Peperomia asarifolia *Schiede* et *Deppe* . . . . . . — 5
— blanda *H. B.* . . — 5
— incana *Miq.* . . . — 5
— magnoliaefolia *Dietr.* (Piper *Jacq.*) . . . . — 5
— reflexa *A. Dietr.* (var. americana *Miq.*) . . . . — 5

Pereskia aculeata *Plum.* . r— 10
— grandifolia *Haw.* . r— 10
— rosea *Hort.* . . . r— 10

Da sie so leicht in der Cultur, so wenig Platz rauben und doch so köstlich rosa blühen, sind sie gewiss überall willkommen.

Pharus vittatus *Ch. Lem.* . 2 —

Wohl selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdig bunten Colorit, welches dieser Pharus trägt.

Phaseolus Caracalla *L.* . r — 20

Phyllanthus angustifolius *P.* (Xylophylla *Sw.*) . . 1/3-1 —
† — juglandifolius *W.* (grandifolius *Hort.*) . . — 25
— latifolius *Hort.* . . 1 —
— speciosus *Jacq.* (X. Arbuscula *W.* X. speciosa) . — 20

Sind äusserst interessant, da eine Masse kleiner Blüthchen die Ränder der dunkelgrünen Blätter bedecken.

Physianthus albens *Mart.* (auricomus *Grah.* Schubertia Grahami *D. C.*) . . . . r— 20

†Pincenectitia glauca . . 1 15
† — tuberculata *Hort.* 3 —

Pisonia Pacurero *H. B. K.* eucalyptifolia) *Knth.* . . 2 —

Phyllartron Boyerianum *D. C.* (Artrophyllum madagascariense *Boyer.*) . . . . . — 15

Pilea serpyllifolia *Lindl.* . — 5

Ueberall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch die Aufmerksamkeit Aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen abzukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersteren werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz formiren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwölkchen nach allen Richtungen hin auffliegen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Pilocarpus pinnatifidus** *Hort.* | 2 | — |
| **Pilogyne suavis** *Schrod.* . *f r*— | | 5 |

Eine der raschwüchsigsten Pflanzen, sowohl für Ampeln als Spalier brauchbar.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Piper scandens** *Hort.* . . | — | 10 |
| — celtidifolium *Desf.* (Enckia unguiculata Roth) . | — | 5 |
| **Plumbago coerulea** *H. B. K.* *f*— | | 5 |
| — rosea *L.* . . . . *f*— | | 5 |

Besonders dankbar im freien Lande. P. rosea, ist überaus zart, und blüht im Winter reitzend.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| †**Plumeria species** (rubra?) | — | 20 |
| **Pollia purpurea** . . . . | 2 | — |

Gehört zu den neuesten nettesten Einführungen, die dunklen, ins röthliche scheinenden Blätter haben einen eigenthümlich atlasschimmernden Glanz.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Polygonum pictum** *Hor.* . | — | 5 |

Nette Blattpflanze deren hellgrüne Blätter fast schwarz geflekt sind.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Pryonium Palmita** *E. May.* (Acorus Palmita *Lchst.* Juncus serratus *Thnb.*) . . | 1 | — |
| **Psychotria undulata** *Poir.* (undata *Jacq.*) . . . . | — | 8 |
| **Quisqualis indica** *L.* . . . *r*— | | 15 |

Mit ihrem schönen Laub vermag sie Häuser zu umranken. Die sich wohl dreimal verfärbenden Blumen üben einen eigenthümlichen Reiz.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Rhaphistemon Hookeana** . *r* — | | 20 |
| **Rhopala corcovadensis** *De Jonghe* | 3 | — |

Die ganze Pflanze ist besonders während des Triebes wie mit feinster goldgelber Wolle überzogen, die je nach dem Alter derselben sich dunkler färbt.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Rhynchospermum jasminoides** *Lindl.* (Trachelospermum) *r*— | | 10 |
| **Rivina brasiliensis** *Nocca.* . | — | 5 |
| — laevis *L.* . . . . . | — | 5 |
| — purpurascens *Schrd.* | — | 5 |
| — spec. e Venezuela . | — | 10 |

Sind fast das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Beeren bedeckt. Blätter rothbraun.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Rogiera Roezelii** . . . . | 1 | — |
| **Rondeletia anomala** *Hort.* . | — | 10 |
| — racemosa *L.* . . . | — | 5 |
| — speciosa *Lodd.* (odorata *Zug.*) . . . . . . | — | 15 |
| — — major h. *Belg.* *r*— | | 10 |

Die letzteren R. sind äusserst niedliche, dankbare, schöne und in der Blüthe lang dauernde Pflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Russelia carminata** . . | — | 10 |
| — juncea *Zuccar.* . . *f*— | | 5-10 |
| — multiflora *Sims.* . | — | 5 |

Bei richtiger Cultur, d. h. im Sommer im Freien in sonniger Lage', erfreuen sie mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen, können aber auch als Ampelpflanzen gezogen werden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Sanseviera guineensis** *W.* , | — | 8 |
| †**Saurauja setosa** *Hort.* . | — | 20 |
| **Sarracenia adunca** *Sm.* variolaris *Mchx.* . . . . | 3 | — |
| †**Schistocarpha bicolor** *Less.* (Perymenium discolor *Schd.*) *f*— | | 8 |

Ausgezeichnete Rasenblattpflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| ***Schizolepis Geitneriana** *Schld.* *f* | 1-2 | — |

Ist ein durch Herrn Prof. v. Schlechtendal bestimmtes und von mir eingeführtes, in der Hamburger Gartenzeitung beschriebenes Gras, mit starkem aufrecht stehendem Schaft und $1^1/_2$ Zoll breiten, 1 Fuss langen gefalteten (noch auffälliger als bei Curculigo) weit überhängenden Blättern. Die grosse Pflanze hat 30, über 2 Fuss hohe Schafte getrieben, an deren Spitzen die Blüthen und Samen in Menge erscheinen. Die letzteren geben, durch den fast schwarzen Glanz, und da sie über die Hälfte frei auf dem Kelch aufsitzen, der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen. Da die grosse Pflanze einen Durchmesser von 4 Fuss resp. einen Umfang von 12 Fuss hat, dabei aber auch im Freien gedeiht, so lässt sich annehmen, dass sie für unsere Freiland'sgruppen eine ausgezeichnete Acquisition ist, und eine Zukunft hat.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Scutellaria scarletina** *Lem.* | — | 10 |
| — splendens *L.* et *Otto* *f*— | | 5 |
| — Ventenatiana *Hook.* *f*— | | 8 |
| — villosa *Hook.* . . *f*— | | 8 |

Sie sind alle ausgezeichnete Acquisitionen; kräftigt man sie im Sommer im freien Lande, so blühen sie schon dort sehr dankbar.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Siphocampylus bicolor** *G. Don.* *f*— | | 5 |
| — canus *Pohl.* . . *f*— | | 8 |
| — Warszewiczii *Rgl.* . *f*— | | 8 |

Blühen meist dankbar und zierlich.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| **Solandra grandiflora** *Schwartz.* | — | 10 |
| — guttata *D. Don.* . | — | 10 |

Colossale, langgeröhrte, oben gefranzte, in der Hauptfarbe weisse Blumen, sind eine köstliche Zierde dieser riesigen Pflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| †*F*Solanum armatum . . | — | 10 |
| † — atropurpureum *Schrk.* | — | 8 |
| † — auriculatum *Art.* . | — | 8 |
| *F* — ciliare . . . . . | — | 10 |
| — crenulatum *Hort-* (Kalthaus) | | |
| †*F*— crinitum *Lam.* . . | — | 20 |
| † — discolor *Hort.* (macranthum *Dun.*?) . . . . | — | 10 |
| — Jacquini *W.* . . . | — | 10 |
| *F*†— laciniatum *Ait.* . . . | — | 5 |
| *r* — macrantherum *Moç. Sess.* | — | 15 |
| — marginatum *L.* . . . | — | 10 |
| — Pseudocapsicum *L.* . | — | 5 |
| † — robustum . . . . | — | 15 |
| — sodomaeum *L.* (Herrmanni *Lam.*) . . . . . . | — | 5 |
| — sp. e. Venezuela No. 1 | — | 15 |
| — — — No. 2 . | — | 15 |
| — — — No. 3 . | — | 20 |
| — — — No. 4 . *r*— | | 10 |
| † — Vellozianum *Dun.* . | — | 10 |

Man lenkt jetzt wieder allgemein die Blicke auf diese Gattung, denn sie zeich-

Thlr. Ngr.

net sich besonders durch reiche abwechselnde Blattformen und Colorit aus, die durchs Auspflanzen oft so riesige Dimensionen annehmen, dass man sie gegen Topfpflanzen kaum wiedererkennt

Spathodea speciosa *Brogn.* . 2 —
— gigantea *Blum.* . . 1 15
Stadtmannia australis *R. Br.* 4-10 —

Neu. Holl. Eisenholz, zählen zu den gigantischsten Blattformen.

*Stenotaphrum glabrum *Trin.* (americanum *Schrk.* sarmentosum *N. E.* Jeohaemum secundum *Wall.* Rottboellia dimidrata *L. fil.* R. stolonifera *Poir.* R. tripsacoides *Lm.*) . . — 10

Eines der raschwüchsigsten Ampelgewächse.

Stephanotis floribunda *Brogn.* r— 10-20

Eine reich und willig blühende Schlingpflanze mit glänzend dunkelgrünem Laube.

Sterculia inops *Schott.* . . 2 —
Stifftia chrysantha *Mik.* (insignis *Fisch.*) . . . . $^1/_2$-1 —

Kräftig im Wuchse, gleicht sie während der Blüthe, im Kleinen, einer sich entladenden Bombe, deren dicht gedrängte lange hochrothe Blumen, einem mächtigen Feuerstrahl zu vergleichen sind.

Strophanthus dichotomus *D. C.* r— 10
Tabernaemontana coronaria *W.* fl. pl. . . . . . — 10

Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien, nur ist sie viel zärtlicher, obwohl mindestens eben so dankbar blühend.

Tacsonia ignea *Warszw.* . r— 10
†Talauma mutabilis *Blume.* 2 —
Teronia spec. . . . . — 15
Testudinaria elephantipes *Burch.* (Tamus *L'Her.*) . r k 5-15 —

Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitzt.

Tetrameles Horsfieldii *Steud.* — 10
Tetranema mexicanum *Benth.* (Pentstemon mexic. *Hort.*) — 5

Ist unermüdlich im Blühen.

*Theophrasta longifolia *L. Jacq.* (Clavija ornata *Don.*) . 2 —
Torenia asiatica L. . . — 5
— concolor *L.* . . — 5
— pulcherrima *Hort.* . — 10

Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstammpflanze gezogen, überall entfalten sie ihren Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem Topfe im Wasser stehn.

†Tradescantia discolor *Sm.* . — 5-10
— — lineata *Miq.* (Tr. discolor *Sm.* var. vittata *Miq.* foliis variegatis *Hort. v. Hte.*) 20 Ngr. — 1 Thlr.

Eine ausgezeichnete Acquisition, die viel robuster als unsre alte discolor, sich ausserdem durch die regelmässigen weissen Längenlinien auf der Oberfläche der Blätter auszeichnet, während die Rückseite das dunkelste violett ziert.

— Zebrina *Lindl.* (Zebrina pendula *Schnizl.*) r— 5

Der meist niedrige oder hängende Wuchs lässt sie als Einfassung der Beete, aber auch als Ampelpflanze sehr empfehlen.

*Uhdea bipinnatifida *Kth.* (Polymnia grandis h. *Berol.*) f— 5

Für Freilandgruppen der schönste Schmuck.

Uncinia jamaicensis *Pers.* . — 8-10

Ein sehr zierliches südamericanisches Gras.

*Urtica biloba *Hort.* . . — 5
— macrophylla . . — 10
†Urticeae species *Hort.* Nr. 1 — 15

Bringt sehr schöne grosse Blätter.

— — — Nr. 2 1 —
— — — Nr. 3 1 —
— — — Nr. 4 — 15

Sämmtlich mit auffallenden Blättern.

Urvillea ferruginea *Lindl.* (Serjania cuspidata *Hort.*) . r— 1[illegible]
Urostigma costaricense *Wrsc.* (Ficus) . . . . — 10
†Verbesina sinuata *Ell.* (laciniata *Nutt.* Siegesbeckia *Poir*) f— 5
Vernonia axilliflora *Mart.* . — 20
Villarezia grandiflora *Fisch.* — 15
Whitfieldia lateritia *Hook.* . — 10
†Wigandia caracasana *H. B. K.* f— 10
Xanthorrhonium Herbertii (Phycella Herberti? *Lindl.*) . — 5
†Yucca glorriosa *H.* . . $^1/_3$-4 —
† — longifolia *Karw.* . 4 —

# Warmhaus-Sortiments-Pflanzen.

## Acanthaceae.

Diese Familie umfasst viele der beliebtesten Pflanzen für das warme und temperirte Haus. Bei der leichtesten Cultur erfreuen sie durch dankbares und schönes Blühen, einige Arten derselben zeichnen sich noch ausserdem durch prachtvolles Blattcolorit aus.

*K.* bedeutet Kalthaus-, *Fr.* Freilandpflanzen.

Thlr. Ngr.

*Fr.* Acanthus niger *Mill.* . e — 5
*Fr.* — longifolius *Host.* e — 5
†*Fr.* — lusitanicus *Hort.* — 6
*Fr.* — mollis *L.* . . . — 5
*Fr.* — spinosus *L.* . . . e — 5
*K.* Athatoda cydoniaefolia *Nees.* — 8

Nach der Abbildung zu urtheilen, eine reich und prächtig blühende Pflanze.

Aphelandra cristata *R. Br.* (Justicia *Hort. Schönbr.*) . — 10
† — grandis *Klotzsch.* . — 10
* — micans *Hort.* . . . — 10
† — Porteana *Morel.* . — 10
† — squarrosa *Nees.* (var. Leopoldii *Car. Segr.*) . . — 15

A. Leopoldii macht als Blattpflanze schon einen vorzüglichen Effect, weil deren dunkelgrüne Blätter mit fast rein weissen regelmässigen Streifen geziert sind.

Coleostylis aurantiaca *Hort.* — 5
†Cyrthanthera magnifica *Ns.* (Just. carnea superba h.) *f* — 5
† — velutina *Benth.* . *f* — 5
Dipteracanthus spectabilis *Hook.* . . . . . *f* — 5

Blüht dankbar und schön.

Eranthemum bicolor *Schrantz.* (Justicia bicolor *Sims.*) *f* — 5
— coccineum *Lem.* (Salpinganthe coccinea *Hk.*) . — 5
— leuconeuron *Hort.* . — 5-10

Die weissgeaderten Blätter geben dem Pflänzchen ein sehr nobles Aussehen.

— pulchellum *Andr.* (Ruellia varians *Vent.* E. nervosum *R. Br.*) . . . . — 5

Im Sommer im Freien gehalten, blüht sie sehr dankbar im Winter.

— strictum *Colebr.* . — 5
— variabile *R. Br.* . — 5
Geissomeria longiflora *Lindl.* f — 5
Gymnostachys zeylanica *N. E.* — 10

Thlr. Ngr.

*K.* Hexacentris coccinea *Nees.* (Thunbergia *Hook.*) . — 5
— lutea *Hort.* . . r $^{1}/_{3}$-$^{2}/_{3}$ —
— Mysorensis *Wight.* r $^{1}/_{3}$-$^{2}/_{3}$ —

Sind leicht und schnellwachsende Kletterpflanzen, die so schön als reichlich blühen.

Justicia amoena *Hort.* . . — 5
— chrysostachys . . — 10
— carnea *Lindl.* (Cyrthanthera Pohleana *Nees.*) *f* — 5
*K.* violacea *Vahl.* (Dianthera *Vahl.*) . . — 5
*K.* Meyenia erecta *Benth.* *f* — 8
Ruellia formosa *Andr.* . *f* — 5

Blüht im Sommer köstlich im freien Lande.

— glommerata *Wall.* . *f* — 5
— lilacina *Hook.* (Justitia glabrata *Russ.*) . . — 8
*Fr.* — strepens *L.* . . . — 5
*K* — maculata *Hort.* . . *f* — 5
*H* — salicifolia *Vahl.* . *f* — 5
Schaueria calycotricha *Nees.* (Justicia flavicoma *Lindl.* J. calycotricha *Lk.* et *Otto.*) — 5
Strobilanthes discolor *Hort.* (Ruellia discolor Lecchi) . — 5
— lactata *Hook.* . . - — 5

Mit weissbuntem Blatte.

— Sabinia *Nees.* . . . — 5
Thunbergia Harissii *Hook.* — 20
— grandiflora *Roxb.* . — 8
— ? havanensis *Hort.* . — 10
— laurifolia *Lindl.* (Hexacentris) . . . . . — 10
Thyrsacanthus barlerioides *Nees.* — 5
— Schomburgkianus *Nees.* (rutilans. *Pl.* et *Ldl.*) . — 10

Die erstere imponirt durch aufrechtstehende Blüthenbüschel. die zweite durch lange, leichte, feurigrothe, hängende Blüthentrauben.

## Amaryllideen & Liliaceen.

Sind unstreitig mit die lohnendsten Geschlechter des Pflanzenreiches; die leichteste Cultur, prachtvolles Blühen, oft vereinigt mit herrlichem Blattschmuck haben sie sich in Glashäuser und Salons, in die bescheidene Wohnung des Landmanns, in die grössten Parks, in das einfachste Hausgärtchen des Bürgers einge-

führt. Die mit *k* bezeichneten sind für Kalthaus. Vorzüglich mache ich Handelsgärtner auf die unter den Engrospreisen befindlichen Notirungen aufmerksam.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *k* Agapanthus umbellatus *L'Herit.* | — | 5 |
| — — fol. var. | — | 15 |
| — — angustifolius *Hort.* | — | 5 |
| Alstroemeria psittacina *Lehm.* (brasiliensis *Sello.*) | — | 10 |
| Amaryllis Atamasco *L.* (Zephyrantha *Herb.*) | — | 3 |
| — acuminata *Ew.* var. fulgens | — | 20 |
| — var. speciosa | — | 20 |
| *k* — Belladonna *Linn.* | — | 6 |
| — — major | — | 17 |
| — — minor | — | 13 |
| *k* — crispa *Jcq.* (Strumaria) | — | 6 |
| — Cleopatra *Hort.* | 1 | — |
| — Karwinskyana *Zucc.* (Sprekelia *Roem.*) | — | 20 |
| — parviflora *Hort.* | 1 | — |
| — Prinz Johann von Sachsen | 1 | — |
| — reticulata *Hrt.* speciosa | 1 | — |
| — radiata | 1 | — |
| — tricolor *Hort.* | 1 | — |
| — vittata *W.* (Hippeastrum) | — | 20 |
| *Fr.* Ammocharis longifololia *Roem.* (Amaryllis *Linn.* Crinum *Fngb.*) | — | 20 |
| — var. alba | — | 10 |
| — — rosea | — | 8 |

Eine der schönsten Freilandpflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Chlidanthus fragrans *Pinell.* | — | 10 |
| *k* Clivia nobilis *Lindl.* (Imatophyllum Aitoni *Hook.* | — | 15 |
| Coburgia incarnata *Sweet.* | 1 | — |
| Crinum amabile *Don.* (Cr. superbum *Roxb.*) | 2 | — |
| — american. *Linn.* (Commelynii *Red.* Bulbine uncinata *Moench.*) | 1/2-2 | — |
| — asiaticum *Linn.* (toxiarium *Fraser*, americanum *Red.* Bulbine asiatica *Gaertn.* Lilium zeylanicum *Hrm.*) | 1 | — |
| — Broussonetianum *Hb.* (yuccaeflorum *Salisb.* Amaryllis ornata *Ait.* A. yuccaeoides *Tomps.* A. spectabilis *Andr.* | 4 | — |
| — Decimi *Hort.* | 2 | — |
| — erubescens *Ait.* (revolutum *Lind.* Lindleyanum *Schlt.* Kunthianum *R.* & *L.* americanum *Rodschied.*) | 1 | — |
| — giganteum *Andr.* (petiolatum *Herb.* Amaryllis gigantea *Ait.* ornata *B. Gawl.* A. Jagus. *Tomps.* A. candida *Trost.* A. latifolia *Lam.*) | 1/2-2 | — |
| — Knyffii *Hort.* | 6 | — |

Wenn je eine graciöse, reich und schönblühende Pflanzenart, Anspruch auf Lob machen darf, so steht Crinum in erster Reihe. Bei geringer Pflege — mässiger Wärme, reichlichen Begiessen während der Vegetationsperiode nach vorhergegangener Ruhezeit — erfreuen sie uns oft zwei- oder dreimal mit ihren schönen weissen und rothlilienartigen Blüthen, den köstichsten Mandelduft verbreitend.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *F* Erythronium Dens canis album | — | 3 |
| — — purpureum | — | 3 |
| — — roseum | — | 3 |
| — — violaceum | — | 3 |
| Eucharis amazonum Linden | 1 | — |
| — candida *Pl.* et *Lind.* | 1/2-2 | — |
| — grandiflora *Pl.* et *Lind.* | 1/2-2 | — |

Neuere Einführungen, blühen im Winter köstlich weiss, wozu es keineswegs starker Zwiebeln bedarf.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *b* Eucomis punctata *Ait.* | — | 20 |
| *F.Fr.* Fritillaria imperialis *L.* | — | 4 |
| — Meleagris *L.* in Rummel 12 Stck. | — | 18 |
| Galanthus nivalis fl. pl. | — | 1/2 |
| — — simplex | — | 1/2 |
| Haemanthus albiflos *Jacq.* | 2 | — |
| *k* — puniceus *Jacq.* | — | 15 |
| — tigrinus | — | 15 |

Sind unter den Amryllideen merkwürdige Erscheinungen, theils der walzenförmigen Blattbildung als auch der gedrungenen schönen Blüthenbüschel wegen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hippeastrum aulicum *Herb.* var. platypetalum *Roem.* | — | 15 |
| — bulbosum *Herb.* var. acuminatum (Amar. *Gwl.*) | — | 10 |
| — — var. rutilum (Amaryllis *Gawl.*. H. latifolium *Roem.* & *S.* Callion rutila *Link.*) | — | 15 |
| — — var. striatifolium *Sweet.* (Amaryllis *Gawl.* Amar. Carolinae *Sterler.* Coburgia striatifol. *Herb.* Hippeastr. striatif. *Herb.* Leopold. striat. *Herb.* Amaryll. princeps *Salm. Dyck.* Leopoldia principis *Roem.*) | 1/2-2 | — |

Ist mit ihrem regelmässig weissen Mittelstreifen auf jedem Blatt, gleichzeitig schöne Blattpflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — ambignum *Herb.* (longiflorum *Hook.* | 2 | — |
| — robustum *A. Dietr.* Amaryllis Tettaui *Topf.* A. Blumenauana *Hort.*) extra starke | 1-3 | — |
| — solandriflorum *Herb.* (Amaryllis *Lindl.*) | 1/3-1 | — |

Die Zwiebeln treiben oft zwei bis drei Blumenschäfte mit 2—4 sehr grossen Blumen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hymenocallis amoena *Herb.* (*b.* ovata *Roem.* Pancr. amboinense *b. Linn.* P. fragrans *Lodd.* P. amoenum. *And.* P. ovatum *Mill.*) | 1-2 | — |
| — caribaea *Herb. b.* declinata (H. formosa *Roem.* fragrans *Salisb.* Pancratium declinatum *Jacq.* P. speciosum *Red.*) | 1 | — |
| — expansa *Herb.* (Pancratium *Sims.*) | 1/3-2 | — |

Herr Professor Dr. Carl Koch war so freundlich, diese Hymenocallis in No. 23 Seite 181 seiner Allgemeinen Gartenzeitung zu beschreiben und sagt gleich im Anfange des betreffenden Artikels:

Thlr. Ngr.

„Dass die Pflanze sowohl durch ihre zahlreichen, blendend weissen Blüthen als auch durch den vorzüglichen Wohlgeruch, den sie namentlich des Abends verbreitet, unsere volle Aufmerksamkeit verdient,“ und der Herr Verfasser hat darin vollkommen Recht. Da sie im genannten Artikel so trefflich beschrieben, enthalte mich jeder weiteren Empfehlung. Es ist eine hinreichende Zahl der schönsten Zwiebeln am Lager, um jedem Wunsche genügen zu können.

— odoratissima *Hort.* . 1/2-3 —

— rotata *Herb.* var disciformis (paludosa *Salisb.* disciformis *Roem.* mexicana *Herb.* Dillenii *Roem.* Pancr. mexicanum *L.* P. rotatum *b.* biflorum *Gawl.* . . . . — 5

Die Blüthen sämmtlicher H. sind sehr interessant und originell. Ein aufrechter Schaft trägt 10—20 Blüthen, welche sich nach und nach öffnen und eine Dolde von lilienartigen aufrechtstehenden grossen schneeweissen Blüthen bilden. Das Originellste dabei ist der zarte weisse Kranz, welcher in der Blumenkrone die Basis der Staubfäden verbindet. Cultur wie bei Crinum.

Ismene nutans *Herb.* . . 1 —

*Fr. F.* Leucojum vernum *L.* — 5

— aestivum *L.* . — 2 1/2

*Fr.* Lilium Brownii *Hort.* . — —

— bulbiferum *L.* umbellatum . . . . . — 5

— — *Ker.* var. fulgidum . . . — 15

— canadense . . — 5

— candidum *L.* einfach weiss . . . . . — 2

— — *L.* doppelt — 10

— — maculatum — 8

— — fol. varieg. — 18

— chalcedonicum *L.* — 5-10

— constantinopolitanum 1 —

— croceum *Chaix.* — 15

— excelsum *Hort.* (testaceum *Lindl.*) . . 1 —

— eximium *Curt.* *f* — 20

— giganteum *Wall.* (cordifolium *Don.*) . . — —

— Isabellinum *Kunze* (peregrinum *Hort.*) . — 20

*k* — lancifolium album (speciosum *Thbg.*) . . *f* 1/6-1 1/2 —

*k* — — var. punctatum (*Hort.*) . . . . . *f* 1/2-2 —

— — roseum punctat. *Geitn.* . . . . . *f* 1/4-1 1/2 —

— — rubrum *Hort.* *f* 1/4-1 1/3 —

— — speciosissimum *Geitn.* . . . . *f* 2/3-2 —

— longiflorum *Thnb.* — 4

— Martagon *L.* . — 5

*Fr.* — — *L.* fl. albo — 15

— monadelphum *M. B.* 1 —

*Fr.* — pensylvanicum *Hort.* (dauricum *Ker.*) . . — 20

Thlr. Ngr.

Lilium philadelphicum *L.* . 1 —

— pomponicum *L.* — 15

— — luteum . — 20

— praecox *Ledeb.* 1 —

— pyrenaicum *Gouan.* — 10

— tenuifolium *Fisch. Hornem.* (pumilum *Redout.*) 2jährige Samenpflanzen 1 —

— tigrinum *Ait.* . — 2 1/2

— venustum *H. Berol.* — 15

— vernum . . 1 —

Sämmtliche blühen im Sommer.

Den Lilien, als ältesten Bewohnern unserer Gärten, das Wort reden, ist überflüssig; was wir aber durch die neueren Erscheinungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern Vanillengeruch und das prachtvolle dunkelrothe Colorit in den mannichfachsten Schattirungen bis zum weissen Rand, sind Vorzüge, die der Erwähnung und der Hindeutung werth; dass der Garten, dem diese Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke entsagt! Von *speciosissimum* bühte dieses Jahr ein grosses Beet prachtvoll! so dass ich von dieser köstlichsten unter allen wieder jeder Nachfrage genügen kann.

Methonica Leopoldii *Ch. Lem.* (Gloriosa *Hort.*) . . *r* 2/3-1 —

Ihre köstlichen grossen gelben Blumen verfärben sich bis ins roth und machen einen herrlichen Effect. Einem Kronleuchter gleich schweben sie auf zierlich geschwungenem Stiele.

— virescens *Lindl.* var. Plantii — 10-20

Ist kleinblumiger, der Farbenschmelz aber um so köstlicher, da jedes Blumenblatt, auf gelbem Grunde, rothe Flammen zieren. Beide blühen sehr dankbar.

— superba *Lam.* . . — 10

*Fr. F.* Muscari comosum *Mill.* — 5

— pallens *Fisch.* . — 4

Pancratium maritimum *L.* - — 15

*k* — parviflorum *Desf.* . — 15

*Fr. F.* Scilla amoena . . — 2 1/2

— bifolia . . — 5

— campanulata major — 1 1/2

— — minor . — 1 1/2

— non scripta coerulea — 1 1/2

— — rubra . — 1 1/2

— — rosea . — 1 1/2

— praecox . . — 2 1/2

— sibirica 12 Stück 1 —

*k* Sprekelia formosissima *Herb.* (Sp. Heisterii *Trew.* Amaryllis *L.*) . . . . — 3

*Fr.* Sternbergia lutea *Korf.* (Amaryllis *L.*) . . . . . — 5

Tulipa chinensis . . . — 1 1/2

— florentino . . . — 2

— persica . . . . . — 1 1/2

Veltheimia viridiflora *Jacq.* (Aletris capensis *L.*) *K.* . — 10

*k* Zephyranthes candida *Herb.* (Amaryllis cand. *Lind.* A. nivea *Schltd.* Z. nivea *Dietr.* Argyropsis *Roem.*) . — 5

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| k Zephyranthes carinata *Herb.* | — | 10 |
| k — grandiflora *Lind.* | — | 10 |
| k — lilacina *Liebm.* | — | 5 |
| k — Lindleyana *Herb.* | — | 10 |
| k — mesochloa *Herb.* | — | 10 |
| k Zephyranthes rosea *Lindl.* (Amaryllis rosea *Spr.* A. carnea *Schult.*) | — | 5 |

Eignen sich zur Einfassung im freien Grunde.

# Araliaceen.

Bilden den grössten Schmuck unserer Pflanzensammlungen; erfreuen sie auch nicht durch prächtige Blüthen, so ist es die graciöse, oft gigantische Tracht ihres so mannigfach geformten Laubes, welches ihnen so viele Liebhaber gewonnen hat. Sie lassen sich sämmtlich leicht cultiviren, einige Arten halten bei uns im Freien (*Fr.*) aus, die mit vorgesetztem *k* gehören ins kalte, die übrigen ins warme Haus.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Aralia Brownii | 1 | 15 |
| Fr. — cachemirica | — | 5 |
| — macrophylla flor. *C.* | — | 10 |
| Fr. — nudicaulis *L.* | — | 5 |
| k — papyrifera *Hook.* (siehe off. und techn. Pfl.) | 2 | 15 |
| — parasitica *Hamilt.* | 1 | 10 |
| — pinnata *Hort. Belg.* | 2 | — |
| — quinduensis *H. B. K.* (Carolina alba *Hort.*) | — | 20 |
| Fr. — racemosa *L.* *f* | — | 5 |
| k — Schefflerii *Spgl.* (Siefflerla digitata *Forst.*) | — | 25 |
| Fr. — japonica | — | 15 |
| — Sieboldiana *Hort.* | 4 | — |
| Fr. — spinosa *L.* | — | 20 |

Letztere ist eine wirklich schöne Pflanze für Rasenparthien. Sie hält unsere Winter unter Bedeckung vollkommen aus, und erfreut im Sommer durch ihre graciösen farrnwedelähnlichen doppelt gefiederten Blättern.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Brassayopsis speciosa *Dcn.* et *Pl.* (Hedera glomerulata *Hook.* Gastonia Candollei *Hort.* G. dentata *Hort.* Trevesia spec. *Hort. Amst.*) | 2 | — |

Prachtvolle Blattpflanze mit gefingerten Blättern und schönem Habitus.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Botryodendron macrophyllum (? Aralia macrophylla *Cunn.*) | 5 | — |
| Dendropanax arboreum *Dcn.* et *Pl.* (Aralia arborea *L.* Hedera *Sw.*) | 1 | — |

Mit grossen ganzrandigen Blättern.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| k Fatsia japonica *Decn. & Pl.* Aralia japonica *Thbg.*) *f* | — | 25 |
| k Hedera algeriensis latifolia h. *r* | — | — |
| Fr. — Helix *L.* | — | 5-15 |
| Fr. — — B variegata *Hort.* | — | 5-15 |
| Fr. — — G Roegneriana h. | — | 5-10 |
| Fr. — — fol. aur. var. | — | 5 |
| Fr. — — digitata *Lodd.* | — | 5 |
| Fr. — — hibernica | — | 5 |
| Fr. — — — fol. aur. var. | — | 5 |
| Fr. — — taurica | — | 5 |
| Fr. — — vitifolia | — | 5 |
| Fr. — — ponderata | — | 10 |
| — — Yerlandica *Hort.* | — | 8 |

Unter diesen Epheuarten verdienen vorzüglich die algeriensis und Roegneria die wärmste Empfehlung, denn sie bringen ungemein grosse Blätter.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Oreopanax capitatum *Decn.* et *Pl.* (Aralia capitata *Jacq.* Hedera *Sw.*) | — | 15 |
| — catalpaefolium *Decn.* et *Pl.* (Aralia guatemalensis *Hort.* Hedera *Hort. Lind.*) | 3 | — |

Eine schöne grossblättrige Pflanze mit dunkel glänzendem Laube.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| k Panax crassifolius *Decn.* et *Pl.* (Aralia *Forst.* A. heterophylla *Sodand.*) | 2 | — |
| — trifoliatum *L.* (pusillus *Sims.* Aralia triphylla *Poir.*) | 2 | — |

Beide höchst imponirend, fructic. mit feingefiedertem, trif. mit feingezähntem Laube.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Paratropia elliptica *Miq.* (Artrophyllum *Bl.* Sciodaphyllum *Bl.*) | 7 | — |
| — longifolia *Decn.* et *Pl.* (Sciodaphyllum) | 5 | — |
| — pulchra *Decn.* et *Pl.* h. (Sciodaphyllum *W.* Aralia h. Bombax insignis h.) | 2 | — |
| — Spec. | $1^2/_3$-$2^1/_2$ | — |
| — tomentosa *Miq.* (Sciodaphyll. *Bl.* Heptapleurum *Hassk.* Sc. farinosum *Bl.* Artrophyllum *Bl.*) | 3 | — |

Ausgezeichnete Pflanzen mit grossen, langgestielten, gefingerten Blättern; sehr decorativ.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Trevesia palmata *Decn.* et *Pl.* (sundaica *Mcq.* Gastonia palmata *Roxb.* Aralia *Reinw.*) | 1-2 | — |

Dieser letzten gebührt die grösste Aufmerksamkeit, denn ein schöner Habitus, grosse, saftig grüne handförmige Blätter, schnelles Wachsthum, hat sie zu einer der ersten Decorationspflanzen erhoben. Sie dürfte in keiner Sammlung fehlen, ihre Culturansprüche sind die bescheidensten. Bei einem guten kräftigen Erdreich, feucht warmen Standort lohnt sie jede kleine Mühe durch imposantes Aussehen.

# Aroideen.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decorationspflanzen sind sie längst schon für die unentbehrlichsten erklärt, wesshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte, und um sie den Liebhabern zugänglicher zu machen, auch diess Jahr **bedeutend in den Preisen ermässigt.** Keine Familie bildet in Formen — die meist von architectonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den ersteren, keine Schwierigkeit in der Cultur.

Thlr. Ngr.

Acontias helleborifol. *Schott.* (Arum *Jacq.* Calad. *Vent.*) *k* — 5

*k* Acorus gramineus fol. var. (japonicus) . . . . . — 5-10

Eine allerliebste Pflanze zu Borduren der Aquarien und Kalthausgruppen

Aglaonema marantaefolia *Bl.* (Caladium *Zipp.*) . 1 —

— oblongifolia *Schott.*(A. simplex *Bl.* integrifolium *Schott* Caladium simplex *Bl.* . — 10

Alocasia alba *Schott.* (Colocasia alba *Hort.*) . . . . — 10

— cuculata *Schtt.* (Calad. *Prs.* Colocasia *Schott.* Arum *Lour.* A. ramosum *Hort.* . — 8

— macrorrhiza *Schott.* (Coloc. mucronata *Knth.* Arum *R.* Calad. *R. Br.* C. indica *C. Koch* et *Bché.*) . . — 10

— metallica *Schott.* (Calad. cupreum *Koch* et *Bouché*, C. metallicum *V. Htt.*) . 1-2 —

— odorata *C. Koch.* (Arum odoratissim. *Hort.* Calad. odoratissim. *Hort.* Calad. *Bot. Reg.* Colocasia *Brgn.*) . — 10-20

Amorphophallus bulbifer. *Bl.* (Pyhonium *Schott.* Arum *Roxb.* Conophal. *Schott.*) . $k\,^1/_2$-10 —

— campanulatus *Bl.* (Arum *Roxb.* A. Rumphii *Gaudich.* Tacca phallifera *Rumph.* Candarum Rumphii, Roxburghii et Hookerii *Schott.*) . 2 15

*k* — Conjac *Sieb.* . . 1 15

Die kurze Winterruhe scheint erforderlich, um Kraft für den mächtig aufschiessenden Schaft zu sammeln, über dessen Spitze sich ein, in unzählige Blätter getheilter Schirm wölbt. Alle drei Species seichnen sich noch ausserdem durch ihre schön colorirten Schafte aus.

Anthurium albocostatum *Miq.* 2 —

— amplum *Kth.* (Pothos macrophyllus *Hort. Berol.*) 1 —

— Beyrichianum *Kth.* (A scolopendrioides *Hort.* longifolium *Hort.* . . — 15

— cartilagineum *Kth.* (Poth. cartil. *Dsf.* . . . . — 10-20

— caudatum *Kth.* (Poth. *Hort.*) . . . . . *r* — 8

— cordifolium *Kth.* (Pothos cordata *Willd.* P. macrophyllus *Willd.*) . . . *r* — 10

Anthurium crassinervium *Schott.* (Pothos *Jacq.* P. maximus *Desf.*) 1 —

— digitatum *Schtt.* (Poth. *Jacq.*) . . . *r* — 10

— erythropodum *Miq.* — 10-20

— fissum, *C. Koch.* . $1^1/_3$-3 —

Diese, von mir aus Venezuela importirte Art steht hinsichtlich ihrer Form einzig da; schön glänzend grüne 3—5 fach und mehr getheilte oder mehr handförmige Blätter, werden auf fusslangen Stielen, welche waagrecht vom Strunk abstehen, getragen. Es ist unstreitig eine der originellsten Decorationspflanzen dieses Geschlechts, ja unter der ganzen Familie der Aroideen; ein sehr starkes Exemplar 1′ hoch 2 Thlr., ein dergleichen schwächeres $^1/_2$′ hoch 1 Thlr.

Galeottii *C. Koch* . . — 10

— Hookeri *Kth.* (Pothos acaulis *H. Berol.* A neglectum *H. Amst.* A. Hügelii *Schott.* P. crassinervius *Hook.* P. solitarius *Flor. Flum.*) — 15

— Humboldtianum *H. Blg.* (A. cardiophyllum *Koch* et *Aug.*) . . . . . *r* — 25

— intermedium *Kth.* . 1 —

— Laucheanum *C. Koch* 5 —

— lucidum *Kth.* (Poth. *H. Berol.*) . . . . . — 10

— membranuliferum *Schtt.* 2 15

— microphyllum *Endl.* (Pothos *Hort.*) . . . . — 10

— ochranthum *Koch.* $^2/_3$-$1^1/_2$ —

— Olfersianum *Knth.* (Pothos lucidus *Hort. Ber.*) — 10

— Ottonianum *Kth.* . *r* — 10

— polyrrhizum *C. Koch.* 1 —

— rubrinervium *Knth.* — 10

— radicans *Koch.* . *r* — 10

— sagittatum *Kth.* (P. suaveolens *Desf.*) . . — 10

— spec. Impertor . 5 —

— — e Mexico . *r* — 15

— — Mirador No. I *r* — 10

— — — No. II *r* — 10

— — Venezuela . *r* — 15

— trinervium *Kth.* . — 20

— undulatum *C. Koch* et *Bouché* (A. Harrissii *Hort.*) 1 15

— variabile *Knth.* (helleborifolium *Hort. Erf.* jatrophaefolium *Hort. Belg.* Pothos en-

Thlr. Ngr.

neaphyllus et heptaphyllus *Flor. Flum.*) . . . . — 10-15
Anthurium varians *Miq.* . — 25
— violaceum *Schott.* var. latifolia (Pothos violaceus *Swet.* Pothos michrostachyus *Willd.* Dracontium scandens *Aubl.* Dr. repens *Descourt.*) — 10
— Wildenowii *Kth.* (Pothos lanceolatus *Willd.*) . — 15
*k* Arisaema ringens *Schott.* Sieboldi *Friese,*) . . . 2 —
*k* — atrorubens *Bl.* (Arum *Ait.* Arum triphyllum *L.*) . — 5
— Sieboldii praecox *Sieb.* — 20
*Fr.* Arum maculatum *L.* . — 5
*k* — albispathum . . . — 10
*k* italicum *Mill.* (immaculatum *L.* B.) . . . . . — —
*k* — pictum (corsicum *Loisel.* balearicum *Boohoz*) buntbl. — 10
— sp. de Caracas . — 20
— triphyllum *L.* . . . — 10
*Fr.* Atherurus tripartitus . — 5
Caladium arboreum *H. B. Kth.* 1 10
* — argyrospilum *Chant.* et *Lem.* 1 15
* — Argyrites *Chant.* et *Lem.* (Humboldtii *Schott,*) . 2 —
— Belleymei *Chant.* et *Lem.* (Noch grösser und schöner wie Argyrites) . . 4 —
* — bicolor *Vent.* (Arum *Ait.*) — 10-20
— — *W.* picturatum — 15
* — — splendens . . 1 —
* — Brogniartii *Chant* et *Lem.* 2 —
* — Chantini *Lem.* . . 2 —
— concolor, *C. Koch.* . — 15
— discolor *Hort.* . . — 15
— Engeli *Karst.* . . . — 15
— Gaehrdtii *C. Koch.* (C. Rogieri *Chant.* et *Lem.* . 1 —
* — haematostigmum *Kth.* — 15
— marginatum *C. Koch.* thripedestrum *Chant.* et *Lem.* — 15
* — Houlletii *Chant.* et *Lem.* 2 —
* — marmoratum *L. Mathieu.* — 15
* — Neumanni *Chant* et *Lem.* 1 15
* — pictum *D. C.* . . . 1/2-1 —
**k* — picturatum *C. Koch.* . — 10
* — Poecile *Schott.* . . . — 15
— smaragdinum *K. & B.* — 15
— spec. Sellow . . . — —
* — Verschaffelti *Chant.* et *Lem.* 1 —
*k* — violaceum *Desf.* . . — 5-15

Die mit Sternchen bezeichneten, deren Blätter oft durchscheinend mit den feurigsten Farben überzogen, sind unstreitig das Köstlichste, was die Natur in bunten Blättern schuf. Ihre Vollkommenheit erlangen sie jedoch im freien Grund der Warmhäuser, oder durch mehrmaliges vorsichtiges Verpflanzen in grosse Töpfe mit nahrhafter Erde, die meisten bringen auf diese Weise Blätter von über zwei ' Durchmesser, Hierher gehört noch Dieffenbachia Seguina picta.

*k* Colocasia antiquorum *Schtt.* (Arum Colocasia *L.*) . — 5-15
— esculent *Schott.* (Caladium *Vent.* Arum *L.* A. vermitoxicum *Flor. Flum.* A. peltatum *b. Lam.*) . . — 5-15
Colocasia euchlora *C. Koch.* 1 —
— Nymphaefolia *Bnth.* (C. esculenta *Lour.* Cal. *Vent.* Arum *Roxb.* . . . — 10
Dieffenbachia costata *Karst.* 1 —
— integrifolia *Hort.* . 2 —
— lineata *Koch* et *Bouché.* 1 —
— robusta *Koch* et *Bouché* (Aglaonema *Hort. Petrop.*) — 15
— Seguina *Schott.* (Ar. *L.* Caladium *Vent.*) . . — 5-20
— — *b* picta . . 1/2-5 —
— variegata *Hort.* (D. liturata *Schott.* . . . — 10-15
Gonatanthus sarmentosus *Bl.* (Caladium *h Berol.* Cal. pumilum *Don.* Colocasia pumila *Benth.*) . . . . *k* — 5
Heteropsis ovata *Miq.* (Monstera dilacerata *C. Koch.*) . — 10
— surinamensis *Miq.* — 10
— sp. e Surinam . — 15
Homalonema album *Hook.* . 2 —
— coerulescens *Hssk.* 2 —
— rubrum *Hassk.* (rubescens *Knth.* rubens *C. Koch.*) — 20
Lasia heterophylla *Schott.* (Dracontium spinosum *Linn.* Pothos. *Roxb,*) . . . . — 10
Massowia cannaefolia *C. Koch.* (Pothos odorata *Anders.* P. *Dryandr.* Spatyphyllum *Schtt.* Sp. candicans *Poepp.* Monstera *Knth.*) . . . . 2 —
— dilacerata *Hort.* . — 10
Monstera acuminata *C. Koch.* (M. dimidiata *Hort.* Phil. inaequale *Hort.* . . . — 10
— Adansonia *Schott.* . — 10
— deliciosa *Liebm.* (M. Lennea *C. Koch.* Philod. pertusum *Kth. & Bché.*) . . 2-5 —
— lingulata *Schott.* . — 20
*k* Orontium aquaticum *Linn.* — 15
— japonicum *Wb* . 1/2-1 —
*k* — — fol. marg. . 1/2-1 —
Otophyllum semicrenatum *Hort.* — 10
Philodendron asperatum *Hort.* — 20
— crassinervium *Lindl.* (Bauersia nervosa *Hffg.* recurvatum *Hort. Amst.* plantagineum *Hort. Amst.* Caladium Bauersii *Rchb.* Bauersia maculata *Rchb.* Pothos platyneuron *Desf.* Caladium platynervium Arum lanceolatum *Flor. Flum.*) . . . — 20
— crinipes *Ad. Brogn.* (Ph. squamiferum *Poep.*) . *r* — 10
— cuspidatum C. *Koch* et *Bché.* (Dracontium cordatum *Hort. Ber.* b. scandens *C. Koch* et *Bouché.*) . . — 10
— erubescens *C. Koch* — 15
— eximium *Schott.* . — 15
— fenestratum *Lind.* 1 —
— Fontanesii *Kth.* (Caladium brasiliense *Desf.* . 2/3-1 —

Thlr. Ngr.

Philodendron grandifol. *Schott.* (Ar. *Jacq.* Caladium *W.*) — 10
— heliconiaefolium *Hort.* — 10
— Imbé *Schott.* (Calad. *H. Berol.* Colostigma *Schott.*) — 10
— hastatum *C. Koch & Sello* (P. Simsii *Hort.* Caladium *Hort.*) . . . . . . — 25
— inciso-crenatum *Kth.* (laciniosum *Schott.*) . . — 10
— microphyllum *Hort.* — 10
— ornatum *Schott.* . — 10-20
— pedatum *Kth.* (Cal. *Hk.* C. lacerum *Hort. Berol.* P. quercifolium *Hort.*) . *r* — 10
— pinnatifidum *Schott.* (Ar. *Jacq.* Calad. *W.*) . $^{1}/_{2}$-1 —
— quinquenervium *Miq.* — 10-20
— Riedelianum *H.* (Syngonium *Schott.*) . . . — 10-20
— Simsii *Kth.* (Fontanesi *Hort.* Calad. grandifol. *Sims.* C. Simsii *Hook.*) . . 1 —
— spec. e Meridor . 2 —
— tripartitum *Schott.* (A. *Jacq.* Calad. *W.*) . . . — 10-20
Plectogyne lurida (Macrogyne) variegata *Lk.* (Aspid. el a tior. *Morr. & Dcsne.* var. striata) . . . . . . — 5-15
Pothos argyrea *r* zierlich gefleckt 1 —
— Dictamnus . . — 15
— lanceolata *L.* (Anthurium *Knth.*) . . . . . . — 10-20
— spec. . . . . . . — 15
*k* — viridis *Parment.* (Anthurium *C. Koch*) . . $^{1}/_{3}$-4 —
*k* Remusatia vivipara *Schott.* (Ar. *Rxb.*, Calad. *N. E.*) . — 5-10
*k* Richardia aethiopica *Kth.* (Calla *L.* Zantedeschia *Spr.*) — 5
*k* Sauromatum pedatum *Schtt.* (Arum *Fisch.*) . . — 8
Scindapsus glaucus *Schott.* (Pothos glauca *Wall.* non *Lk. & Otto* Pothos Wallichii *Steud.*) — 15
— pertusus *Schott.* (Monstera *Schott.*) . , . — 20
— pinnatifidus *Schott.* (Ph. giganteum *H. Belg.*) . $^{2}/_{3}$-$1^{1}/_{2}$ —

Thlr. Ngr.

Solenosterigma bicolor *Kl.* (Philodend. micans *Kl.*) . *r* — 10
Spathiphyllum Fredderiksdalii *C. Koch* . . . . . 3-6 —
— lanceolatum *Schott.* (Draconitum lanceaefolium *Jacq.*) 6 —

Diese noch so wenig verbreitete Gattung wird, so sie erst bekannter ist, viel Aufsehen erregen, denn zu Decorationen giebt es kaum etwas Auffallenderes.

Syngonium auritum *Schott.* (Ar. *L.* Caladium *Vent.* Philod. *Hort.*) . . . . . — 10
— podophyllum *Schott.* — 15
— Wendlandi . . *r* 1 —
Zierlich in der Mitte gezeichnet.
Tacca pinnatifida *Forst.* . 8 —
Typhonium divaricatum *Desn.* (Arum *L.* A. trilobatum *bot. Mag.* A. diversifolium Cat. *Hort. Buitenz.* A. orixense *R. Br.* Arisarum amboinense *Rmph.*) . . . . . *k* — 5
Xanthosoma appendiculat *Schott.* — 10
— atrovirens *K. & Bché.* — 5-10
*k* — belophyllum *Kth.* (Ar. sagittaefolium *L.*) . — 10
*k* edule *Schott.* (Calad. *Mag.*) — 10
— hastaefolium *C. Koch.* (Acontias *Schott.* Arum sagittaefolium *Lk.* Calad. brasiliense *Desf.*) . . . . — 5-10
— pilosa *C. Koch.* . — 10
— sagittifolia *Schott.* (Mafaffa *Hort. Belg.* Arum *L.* Calad. *Vent.* C. *Hort.* Cal. sag. *Mich* Peltandra *Raf.*) . — 5-10
— versicolor *Moritz* . — 10
— violaceum *Schott.* (janthinum *C. Koch.* sagittifolium *Willd.* Caladium *Desf.* . — 5-10
— xantorrhizon *C. Koch* (Arum *Jacq.* Cal. *W.* X. Jacquini *Schott.* in melet, nec. in h. Schönbrunn) . . 1 —
Zantedeschia cordata *C. Koch* (Homalonema *Schtt.* Dracontium *Hort.*) . . . . — 10

# Begonia

## (im weitesten Sinne).

Auch in diesem Jahre ist meine Sammlung durch manche ausgezeichnete Neuheit bereichert worden. Unter den durch Blattschmuck sich auszeichnenden Arten verdienen besonders die Varietäten von splendid. & Rex, der besonderen Erwähnung.

Die mit einem † bezeichneten lassen sich als Blattpflanzen besonders empfehlen.

Thlr. Ngr.

Beg. albo coccinea *Hook* . — 15
— Amtsrath Danneel *Passw.* 1 —
— — Fischer. *P.* . 1 —

Thlr. Ngr.

† argentea *V.H.* (Gaerdtia *Kl.* aculeata *Walp.*) . . — 5
argyrostigma *Fisch.* (Beg. ma-

Thlr. Ngr.

culata *Rddi.* Gaerdtia maculata. *Kl.*) . . . — 5
†aucubaefolia *H. Berol.* . — 5
auriformis *V. H.* (Bachia) . — 10
brasiliensis *Kl.* (Wagneria *Kl.*) — 10
Bijou de gand *V.* . . . 1 —
Billeterii *Hort.* . . . — 10
Carl Encke *V.* . . . 1 —
† carolineaefolia *Regel.* (Giroudia *Kl.* cauliflora crassicaulis *H.*) — 10

Sehr interessante Art mit gefingerten Blättern.

†Carolina indivisa *Hort.* . — 10
castaneaefolia *Otto & Diet.* (Titelbachia *Kl.*) . . — 5
cinnabarina hybrida . . — 10
conchaefolia *Dietr.* (B. scutellata *Lieb.* Giroudia *Kl.* cochleata *Hort.*) . . . . . — 5
†Dirixii *H. Belg.* (B. hernandiaefolia *Hort.* non *Hook.*) . — 10
*k* discolor *R. Br.* (Knesebeckia *Kl.*) . . . . . . — 5
Dominica *Liebig* . . . — 8
Dregei *Otto & Dietr.* (B. parvifolia *Meyer.* Augustia *Kl.*) — 5
Eldorado *Liebig.* . . . — 8
Elisabeth *Liebig.* . . . — 8
Elise Thomas *D.* . . . — 15
eriolepis . . . . . — 8
ferruginea *Dryand.* (Stiradotheca *Kl.*) . . . . . . — 10
Finleysoniana *Wall.* . . — 8
Frau Marie Fontaine *Lieb.* . — 8
fuchsioides accuminata *Hort.* — 7
Gabriele *Lieb.* . . . . — 8
grandis *Roll.* (sehr brillant) — 10
†Griffithii *Hook.* (picta *Smith.*) — 10
— annulata . . . — 10-20
Giuseppe Terreni *Lieb.* . — 8
†heracleifolia *Cham. & Schldl.* (var. nigricans *Hort.* Begonia punctata *Kl.* nigrescens *Hort. Belg.* riciuifolia maculata *Hort.*) . . . . — 8

Grosse eingeschnittene Blätter, auf hellgrünem Grunde schwarzgrüne Zeichnung.

Herzogin von Sagan *D.* . — 15
Hildegard *Lieb.* . . . — 8
Hügelii *Hort.* . . . — 5
hybrida argenteo-guttata . — 10
— amabilis *Lind.* . . — 15
— Deuringerii *Hort.* . — 8
— Lazuli (argentea var.) — 10
— Miranda . . . — 10
— Mme. Troubetzkoi . — 10
— Mme. Verschaffelt *Vrsch.* — 10
— Regina *Miellez.* . . — 15
†hydrocotylaefolia *Grah.* (Giroudia *Kl.* erythrophylla *Hort. Amst.*) . . . . . — 5-10
— Warzewiczii *h. Berol.* — 5
incarnata *Lk. & Otto.* (B. insignis *Grah.* Knesebeckia *Kl.*) — 5
Ingenieur Bodson . . — 10
Isis *Roll.* . . . . . — 15
Krauseana *Lieb.* . . . . — 8

Thlr. Ngr.

jatrophaefolia *Hort.* . . — 15
laciniata . . . . . . — 10
La Dea *Lieb.* . . . — 8
† laetevirens *Hort.* . . — 8
La Peyrousi *V. Houtte.* . — 7

Eine der am dankbarsten vom Decbr. bis März blühenden B. mit schönen glänzenden Blättern.

† lobulata *Hort.* . . . . — 8
lucida *Kth.* (Gaerdtia *Kl.* B. Kunthiana *Walp.*) . . . . — 8
margaritifera *Lieb.* . . — 8
Martiana *Lk. & Otto.* (diversifolia *Grah.*) . . . . — 8
† manicata *Vis.* (Giroudia *Kl.*) — 5
miniata *Planch. & Lind.* (rosea *Hort.*) . . . . . — 5
— palmata . . . . — 10
Mme. Danneel *P.* . . . 1 —
— Thibaud *V.* . . . 1 —
Moehringii *Rgl.* . . . — 8
Moschkowitzi-Wagneri . — 10
Mr. Bernhard Leon *V.* . 1 —
Natalensis *Hook.* . . . — 5
nebulosa *Roll.* . . . — 10-20
nitida *Dryand.* . . . — 5
Nymphe *Lieb.* . . . . — 8
odorata *Willd.* . . . . — 5
† pannosa *Hort.* . . . — 8
papillosa *Grah.* (Knesebeckia *Kl.*) — 5
† peltata *Otto & Dietr.* (Rachia *Kl.*) — 5
picta vera! *Smith.* . . — 10
platanifolia *Schott.* . . — 10
† Porteriana *Hort.* . . . — 10
Prestoniensis *Moore.* (hybr.) — 5

Beide dankbare Blüher mit scharlachfarbenen Blumen.

princeps *Hort. Berol.* . . — 15
Professor Lemaire *V.* . . 1 —
† pruinata *N. Berol.* . . — 8
pulchella *Lieb.* . . . — 8
Putzeysii *Hort.* . . . — 8
ramentacea *Rost.* . . . — 8
† reticulata *Gardn.* . . — 5
† Rex *Lind.* . . . . — 5
— Leopardina . . . — 10-20
6 Stück 1 20
— magnifica *Liebig* . — 10-20
6 Stück 1 20

Robuster als R., mit viel schärfer markirten Abzeichnungen und ausserdem am äusseren Rande nochmals weiss getupft. Sie macht dem Züchter alle Ehre!

— Queen Victoria *Lind.* — 10-20

Mit sehr brillanter Zeichnung.

ricinifolia . . . . . — 8
† Roylei *Koch.* . . . . — 10
— laciniata . . . — 15

Der B. Griffithii sehr ähnlich und eben so schön.

rubro-venia *Hook.* . . . . — 5
rutilans *Hort.* . . . . — 5
sanguinea *Raddi.* (Pritzelia *Kl.*) — 5
Saundersiana *Hort.* . . . — 8

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Saxonia *Lieb.* | — | 8 |
| Seemanni | — | 8 |
| semperflorens *Lk. & Otto.* | — | 5 |
| Seriosa *Lieb.* | — | 8 |
| smaragdina *Lieb.* | — | 8 |
| spathulata *Haw.* (B. nervosa *Dsf.* cucullata *W.)* | — | 5 |
| †spec. e Brasilia *H. Berol.* | — | 7 |
| † — e Java (Bergmanni) | — | 10 |
| — e Meridor | — | 12 |
| — fol. argentea | — | 20 |
| †splendida *C. Koch.* | — | 10 |
| † — argentea | — | 10 |
| † — Knerki *C. Koch.* | — | 15-30 |

Brillant durch die, mit scharlachrothen Härchen dichtbesetzten Ränder!!!

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| †Stelzneri *Hook.* (Reichenheimia *Kl.)* | — | 10 |

Die jungen Blätter könnte man leicht für rothen Plüsch halten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| †stigmosa *Lindl.* (Giroudia *Kl.)* | — | 8 |
| †Thwaitesii *Hook.* (Reichenheimia *Kl.)* | — | 15 |

Köstliche Färbung der Blätter lassen sie selbst durch die neueren nicht verdrängen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Thalassina *Lieb.* | — | 8 |
| Titania *Lieb.* | — | 8 |
| †tomentosa *Schott.* (Wagneria *Kl.)* | — | 10 |
| undulata *Hook.* (Gaerdtia *Kl.)* | — | 5 |
| Urania | — | 10 |
| †Verschaffelti *Regel.* | — | 8 |
| verucosa | — | 5 |
| virginalis *Lieb.* | — | 8 |
| xanthina *Hook.* (var. gandavensis *V. Houtte.)* | — | 8 |
| † — argentea | — | 8 |
| † — argyrea *C. Bouché.* | — | 8 |
| † — atrorubens *C. B.* | — | 8 |
| † — laetevirens *C. B.* | — | 8 |
| † — lucida *C. B.* | — | 8 |
| † — Kaiserin Elisabeth *Abel.* | — | 10 |
| † — marmorata *v. H.* | — | 5 |
| † — Reichenheimii *Hort.* | — | 10 |
| † — — marmorea *H. v. Htt.* | — | 8 |
| † — viridis *C. B.* | — | 8 |
| zebrina *Hort.* (Pritzelia *Kl.)* | — | 5 |
| — pallida *Hort.* | — | 5 |
| — purpurea *Hort.* | — | 5 |
| — rubra *Hort.* | — | 5 |
| — sanguinea *Hort.* | — | 8 |
| zeylanica | — | 10 |

# Bromeliaceae.

Dankbares Blühen, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blüthenähren, die Billbergia und Pitcairnia, durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter. Bezüglich der Cultur passen sie sehr gut ins Orchideenhaus.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acanthostachys strobilacea *Lk. Kl. O.* (Hohenbergia strobilacea *Schult.)* | — | 5 |
| Aechmea discolor *Hook.* | — | 20 |
| — farinosa *Hort. Belg.* (agglomerata) | — | 20 |
| — fulgens *Brogn.* | — | 20 |
| — glomerata *Hort.* (fulgens *A. Br.* var.) | 2 | — |
| — hyacinthiflora | 2 | — |
| — miniata *Hook.* | 1 | 15 |
| — — discolor *v. Htt.* | 2 | — |
| — splendens | 2 | — |
| Agave americana *L.* fol. var. | 2 | — |
| Billbergia amoena *Lindl.* | — | 10 |
| — clavata *Lindl.* (Bromelia melanantha *Ber.* | — | 10 |
| — discolor *H. Belg.* | — | 20 |
| — farinosa *Hort.* | — | 15 |
| — iridifolia *Lindl.* | — | 5 |
| — Leopoldii *Hort.* | 1 | — |
| — Liboniana *Lem.* | 1 | — |
| — Loddigesii *Steud.* | 1 | — |
| — Mayendorfi | 4 | — |
| Billbergia Moreliana *Brngt.* | — | 10 |
| — nigra *Hort.* | 1 | 15 |
| — Quesneliana *A. Brogn.* | 2 | — |
| — rosea *Hort.* | 2 | — |
| — splendens *Hort.* | 1 | — |
| — thyrsoidea *Mart.* | — | 20 |
| — tinctoria *Mart.* | — | 10 |
| — Wiotii | 3 | — |
| Bonapartea gracilis *Sweet.* | 4 | — |
| — Hystrix | 2 | — |
| — robusta | 3 | — |
| Bromelia Carolinae *Beer.* (Nidularium Meyendorffi *Reg.*) | 4 | — |
| — Commelyniana *de Vriese.* | 2 | — |
| — humilis *L.* | — | 10 |
| — Karatas *L.* | 1 | — |
| — sp. e Brasilia No. 1. | 1 | — |
| Caraguata lingulata *Lindl.* | 1 | — |
| Dasylirion glaucum | 2 | — |
| — nova spec. Texas | 3 | — |
| Fourcroya gigantea *Vent. H.* (Agave foetida *L.* | 5 | — |
| Milinonia rubiginosa *H. Belg.* | — | 15 |
| Gutzmannia picta *Hort.* (Nidul. fulg.) | 3 | 15 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Gutzmannia tricolor *R. & P.* | 1 | — |
| Hechtia spec. *Warscewicz* . | — | 15 |
| Lomatophyllum spec. . . | 1 | — |
| Macrocordium strictum *Beer.* | — | 15 |
| — melonanthum *Beer.* | — | 15 |
| Neumannia imbricata *Brogn.* | — | 15 |
| Nidularia Sheremetiewii *Regl.* | 4 | — |
| Pholidophyllum zonatum *Vis.* (Tillandsia zonata var. viridis *Hort.*) . . . . . | — | 10 |
| — fuscum *Vis.* (Till. zon. β fusca *Hort.*) . . | — | 10 |
| †Pitcairnia albucaefolia *Schrdr.* | — | 10 |
| — angustifolia *Ait.* . | — | 15 |
| — bromeliaefolia *Ait.* . | — | 10 |
| — flammea *Mart.* . | — | 10 |
| — flavescens . . | 1 | — |
| † — furfuracea *Hook.* (intermedia *Hort.*) . . . | — | 10-20 |
| — latifolia *Ait.* . . | — | 10 |
| — muscosa *Mart. Schult.* (Puya leiolema *H. Petrop.*) | — | 10 |
| — pruinosa *H. B.* . | — | 10 |
| Pitcairnia punicea *Scheidw.* | — | 5-10 |
| — ramosa *Jacq.* fil. . | — | 10 |
| — speciosa *Hort.* . | — | 10 |
| — suaveolen *Lindl.* . | — | 5 |
| — sulphurea *Andr.* . | — | 15 |
| — undulatifolia *Hook.* . | — | 15 |
| — xanthocalyx *Mart.* | — | 15 |
| Pourretia mexicana *Hort.* . | 2 | — |
| — truxillensis *Lind.* . | — | 20 |
| Puya Altensteinii *Otto & Dietr.* | — | 5-10 |
| — aurantiaca *H. Vindob.* | — | 10 |
| — flavescens *Hort.* . | — | 10 |
| — Funkiana *Lind.* . | — | 10 |
| — Giroudiana . . | — | 15 |
| — maidifolia *Morr.* . | — | 10 |
| — undulata *Ch. Lehm.* | — | 10 |
| Tillandsia bulbosa *Hook.* . | 3 | — |
| — incarnata . . | 2 | — |
| — nana *Hort.* . . | — | 10 |
| — Schüchtii *Berr. & Fenzl.* | — | 10 |
| — spec. Brasilien . | 3 | — |
| Vriesea speciosa *Hook.* (Tillandsia splendens *Ad. Brogn.*) | 1-3 | — |

# Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blüthenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von microscopischer Kleinheit an, sich in den mannichfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen emporschwingen, und mit jenen um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen! ! !

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acrostichum crassinerve *Kze.* (conforma *Lk.*, Elaphoglossum *J. Sm.*) . | — | 20 |
| — lomarioides . . . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| — melanopus *Kze.* . . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| — simplex *Swt.* (Elaphoglossum *Schott.* Olfersia *Pr.*) . . . | — | 20 |
| — viscosum *Sw.* (Olfersia *Pr.*) . . . . . . . . | 1 | — |
| Adiantum aethiopicum *L.* (trigonum *Labill.*) . . . . . . . | — | 10 |
| — affine *Wild.* . . . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — assimile *Swz.* (non *Hort.*) . . . . . . . . . | — | 10 |
| — brasiliense *Raddi* . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — Capillus *L.* . . . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — caudatum *L.* . . . . . . . . . . . . . | 1 | 15 |
| — concinnum *H. B. K.* . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — cuneatum *Langsd. & Fisch.* . . . . . . . . . | — | 5 |
| — curvatum *Klfs.* . . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — denticulatum *Sw.* . . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| — formosum *R. Br.* . . . . . . . . . . . | — | 5 |
| — fulvum *Rout.* . . . . . . . . . . . . | — | 15 |
| — intermedium *Sw.* (fovearum *Raddi.* triangulatum *Klfs.*) . | — | 15 |
| — macrophyllum *Swz.* . . . . . . . . . . . | — | 15 |
| k — Moritzianum *Lk.* . . . . . . . . . . . . | — | 5 |
| Fr. — pedatum *L.* . . . . . . . . . . . . . | — | 15 |
| k — pubescens *Schk.* (plicatum *Klfs.*) . . . . . . | — | 5 |
| k — setulosum *Sm.* (affine *W.*) . . . . . . . . . | — | 5 |
| — tenerum *Sw.* . . . . . . . . . . . . . | — | 5 |
| k — tetraphyllum *H. B. K.* (Joverianum *H. Angl.*) . . . . | — | 10 |
| — trapeziforme *L.* (rhomboideum *Schk.*) . . . . . . | — | 10 |
| k Allosorus falcatus *Kze.* (Pteris *R. Br.*, Platyloma *J. Sm.*, Pl. Brownii *Sm.*) | — | 5 |
| — flexuosus *Kanef.* . . . . . . . . . . . . | — | 10 |
| Alsophila vide Baumfarrn. | | |
| Aneimia laciniata *Lk.* (Aneimidiction *Pr.*) . . . . . . . | — | 20 |
| — Mandisiana . . . . . . . . . . . . . | 3 | — |
| — media *Lk.* . . . . . . . . . . . . . | 2 | — |
| — Phyllitites *Sw.* (Aneimidiction *J. Sm.*) . . . . . . | — | 10 |
| Angiopteris vide Baumfarrn. | | |
| Anisogonium spec. . . . . . . . . . . . . . | 2 | — |
| Aspidium arbortivum *Bl.* . . . . . . . . . . . . | 3 | — |

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| | Aspidium albo-punctatum *Willd.* | 2 | — |
| *Fr.* | — bulbiferum (Cystopteris) | — | 10 |
| | — Brownii *Spenner.* | — | 15 |
| | — canariense *A. Br.* | — | 15 |
| | — chrysolobum *Klfs.* | — | 10 |
| *k* | — coriaceum *Sw.* (capense *Sw.*, Tectaria Calahuala *Cav.*, Ruhmora ispidioides *Raddi*, Polypodium argentatum *Jacq.*) | — | 7 |
| | — cuspidatum | — | 15 |
| *k* | — decursive pinnatum *Kze.* (Polypodium *v. Hall*, Lastrea decurrens *J. Sm.*) | — | 5 |
| | — dilaceratum *Kze.* | — | 20 |
| | — Fadyenii *Mett.* (Fadyenia prolifera *Hk.*, Asplenium proliferum *Sw.*) | — | 20 |
| *k* | — falcatum (Cyrtomium falcatum *Lk.*) | — | 5 |
| *k* | — Foenisecii *Lowe.* | 2 | — |
| | — Forsterii *Kze.* (nigropus *Hort.*) | — | — |
| *Fr.* | — Lonchitis *Sw.* | — | 10 |
| | — macrophyllum *Sw.* | — | 10 |
| | — molle *Sw.* (Polypodium *Jacq.*, P. nymphale *Schr.*) | — | 5 |
| | — patens *Sw.* (nymphale *Schk.*) | — | 10 |
| | — Plumieri *Kze.* | 1 | — |
| *k* | — proliferum *R. Br.* | — | 25 |
| | — pteropus | — | — |
| | — pubescens *Sw.* | — | 15 |
| | — quinquangulare *Kze.* | — | 15 |
| | — refractum *R. Br.* | — | 12 |
| | — reptans v. gracile | — | 15 |
| | — — *B.* radicans *Mett.* | — | 15 |
| *kFr.* | — Sieboldii *Hort. Gand.* | — | 15 |
| | — trifoliatum *Tw.* | — | 10 |
| *k* | — uliginosum *Ker.* | — | 10-20 |
| | — unitum *Swe.* (Nephrodium *Schott.*) | — | 15 |
| | — vestitum *Sw.* | 1 | — |
| | — violascens *Lk.* | — | 10 |
| | Asplenium arborescens *Mett.* (Diplazium *Sw.*, Callipteris *Bory*) vide Bmf. | | |
| | — asperum (Diplazium *Bl.*) | 2 | — |
| | — Belangeri *Kze.* (Darea *Bory*) | — | 10 |
| | — Blumei *Bengsm.* (Diplazium marginatum *Bl.*) | 2 | 20 |
| | — Brownii *Sm.* (Allantodia australis *R. Br.*, Athyrium australe *Pr.*) | — | 20 |
| *k* | — bulbiferum *Forst.* (Caenopteris *Desv.*) | — | 10 |
| | — caudatum *Forst.* (Tarachias *Pr.*) | — | 10 |
| | — celtidifolium *Mett.* (Diplazium *Kze.*) vid. Bmf. | | |
| | — cicutarium *Swt.* (Caenopteris *auct.*, Darea *auct.*) | — | 10 |
| *k* | — crenulatum *Pr.* (Nidus *Raddi*, serratum *Lk.*) | — | 15 |
| | — decussatum *Sw.* (Anisogonium spec. I. e Java) | 1 | — |
| | — dimidiatum *Sw.* | 1 | — |
| | — dispersum *Kze.* (bipartitum *Lk.*, sulcatum *Pr.*) | — | 10 |
| | — Dregeanum *Kze.* | — | 10 |
| | — drepanopteron *R. Br.* | — | 15 |
| | — ebenum *Ait.* | — | 7 |
| | — firmum *Kze.* (abscissum *Bl.*) | — | 15 |
| *k* | — flabellifolium *Cav.* | — | 5 |
| *Fr.* | — germanicum *Weiss.* | — | 10 |
| | — glaberrimum *Mett.* | — | — |
| *k* | — Hemionitis *L.* (palmatum *Lam.*) | — | 15 |
| *Fr.* | — Hallerii *R. Br.* | — | 10 |
| *s* | Lasiopteris *Mett.* (Diplazium *Kze.*) | — | 5 |
| | — lucidum *Forst.* | — | 10 |
| | — malabaricum *Mett.* (Diplazium *Spr.*) vd. Bmf. | | |
| | — Nidus *L.* (Neottopteris vulgaris *J. Sm.*) | $^1/_3$-2 | — |
| | — Otites *Lk.* (pulchellum *Pl.*) | — | 10 |
| | — plantagineum *Sw.* (Diplazium) | — | 20 |
| | — polypodioides *Mett.* (Diplazium) | — | — |
| | — pubescens *Mett.* (Diplazium *Lk.*) vd. Bmf. | | |
| | — Shepherdii *Spgl.* (Diplazium *Spr.*) vd. Bmf. | | |
| | — spec. e Java | 1 | — |
| | — — e Mexico | 1-2 | — |
| | — — e Venezuela | 2-4 | — |
| *Fr.* | — Trichomanes *L.* | — | 5 |
| | — tomentosum *Mett.* | — | 20 |
| | — Twaitesii *A. Br.* | 1 | — |
| *k* | — viviparum *R.* (Caenopteris *Berg.* Darea *W.*) | — | 20 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Balantium vide Baumfarrn. | | |
| k Blechnum alpinum *Mett.* (Stegania *R. Br.* Lomaria *Spr.*) | — | 10 |
| — brasiliense *Desv.* (campestre *Hort.*, nitidum *Pr.*) vd. Bmf. | | |
| — — B corcovadense *Raddi* vd. Bmf. | | |
| — campylotis *Schldl.* (Lomaria *Kze.*) | — | 10 |
| — falcatum *Lodd.* (Lomaria *Spr.* Stegania *R. Br.*) | 2 | — |
| — glandulosum *Klfs.* | — | 5 |
| — — B elongatum *Kze.* | — | 10 |
| — gracile *Klfs.* | — | 8 |
| — intermedium *Lk.* | — | 10 |
| k — Lanceola *Sw.* (Bl. lanceolatum *Raddi*) | — | 10 |
| — longifolium *H. B. Kth.* | — | 10 |
| — occidentale *L.* | — | 5 |
| k — Patersonii *Mett.* (Lomaria *Spr.*, Stegania *R. Br.*) | — | 10 |
| — pectinatum *Pr.* (lomarioides *Pr.*, salicifol. *Klfs.*) | — | 10 |
| — polypodioides *Raddi* | — | 10 |
| — triangulare *Spr. Lk.* | — | 10 |
| Ceratopteris thalictroides *Brogn.* (Acrostichum *L.* Furcaria *Desv.* Pteris *Sw.*, Ellebocarpus oleraceus *Klfs.*) | — | 10 |
| Cheilanthes elegans *Desv.* (Myriopteris *Sm.*) | 1 | — |
| — Ellisi | 2 | — |
| — microphylla *Sw.* (micromera *H. Berol.* Adiantum microphyllum *Klfs.*, Nothochlaena cheilanthoides *Spr.*) | — | 10 |
| — nivea *Desv.* (circinalis *Desv.*) | — | 15 |
| — profusa *Kze.* | — | 20 |
| — tenuifolia *Sieb.* (Sieberi *Kze.*) | — | 20 |
| — tomentosa *R. Br.* (Myriopteris *Fée.*) | — | 10 |
| Chrysodium flagelliferum *Mett.* (Acrostichum *Wall.*, Cyrtogonium *J. Sm.* Heteroneuron heterocliton *Fée.*) | — | 10 |
| — repandum *Mett.* (Campium) | — | 25 |
| *Fr.* Cibotium glaucescens *Kze.* (glaucophyllum *Pr.*, Baranetz *J. Sm.* Aspidium *Bar. H. Angl.*, Balantium glaucescens *Kze.*) | 3 | — |
| — Schiedei *Schldl.* vd. Baumfarrn. | | |
| Davallia dissecta *Moore* (Caenopteris) | 1 | 15 |
| — elegans *Sw.* | — | 20 |
| k — pyxidata *Cav.* (Humata *Desv.*) | — | 15 |
| — solida *Sw.* | — | 15 |
| Diacalphe aspidioides | 3 | — |
| Dicksonia cicutaria *Swz.* | — | 15 |
| — dissecta *Swz.* | — | 20 |
| — Lindeni *Hook.* Stark | 5-10 | — |
| — nitidula *Kze.* | — | 5 |
| — rubiginosa *Klfs.* (Sitobolium *J. Sm.*) | — | 10 |
| — tenera *Pr.* (adiantoides *Hort.*, Sitobolium *J. Sm.*) | — | 10 |
| — Zippeliana *Kze.* | — | 15 |
| Didymochlaena lunulata *Desv.* (sinuosa *Desv.*, squamata *Desv.*, truncata *J. Sm.*, Adiantum lunulatum *Houtt.*, Aspidium lunulatum *Houtt.*, Aspidium truncatum *Sw.*, A. squamatum *W.* A. cultratum *Pr.*, A. pulcherrimum *H. Angl.*, Diplaz. pulcherrimum *Raddi*, Lonch. ramosa *Plum.*) vd. Bmf. | 3 | — |
| Elaphoglossum ferrugineum *Ldl.* | 3 | — |
| Gleichenia dichotoma *R. Br.* | 3 | — |
| Gymnogramme ferruginea *Kze.* | 2 | — |
| — javanica *Bl.* (variegata *Miq.*) | — | 20 |
| — Laucheana | 1 | — |
| — sulphurea *Desv.* (Acrostichum *Sw.*) | — | 5 |
| — tomentosa *Desv.* (Hemion. *Rddi.*, Neurogn. *Lk.*, Ceter. barbatum *Pr.*) | — | 10 |
| Hemidyction crinitum (Dictyoglossum *J. Sm.*, Acrostichum *L.*) | 1 | 15 |
| Hemionitis palmata *L.* (Gymnogr. *Mett.*) | — | 20 |
| Hemitelia vd. Baumfarrn. | | |
| Humata immersa *Mett*, (Leucostegia *Br.*) | — | 25 |
| Hypoderris Brownii *R. Br.* | 1 | 10 |
| Hypolepis Endlicheriana | — | 20 |
| — repens *Pr.* (Cheilanthes *Klfs.* Lonchitis *L.*) | — | 7 |
| — tenuifolia *Rddi.* (Cheilanthes dicsonioides *End.*, Ch. arborescens *Sw.*, Dicksonia davallioides *R. Br.*) | — | 10 |
| Lomariopsis scandens *Fée.* (Stenochlaena *J. Sm.*, Acrostichum *L.* Lomaria *W.*, Olfersia *Pr.*, Onoclea *Sw.*) | — | 15 |
| Lygodium circinatum *Sw.*, (Hydroglossum *W.*, Ophioglossum *Burm.*) | 2 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Marattia cicutaefolia *Klfs.* (fracix. *Rddi.*, Raddiane *Schtt.* Gymnoth. sp. *Pr.*) | 4 | — |
| — laxa *Kze.* Dieselbe sehr stark vd. Baumfarrn. | | |
| Marsilea aegyptiaca | 1 | — |
| Meniscium simplex | 2 | — |
| — triphyllum *Swet.* | 2 | 20 |
| Mesochlaena javanica *R. Br.* | — | 20 |
| Microlepia Cassaiana | 2 | — |
| — trichosticha *J. Sm.* (Davallia *Hook.*, Selenidinm divergens *Kze.*) | — | 15 |
| Nephrolepis davallioides *Kze.* (Aspidium *Swz.*) | — | 15 |
| — exaltata *Schott.* (N. neglecta *Kze.*, intramarginalis *Kze.*, Aspidium *Sw.*, Nephrodium *Lk.*, Polypodium *L.*) | — | 10 |
| — pectinata *Schott.* (Asp. *W.*, Nephrodium *L.*, Asp. trapezoides *Schk.*, Nephrod. Schkuhrii *Lk.*) | — | 10 |
| — splendens | 3 | — |
| *k* Nothochlaena tenera *Gill.* | — | 15 |
| Oleandra hirtella *Miq.* | 1 | — |
| — zeylanica *Kl.* | 2 | — |
| — nodosa *Pr.* (Aspidium *W.*) | 2 | — |
| Olfersia cervina *Kze.* | 1 | — |
| *Fr.* Onoclea sensibilis *L.* | — | 8 |
| Osmunda gracilis *Lk.* | — | 10 |
| — regalis *L.* | — | 10 |
| Phegopteris crenata *Mett.* | — | 7 |
| — Cunninghami *M.* | 2 | 20 |
| — divergens *Fée.* | — | 10 |
| — Linkiana *Mett.* (Gymnogramme *Kze.*) | — | 10 |
| — prolifera *Mett.* (Polypodium *Klfs.*) | — | 15 |
| — spectabilis *Mett.* (Polypodium *Klfs.*) | — | 15 |
| — villosa *Mett.* (Gymnogr. *Lk.*, Grammitis *Pr.*, Leptogr. *J. Sm.*) | — | 10 |
| Photinopteris Horsfieldii *J. Sm.* | — | — |
| Platycerium alcicorne *Desv.* (Acrostichum *Sw.*, Neuroplatyceros *Fée*) | — | 15 |
| Polybotrya incisa | 3 | — |
| — Meyenii | — | — |
| — serratifolia *Kl.* | 2 | — |
| *F* Polypodium alpestre *Hoppe* | — | 15 |
| — areolatum *W.* | — | 10 |
| — aureum *L.* (Chrysopteris *Lk.*, Pleopeltis *Pr.*, Plebodium *R. Br.*) | — | 5-10 |
| — appendiculatum *Kl.* | 1 | 10 |
| *k* — Billardieri *R. Br.* (Chrysopteris *Lk.*, Drynaria *J. Sm.*, Phymatodes *Pr.*, Polyp. scandens *Labill.*, P. diversifolium *W.*) | — | 5 |
| — caespitosum *Lk.* | — | 10 |
| *Fr.* — cambricum *Desv.* | — | 5 |
| — crassifolium *L.* (pachyphyllum *Kze.*, macrophyllum *Sieb.*, Anaxetum *Schott.*, Phymatodes *Pr.*, Drynaria *Sm.*, Pleuridium *Fée.*) | — | 10 |
| — cymatodes *Knze.* | — | 15 |
| — ireoides *Lam.* (Drynaria *J. Sm.*, Microsorum irregulare *Lk.*, Phymatodes *Pr.*) | — | 10 |
| — laetum *Rddi.* (Marginaria *Pr.*) | — | 10 |
| — latipes *Lgsdf. & Fisch.* | — | 10 |
| — lepidopodum *Lk.* (Chrysopteris *Lk.*) | — | 20 |
| — Lingua *Sw.*, (Nipholobus *Spr.*, Craspedaria *Lk.*) | — | 10 |
| — longissimum Bl. (melaneuron *Miq.*, nigrescens *Pl.*, rubidum *Kze.*, Drynaria *Sm.*) | — | 15 |
| — lycopodioides *L.* (Pleopeltis lycopod. *Pr.*) | — | 10 |
| — meniscifolium *Lgsdf. & Fisch.* (affine hrt., alb. punctatum *Raddi.* Marginaria *Pr.*, Goniophlebium *J. Sm.*) | — | 15 |
| — musaefolium *Bl.*, (Microsorum *Mett*, Acrostichum alatum *Hort.*) | — | 20 |
| — nitidum *Klfs.*, (Cyrtophlebium *J. Sm.*, Campyloneuron *Pr.*) | — | 15 |
| — Otites *L.* (pectinatum *Hort. Angl.*) | — | 10 |
| — Paradiseae *Lgsdf. & Fisch.* | — | 10 |
| — pennigerum *Forst.* | — | 15 |
| — Plumula *H. B. Willd.* (pectinatum *Schk.*) | — | 25 |
| — Preslianum *Spr.* (longifolium *Pr.* meniscifolium *Lk.*) | — | 10 |
| k — pustulatum *Forst.* (Drynaria *Lk.*) | — | 5 |

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| | Polypodium ramosum *Lk.* | — | 10 |
| | — repens *Swtz.* | — | 10 |
| | — rupestre *Frst.* (Craspedaria *Lk.* Nipholob. *Spr.* N. serpens *Ldl.*) | — | 10 |
| | — sporadocarpum *W.* (Chrys. *Lk.* Chrys. glauca *H.* Phlebod. *J. Sm.*) | — | 15 |
| | — squamulosum *Klfs.* (leucolepis *Kze.* myrtifolium *Lodd.* Phlebod. *J. Sm.* Pleopeltis *Pr.*) | — | 15 |
| | — subauriculatum *Bl.* (P. metamorphum *Kze.* P. Reinwardtii *Kze.*) | — | 15 |
| | — taeniosum *H. B.* (angustifol. *Swz.* dimorphum *Lk.* loreum *Klfs.* spartosorum *Spr.* leucorhizon *Kl.* nodosum *Kl.* solutum *Kl.* gracile *Kze.*, ensifolium *W.*, Marginaria *Pr.*, Campyloneuron cubense *Fée.*, Goniophlebium *Fée.*, Cyrtophlebium *J. Sm.*, Marginaria dimorpha *Lk.*) | — | 15 |
| | — vacillans *Lk.* (repandulum *Klfs.*) | — | 10 |
| | — vestitum *Raddi?* | 2 | — |
| k | — vulgare *L.* | — | 5 |
| | Polybotrya trapezoides *Knze.* | 1 | — |
| | Pteris arguta *Wahl.* palustris *Poir.*, incompleta *Cav.*, Monogonia palustr. *Pr.*) | — | 10 |
| | — argyrea *Moore.* | 1 | 15 |

Schön silberfarbig gestreift.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| | — biaurita *L.* (Campteria *J. Sm.*) | — | 10 |
| k | — crenata *Sw.* | — | — |
| k | — cretica *L.* | — | 5 |
| | — emergens *Lk.* | — | 10 |
| | — felosma *J. Sm.* (nemoralis *Hort.*, Plumieri *Hort.*) | — | 10 |
| | — flabellata *Thbg.* (elegans *Jacq*, paleacea et Hierohelenia *H. Lips.*, arguta *Schldl.*) | — | 15 |
| | — glauco-virens | 2 | — |
| | — geranifolia *Raddi.* (Pellaea *Fée.*) | — | 10 |
| k | — hastata *Sw.* (Cheil. *Kze.*, Adiant. *L.*. Allos. *Pr.*, Cassebeera *J. Sm.*,) | | |
| | — — B contracta *Lk.* | — | 10 |
| k | — — B marcrophylla *Mett.* (Cheilanthes macrophylla *Kze.*, Cheilanth. hastata *Kze.*) | — | 20 |
| | — lata *Lk.* | — | 15 |
| k | — longifolia *L.* (ensifolia *Sw.*, costata *Bory.* vittata *W.*) | — | 5 |
| | — macroptera *Lk.* (intermedia *Klfs.*) | 1 | — |
| | — palmata *K.* v. collina *Rdd.* | — | 20 |
| | — serrulata *L.* (multifida *Poir.*) | — | 5 |
| | — semipinnata *L.* (alata *Lam.*, dimidiata *Bl.*) | — | 15 |
| | — sulcata *Meyen.* | — | 15 |
| | — tremula *R. Br.* (affinis *Rich.*, chrysocarpa *Lk.*) | — | 15 |
| | — tricolor *Lind.* | 1 | 15 |

Schön violett gestreift, diese und argyrea dürfen als die einzigen bunten *F.* in keiner Sammlung mehr fehlen.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| | — tripartita *Rchb. fil.* | 1 | — |
| k | — umbrosa *R. Br.* | — | 15 |
| Fr. | Scolopendrium officinarum *Swz.* (Asplen. scolopendrium *L.*) | — | 10 |
| Fr. | — — D undulatum | — | 15 |
| | Selaginella apus *Spr.* (Lycopodium apodum *L.* brasiliense *Lk.*, Selaginelle albida *Spr.*) | — | 8 |
| | — cuspidata *Lk.*, (pallescens *Kl.*, Lycop. cusp. *Lk.*, pallesc. *Presl.*, circinale *Ch. & S.*) | — | 5 |
| | — — b. elongata *Spr*, (S. sulcangula *Spr.*, cordifolia *Hort.*, Avilae *Karst.*, Palusiana *Hort.*) | — | 8 |
| | — convoluta *Spr.*, (paradoxa *H.*, Petrop. Lycop. convol. *Walk.* Arnott. hygrometricum *Mart.*) | — | 15 |
| k | — denticulata *Kk.* (Lycopd. *L.*) | — | 5 |
| | — erythropus *Spring.* (Lyc. e. *Mart.*, umbrosum *L.*) | — | 5 |
| | — Galeotti *Spr.* (suavis *Kl.* Lycop. stolonifer. & fruticulosum *M. & Gal.*) | — | 8 |
| | — haematodes *Spr.* (Lycop. *n. Knze.*, Selag. filicina *Spr.* Karsteniana *Kl.* dichrous *Hort.*) | — | 15 |
| | — helvetica *Lk.* (Lycopod. *L.* radicans *Schrk.*) | — | 5 |
| Fr. | — inaequalifolia *Spr.* (Lyc. *Hook & Grev.*) | — | 10 |
| | — laevigata *Spr.* (Lycopod. *W.* Willdenowii *Desv.* plumosum *L. & Sw.* Selaginella arborea *s* caesia arborea *Hort.*, uncinata b. arborea *Mett.* altissima *Kl.*) | — | 10 |
| | — Ludoviciana *A. Br.* (apus b. denticulata *Spr.* apothea *Bevis.*) | — | 8 |
| | — Martensii *Spr.* (Lycopod. flabellat. *Mart. & Gal.*, stolonifera | | |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *Lk.*, stellata *Lk.*, sulcata *Knze.*, decomposita *Spr.*, Poeppigiana *Knze.*) | — | 5 |
| Selaginella c. compacta *A. Br.* (S. asplenifolia *Hrt.*, Danielsiana *Hrt.*, Huegelii *Hrt.*) | — | 8 |
| — d. divaricata *A. Br.* (flexuosa *Knze.*, Hoibrenkii *Hort.*) | — | 8 |
| — Pervillei *Spr.* (africana *Hort.*) | — | 15 |
| — pilifera *A. Br.* (lepidophylla *Mett.*) | — | 8 |
| — Poeppigiana *Spr.* (Lycop. P. *Hook. & Gr.* rigida *Hort.*) | — | 8 |
| — pubescens? *Spr.* (Lycop. pubesc. *Wall.* Sel. Vogelii *Mett.* laevigata *Hort.*) | — | 8 |
| — rubricaulis | — | 20 |
| — serpens *Spring.* (Lyc. s. *Desv.*) | — | 8 |
| — sulcata *Spr.* (Lycopod. *s. Desv.* marginata *Gaud.*) | — | 5 |
| — uncinata *Spr.* (Lycopod. *Desv.* caesium *Hort.*) | — | 5 |
| — variabilis *Hort.* | — | 8 |

Eine der originellsten Pflanzen, am Morgen schön grün, Mittags fast rein weiss; auch leuchtendes Lycopodium genannt.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — viticulosa *Kl.* | — | 8 |
| *Fr.* Struthiopteris germanica *W.* | — | 8 |
| Taenitis blechnoides | 2 | — |
| — ophioglossoides *Mett.* | — | 10 |
| — revoluta *M.* | 2 | — |
| Trichomanes radicans *Swz.* | 4 | — |
| *k* Woodwardia aspera *Mett.* (Doodia *R. Br.*, D. rupestris *Klfs.*) | — | 10 |
| *s* — blechnoides *Mett.* (Doodia *A. Cunigh.*, D. maxima *J. Sm.*) | — | 15 |
| *k* — caudata *Mett.* (Doodia *R. Br.*, D. rupestris *Klfs.*) | — | 5 |
| *k* — dives *Mett.* (Doodia *Kze.*) | — | 10 |
| *k* — media *Kl.* (Doodia *R. Br.*) | — | 5 |
| *k* — radicans *Sw.* (stans *Sw.*, spinulosa *Mart. & Gal.*, Blechnum radicans *L.*) | — | 15 |

# Baumfarrn.

Ein Blick auf nachstehende Liste, oder besser — in mein Farrnhaus selbst, wird Jedem die Ueberzeugung aufdrängen, dass es nichts imposanteres geben kann, als einen gut cultivirten, importirten Baumfarrnstamm.

| | Stamm- | | Wedel- | | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe *Fuss* | Stärke *Zoll* | Zahl *Stck.* | Länge *Fuss* | Breite *Fuss* | *Thlr.* |
| Alsophila Humboldti *Kl.* gigantisch! | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 90 |
| — Loddigesii | — | — | — | — | — | 4 |
| — pruinata *Klfs.* | — | — | — | — | — | — |
| — pycnocarpa *Kze.* | $3^3/_4$ | $1^1/_2$ | 6 | 3 | $1^1/_2$ | 100 |
| Ein orginelles Stämmchen von graciösem Wuchse, mit schön getragnen lederartigen Wedeln, seltenstes. | | | | | | |
| — radens *Klfs.* | $^1/_4$ | 2 | 3 | 1 | $^1/_4$ | 6 |
| — senilis *Kl.* | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 80 |
| Angiopteris angustifolia | 1 | 13 | 8 | 13 | 7 | 500 |
| Von staunenswerther Grösse und Schönheit! Kleine à 5-10 Thlr. | | | | | | |
| — pruinosa *H. Amstd.* | — | — | — | — | — | 3 |
| — spec. | $^1/_2$ | $^1/_2$ | 4 | 5 | 3 | 90 |
| — Taysmanniana *Dsv.* | — | — | — | — | — | 2 |
| — Willinkii *de Vr.* | $^1/_2$ | 8 | 6 | 5 | 3 | 90 |
| Aspidium deversum *Sw.* | $^1/_2$ | 2 | 5 | 3 | $^1/_2$ | 5 |
| — Forsterii *Knze.* | — | — | — | — | — | 1 |
| Asplenium arborescens *Mett.* | — | — | 5 | 3 | 1 | 10 |
| — Blumei *Bengsma* | $^1/_2$ | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |

| | Stamm- | | Wedel- | | | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe *Fuss* | Stärke *Zoll* | Zahl *Stck.* | Länge *Fuss* | Breite *Fuss* | *Thlr.* |
| Asplenium celtidifolium *Mett.* | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 30 |
| — malabaricum *Mett.* | 1 | 2 | 4 | 1½ | 1 | 3 |
| — polypodioides *Mett.* | ½ | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 |
| — pubescens *Mett.* | ¾ | 5 | 4 | 4 | 1 | 1—4 |
| — Shepherdii *Spr.* | ¼ | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| — sp. e Mexico | ½ | 1½ | 4 | 3½ | ¼ | 8 |
| kBalantium antarcticum *Pr.* mit 2 Köpfen | 1 | 10 | 7 | 4 | 1½ | 50 |
| Blechnum brasiliense *Dvs.* | 1½ | 4 | 12 | 3 | 1¼ | 45 |
| Kleinere Pflanzen von ½-10 Thlr. | | | | | | |
| — — B corcovadense *Rddi.* | ¾ | 2 | 8 | 1¾ | 10 | 20 |
| Brainia insignis *Hook.* | — | — | — | — | — | 5 |
| Cibotium Schiedei *Schldl.* riesenhaft! | 1½ | 7 | 7 | 11 | 6 | 100-150 |
| Junge Pflanzen 4 Thlr. | | | | | | |
| Dicksonia Lindeni *Hook.* | ¼ | 2 | 2 | 1 | ½ | 5-10 |
| Didymochlaena lunulata *Desv.* | ¼ | 2 | 5 | 2 | 1 | 5-10 |
| Hemitelia horrida *R. Br.* | ¾-1½ | 6 | 7 | 5 | 2 | 40-60 |
| — integrifolia *Kl.* | 2-4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| — Karsteniana *Kl.* | 1¼ | 6 | 5 | 7 | 3 | 50-80 |
| — Klotzschiana *Karst.* imposant! | 2¼ | 8 | 8 | 3½ | 1 | 65 |
| — obtusa *Kl.* | 1 | 4 | 3 | 1½ | 1 | 65 |
| — spectabilis *Kze.* Prachtstämme | 1½-4 | 4-8 | 5-10 | 3-6 | 1-2½ | 30-90 |
| — — — mit 2 Köpfen | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 70 |
| — speciosa | 2 | 8 | 4 | 5 | 2½ | 70 |
| — sp.! excelent! | 1½ | — | — | — | — | 80 |
| Lophosoria affinis *Pr.* imposante Stämme. | 2¾ | 14 | 3 | 9 | 5 | 70-90 |
| Junge Pflanzen 1-4 Thlr. | | | | | | |
| Marattia cicutaefolia *Klfs.* | ½ | 16 | 5 | 4 | 1 | 60 |
| Phegopteris Cunninghami *Mett.* | ¾ | 2 | 6 | 1 | ½ | 10 |
| — Linkiana *Mett.* | ⅓ | 1½ | 3 | 1 | ½ | 2 |
| — spectabilis *Mett.* | ⅙ | 2 | 4 | 1 | ½ | 5 |
| Polypodium spectabile *Hort.* (Phegopteris subincisa *Fée.*) | ¾ | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 |

# Gesneriaceae & Cyrtandreae.

Durch die Zusammenstellung dieser so nahe verwandten Familien glaube ich den Freunden derselben einen Dienst zu erweisen. Sie blühen leicht und sind eben so leicht zu cultiviren: und gehören überhaupt zu den lohnensten nobelsten Sommer- und Herbstflorblumen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Aeschynanthus atrosanguineus *V. H.* | — | 5 |
| — cordifolius | — | 20 |
| — Boschianus *de Vriese* | — | 5 |
| — Devonianus *Hort.* | — | 5 |
| — floribundus *Hort.* | — | 5 |
| — fulgens *Hook.* | — | 10 |
| — grandiflorus *Spr.* (parasiticus *Roxb.*) | — | 5 |
| — javanicus *Hook.* | — | 7 |
| — maculatus *D. C.* ramosissimus *Lindl.*) | — | 7 |
| — marmoratus *Moor.* (zebrina *Hort.* | — | 8 |
| — miniatus *Hort.* | — | 5 |
| — parasiticus *Hort.* | — | 8 |
| — Paxtoni *Lindl.* | — | 5 |
| Aeschynanthus ramosissimus *Wall.* (grandiflora *Hort.*) | — | 6 |
| — Roxburghii *Wall.* | — | 8 |
| — splendens *Lindl.* | — | 10 |
| — zebrinus *V. H.* | — | 5 |
| Alloplectus congestus *Dcne.* | — | 10 |
| — chrysanthus *Pl. & Lnd.* | — | 7 |
| — dichrous *D. C.*, (Schotti *Don.*, sparsiflorus *Mart.*, Besleria dichrus *Sprg.*, B. discolor *Schtt.*, Hypocyrta discolor) | — | 5 |
| — Pinellianus *Ch. Lem.* | — | 5 |
| — Schlimmii *Pl. & L.*, | — | 10 |
| — sp. e. Surinam (Gesneria alata *Hort.*) | — | 20 |
| — speciosus *Hook.* | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Chirita sinensis *Lindl.* | — | 5 |
| — — fol. var. | — | 5 |
| Codonanthe Devoniana *Lem.* | — | 8 |
| Collandra aureo-nitens *Hnst.* (Columnea pilosa *Hort.*) | — | 12 |
| Columnea crassifolia *Hort.* | — | 10 |
| — hirsuta *Sw.* | — | 10 |
| — Schiedeana *Schlchtd.* (Lindeniana. longifl. *Hort.*) | · | 5 |
| Corytholoma (Gesneria) aggregata *Dcn.* | — | 10 |
| — elliptica *Dcen.* | — | 10 |
| — rutila *Dcn.* | — | 10 |
| Diastemma gracilis *Rgl.* | — | 8 |
| — quinquevulnera *Pl.& L.* | — | 5 |
| Dircaea Blassii *Regl.* (Gesn.) | — | 8 |
| — cardinalis *Rgl.* | — | 10 |
| — lateritia *Regl?* (Gesneria *Lindl.*) | — | 8 |
| — — splendens *Hort.* | — | 8 |
| — lobulata *Lem.* | — | 5 |
| — magnifica *Dcne.* | — | 5 |
| Drymonia bicolor *Hort.* | — | 8 |
| — cristata *Micq.* | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Drymonia punctata *Lindl.* (Alsobia *Hanst.*) | — | 5 |
| — villosa *Knth.* | — | 5 |
| Episcea bicolor *Hook.* (Physodeira *Hanst.*) | — | 5 |
| — melittifolia *Mart.* (Skiophila *Hanst.*) | — | 10 |
| Gesneria caracasana *O. & D.* | — | 5 |
| — discolor *Lindl.* (polyantha *D. C.*) | — | 15 |
| — Donkelarii *Lem.* | — | 10-15 |
| — Duc de Brunsvic | — | 15 |
| — fulgens *Hort.* | — | 10 |
| — hybrida *Hort.* | — | 10 |
| — leucantha *Hort.* | — | 8 |
| — macrantha *Hort.* (cardinalis *Lehm.*) | — | 8 |
| — Merckii *Wendl.* | — | 12 |
| — mollis *Hook.* | — | 5 |
| — paluriensis *Hort.* | — | 25 |
| — pendulina *Lindl.* | — | 5 |
| — Scottii *Hort.* | — | 15 |
| — spec. nova | — | 5 |
| — Vergassii *Hort.* | — | 10 |
| — Warczewiczii *Hort.* (Dicyrta *Regl.*) | — | 5 |

## Gloxinien.

à Stück 5 Ngr., à Dtzd. $1^1/_2$ Thlr.

2 Gloxinia hirsuta *Lindl.* (Stenogastra *Hnst.*)
3 — maculata *L'Her.* (Salisia gloxiniaeflora *Rgl.*)

### Varietäten & Hybriden.

63 atrosanguinea.
91 argyroneura (10 Ngr.)
5 Bavaria.
64 Brunnowi.
6 Cartonii *Bot. Reg.*
7 caulescens major *Lindl.*
90 Charles Dickens.
9 Comtesse Clam Gallas *Josst.*
10 — Therese Thun *Josst.*
11 Dr. Gardner *V. Houtte.*
12 Duc d'Isly *V. Houtte.*
92 Duchesse de Croy (10 Ngr)
Eugénie *K.* (10 Ngr.)
81 Exquisite.
13 Fréderic Lenning *V. Houtte.*
14 General Bertrand *V. Houtte.*
15 Goodii.
16 Graf v. Neipperg.
Haakeana *K.* (10 Ngr.)
17 Herzog Georg
83 Josephine Beauharnais.
18 Jostii.
68 labiata.
49 Leonie *V. Houtte.*
20 Lowii (Aledelli).
50 M.-Borsig.
19 Mme. Aglaë Adanson.
84 — Contier.
21 — de Genlis *V. Houtte.*
22 — de Staël *V. Houtte.*
23 Mademoiselle de Sombreuil.
86 Mars Koerten's.
25 maxima.
26 Menziesii coerulea.
8 Merkii
27 monstrosa *Lartey.*
28 Napoleon *V. Houtte.*
nivea annulata *K.* (10 Ngr.)
29 P. G. Hoogeven.
30 praeexcellentissima.
72 Princesse Helène.
31 pulcherrima.
74 pyramidalis multiflora.
32 Richteri.
33 rosea superba.
34 — grandiflora.
87 — mutabilis.
88 roi des belges.
Rubens *K.* (10 Ngr.)
36 rubra grandiflora.
35 Saxonia.
8 superba.
39 Teuchlerii.
Venus *K.* (10 Ngr.)
89 Victoria regia.
41 virginalis.
42 Wendlandii.

### Gloxinien mit aufrechtstehenden Blumen.

Es ist erstaunlich, was man in der Hybridisation der Gloxinien erzeugte, und geben hiervon die mit aufrechtstehenden Blumen das beste Zeugniss, da durch sie eine Form repräsentirt wird, die bei den Species nicht vorkommt.

à Stück 7 Ngr., à Dtzd. $2^1/_3$ Thlr.

43 Adamas oculata *Haak.*
55 Don Pedro.
57 Duc d'Oporto.
58 Etna.
75 G. Geitner, *Rannig. jun.*
76 Gustav Schmidt.
45 Hauptmann Wutke.
52 lineata.
60 Majestica.
59 Mme. Légrelle *d'Hanis.*
53 marmorea.
46 Mars coeruleus *Haake.*
61 Novelty.
78 Petronella.
62 Princesse Marie.
47 Rex igneus.
79 Sidonie.
48 stellata.

---

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Guthnickia mimuliflora *Regl.* | — | 4 |
| — atrosanguinea *Regl.* | — | 4 |
| Heppiella atrosanguinea *Regl.* (Corysanthera *Hort.*) | — | 10 |
| — naegelioides *Lem.* (Gesneria egregia *Versch.*) | — | 10 |

Prächtige und reichblühende Hybride.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Houttea calcarata *Lem.* | — | 5 |
| — pardina *Dcsne.* | — | 5 |
| Hypocyrta gracilis *Mart.* (Aeschynanthus *Hort.*) | — | 5 |
| — pendula | — | 15 |
| Isoloma hirsuta *Dcne.* (Brachyloma) | — | 5 |
| — hybrida Decaisnian. *V. H.* | — | 5 |
| — Krameriana *Lehm.* | — | 5 |
| — longifolia *Lindl.* | — | 5 |
| — picta *Rgl.* | — | 5 |
| — robusta | — | 5 |
| — rubicaulis *Rgl.* var. *Hrt.* | — | 5 |
| — Trianei *Rgl.* (Tydaea elegans *Ldl.*) | — | 5 |
| — vestita *Benth.* | — | 5 |
| — Warszewiczii *V. H.* (hondensis *Dcsne.* var. *W.*) | — | 5 |

Die feurigen Farben, die den Blumen dieses Genus eigen, sind oft mit majestätischer Stellung der Blumenrispen verbunden, und lassen sie mit Recht empfehlen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Klugia Notoniana *D. C.* (zeylanica) | — | 7 |

Blüht äusserst dankbar, und macht bei guter Cultur mit ihren blau und weissen Blumen einen herrlichen Effect.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Kohleria ignorata *Rgl.* | — | 5 |
| — Seemanni *Rgl.* | — | 6 |
| — Wagnerii *Rgl.* | — | 6 |
| Locheria hirsuta *Rgl.* | — | 3 |
| — magnifica *Planch.* | — | 7 |
| — pedunculata *Rgl.* (Achimenes *Benth.*) | — | 1 |
| — Skinneri grandiflorâ | — | 2 |
| Mitraria coccinea *Cav.* | — | 5 |
| Mandirola lanata *Planch. & Lind.* (Koernickea *Rgl.*) | — | 8 |
| Moussonia elegans *Dcne.* | — | 12 |
| — elongata *Rgl.* | — | 8 |
| — formosa *V. Houtte.* | — | 8 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Naegelia cinnabarina *Lind.* (Gesneria *V. H.*) | — | 10 |
| — hybrida Leichtlini | — | 10 |
| — — — guttata *Ortg.* | — | 20 |
| — — — rosalba *Ortg.* | — | 20 |
| — — — sulphurea *Ortg.* | — | 15 |
| — zebrina *Rgl.* (Gesneria *H.*) | — | 5 |
| — — splendens | — | 8 |
| — — Halleri | — | 10 |

Deren prächtiges Blattcolorit macht sie zu den gesuchtesten der Familie.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Nematanthus longipes *D. C.* | — | 8 |
| Niphaea oblonga *Lindl.* (Achim. alba *Hort.*) | — | 1 |
| Plectopoma fimbriatum *Hanst.* (Achimenes gloxiniaefl. *Hrt.* Gloxin fimbr *H.*) | — | 5 |
| Rhytidophyllum floribundum *Ch. Lem.* (Ophianthe abanensis *Hanst.*) | — | 10 |
| Scheeria mexicana *Seem.* (Ach. Chirita *V. H.*) | — | 1 |
| Sciadocalyx Warszewiczii *Rgl.* | — | 8 |
| Seemannia ternifolia *Rgl.* | — | 8 |
| Sinningia floribunda *H. Berol.* | — | 7 |
| — gloxiniaeflora | 1 | — |
| — guttata *Nees* | — | 5 |
| — — purpurea *K. Hamb.* | — | 7 |
| — hybrida Lemoeana | — | 10 |
| — — punctata | — | 10 |
| — punctata *O. Blum.* | — | 10 |
| — villosa *Lindl.* | — | 10 |
| Streptocarpus biflorus *Hrt.* (Rexii *Lindl.* var biflora *Ortg.*) | — | 15 |
| — Gardeni *Hook.* | — | 20 |
| — polyanthus *Hook.* | 1 | — |

Höchst originell, da sie meist nur ein Blatt bringt, welches herabhängend bei fast 12 Zoll Länge, den ganzen Topf bedeckt.

## Trevirania (Achimenes)

à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.

13 amabilis *Rgl.*
66 Ambroise Verschaffelt *Reg.*
Weisser Grund, bläulich angehaucht, mit köstlich dunkelvioletten, strahlenförmigen Adern.

15 Baumanni fulgens *Rgl.*
16 — hirsuta *Rgl.*
17 — lilacina *Rgl.*
18 — oculata *Rlg.*
22 Boeckmanni hirsuta *Rgl.*
60 — rubida.
14 — variegata *Rgl.*
25 — violacea *Rgl.*
27 Carl Wohlfahrt *Rgl.*
78 carminata splendens.
77 Estelle.
79 Christian Deegen.
29 coccinea excelsa.
30 — rosea Beatoni *Rgl.*
31 — — formosa *Rgl.*
32 — — pulchella.
Dazle (20 Ngr.)
71 Dr. Buezod. (5 Ngr.)
Dr. Hopf. (5 Ngr.)
82 Edmond Boissier; milchweiss mit fein violetten Adernetz.

81 Eduard Otto.
35 Escherii *Rgl.*
36 — angustifolia *Rgl.*
21 Estelle. (8 Ngr.)
40 Geitneri *Ranniger.*
26 Gem. (15 Ngr.
135 Georgina. (15 Ngr.)
41 Heerii *Rgl.*
84 Hendersoni.
85 Hofgaertner Marstrand.
87 humilis.
71 Jauregia alba grandiflora.
46 longiflora alba *V. G.* (Jauregia *Warez.*)
47 — candida.
48 — ilicifolia *V. H.*
49 — latifolia.
51 Mackoy. *Rgl.*
55 Mme. Rendatler.
56 Margaretha
61 Meteor (5 Ngr.)
57 Napoleon Rossi. *Rgl.*
4? Parsonii *k* (5 Ngr.)
58 patens *Benth.*
Bläulich lila mit roth getüpfeltem Auge, eigenthümlich neue Färbung, schön rund gebaut.
90 purpurea multiflora.
91 reticulata rosea.
92 rosea elegans.
34 — magnifica (15 Ngr.)
63 sanguinea *Rgl.*
49 Sir Treherne Thomas *Rgl.*
57 Wagneri *Rgl.*

## Tydaea.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 103 | Hillii *Rgl.* (Ach. Kewensis & Hillii *Hort.*) | — | 5 |
| 112 | ocelata *Rgl.* | — | 5 |
| 125 | picta *Den.* (Ach. *Benth.*) | — | 4 |

## Tydaea hybrida.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 93 | Agathe | — | 10 |
| 113 | Comte de Flandre *Versch.* | — | 8 |
| 114 | Comtesse Charlotte *Versch.* | — | 8 |
| | Countess of Jlchester | — | 25 |
| 115 | Duc de Brabant *Versch.* | — | 8 |
| 116 | Duchesse de — *Versch.* | — | 8 |
| 117 | Eckhaudi *V. Htt.* | — | 5 |
| 96 | formosissima *Schm.* | — | 4 |
| 97 | G. Geitner *Schm.* | — | 4 |
| 98 | Gen. v. Zweibrücken *Schm.* | — | 4 |
| 95 | gigantea *Pl. & Lind.* | — | 4 |
| 118 | — grandis | — | 5 |
| 99 | Gräfin Wally von Rechberg *M. Schm.* | — | 4 |
| 119 | Hansteini fulgida *Ortg.* | — | 9 |
| 120 | — laeta *Ortg.* | — | 8 |
| 121 | — nigra *Ortg.* | — | 8 |
| 122 | — tigrina *Ortg.* | — | 8 |
| 126 | Kraus | — | 20 |
| 106 | Lenneana rutilans *Ortg.* | — | 4 |
| 127 | Meyerbeer | — | 10 |
| 128 | Moritz Reichenheim | — | 20 |
| 100 | M. Schmöger *Geitner* | — | 4 |
| 129 | Obergärtner Gireoud *K.* | — | 20 |
| 124 | Ortgiesi *V. Htt.* | — | 8 |
| 130 | Pasewalk | — | 20 |
| 131 | Perle der Tydaeen | — | 10 |
| 132 | Professor Koch *K.* | — | 20 |
| 101 | — C. Seitz *M. Schm.* | — | 5 |
| 133 | Princeps *Laur.* | — | 20 |
| 111 | pulchra argyroneura *Heer.* | — | 4 |
| 105 | — chloroneura *Heer.* | — | 4 |
| 119 | puncticulata *Schm.* | — | 4 |
| 108 | Regeli argentea *Heer.* | — | 4 |
| 109 | — erythrichina *Heer.* | — | 4 |
| 110 | — obscura *Heer.* | — | 4 |

Unter den Gesneriaceen nehmen die Tydaeen den ersten Platz ein, nicht nur dass sie leicht in der Cultur, brillantes Colorit der Blätter mit dem der Blumen vereinen, sondern dass sie wenn ihre Schwestern schon längst verblüht, noch lange unsere Häuser schmücken.

# Melastomaceae.

Theils als Blattpflanzen oder dankbare und schöne Blüher beliebt; zu besserer Durchwinterung und leichterem Blühen ist's gut, sie im Sommer einige Zeit in's Freie zu bringen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Centradenia floribunda *Planch.* | — | 5 |
| — grandifolia *Hort.* | — | 5 |
| — rosea *Lindl.* | — | 5 |

Man sagt nicht zu viel, wenn man sie die dankbarsten Blüher nennt, wesshalb sie auch als Marktpflanzen schon viel gezogen werden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Chaetogastra Geitneriana *Schldl.* | — | 10 |

Diese von mir eingeführte Art blüht im Herbste dankbar im Warmhause mit zollgrossen rosafarbenen Blumen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Clidenia crenata | — | 15 |
| Eriocnema aenea *Naud.* Samenpflanzen | — | 10 |
| Heterodon macrodum | — | 20 |
| Heterocentrum roseum | — | 8 |
| Lasiandra petiolata *Grah.* | — | 10 |

Oeffnet schon im Spätherbst ihre schön dunkelvioletten Blüthen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Medinilla magnifica *Lindl.* | $^1/_2$-1 | — |

Ist wohl die Königin der Familie zu nennen; denn nicht nur ihr graciöser Wuchs, sondern ihre herrliche Blüthentraube von 1 Fuss Länge, macht sie werth, überall cultivirt zu werden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Melastoma brachyodon | 3 | — |
| — coeruleum *Hort.* (Pleroma) | — | 10 |
| — cymosum *Wendl.* | — | 10 |
| — speciosum *Hort?* | 2 | — |

Thlr. Ngr.

Eine der prachtvollsten, sowohl durch änderndes Colorit, vom herrlichsten Scharlach bis fast zum Grün als auch durch die Grösse der Blätter, sowie deren schöne Formen und schnellen Wuchs auszeichnet.

Micranthella lanceolata *Naud.* — 8

Wurde ebenfalls von mir neuerdings wieder eingeführt, dieselbe blüht vom November bis April in endständigen Trauben, Blumen weiss, 1 Zoll gross Sehr empfehlenswerth. Siehe die Berliner Gartenzeitung 1857.

Monochaeton ensiferum *Naud.* — 10
— tenellum . . — 15

Thlr. Ngr

Pleroma Benthamianum *Lindl.* — 10
— heteromallum *Don.* — 15
Rhexia elegans *Hort.* . . . — 8
Sonerilla affinis . . . . — 15
— margaritacea *Naud.* — 20
— — v. albo *Naud.* 1 —
— — *Naud. hybr.* superba . . . 1 —
— zeylanica . . . . — 15

Auf dunkelgrünem Grunde regelmässig weisse, runde Punkte verleihen den Blättern das Ansehen, als seien sie bemalt, aber auch die bei den meisten spec. im Spätherbst in Massen erscheinenden Blüthen machen sie sehr beliebt.

# Orchideae.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farren; denn wass ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoecochilus, Goodyera & Spiranthes, die Natur an Blätterschmuck entzog, das ist in überschwenglichem Maase auf deren Blüthen gefallen, die nicht nur den Farbenreichthum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen, bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; aber auch den feinsten Duft entsenden die meisten ihrer Blumen, und ausserdem bieten sie dem phantasiereichen Geiste viel-Nahrung, durch ihre orginellen tausendfältigen Formen, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brillantesten Schmetterlingen und andern Insecten gleichend, einen bezaubernden, geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur bietet unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfe besonderer Häuser und dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warmhäuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Bekräftigend kann ich dem noch anfügen, dass schon vielseitig gelungene Versuche von selbst solchen vorliegen, denen nur das Zimmer als Treibhaus dient, und so wird denn die Zeit nicht mehr zu ferne liegen, wo man diese allgemein verehrte Gattung in keiner Sammlung unvertreten findet.

100 Stück Torf (von dessen Brauchbarkeit zur Cultur der Orchideen ich mich immer mehr überzeuge) incl. Kiste — bin ich nach wie vor bereit, meinen werthen Correspondenten, mit 1 Thlr. zu berechnen.

Thlr. Ngr.

Acanthophippium bicolor *Ldl.* 2 —
†Acropera Batemanni *Ldl.* Mex. (Gongora *Hort.*) . 1 —
† — Loddigesii *Lindl.* Mex. (Gongora galeata *Rechb. fil.*) $1/2$-1 —
† — — concolor *Ldl.* Mex. 1 —
† — — fuscata *Lindl.* Mex. 1 —
— — intermedia . . 2 —
— — pallida . . 2 —
† — — purpurea Mex. . 1 —
† — — spec. Mex. . 1 —
Aërides crispum *Ldl.* (Brooki *Batem.*) Insul. indic. 12 —
— odoratum *Lour.* (coronatum *Roxb.*) Ostind. . 6 —
— suaveolens *Bl.* Java . 30-40 —
Angraecum distichum *Ldl.* . 1 —
Anisopetalum Careyanum *Hook.* Nepal. . . . . . 1-2 —
†Anoectochilus intermedius *Hort.* Borneo . . . . 4 —

Thlr. Ngr.

Anoectochilus xanthophyllus *Bl.* Java (*Roxburghii*) . 3-5 —

Bedürfen nur einer gegen Staub und trockene Luft schützende Glasglocke, um ebenfalls im Zimmer cultivirt werden zu können.

Barkeria melanocaulon *A. Rich.* et *G.* Mexico . . 6 —
†Bifrenaria atropurpurea *Lodd.* Brasilien . . . 1 15
— aureo-fulva *Midl.* (*Maxillaria Hook.*) Rio Janeiro 1 15
†Bletia gracilis *Ldl.* (Bletilla) Mexico . . . . 5 —
— Gebinae *Ldl.* (Bletilla, Calanthe *J. Lodd.*) Japan 2 —
† — Tankervilleae *R. Br.* (Phajus grandifol. *Lour.* Limodorum Tankervilleae *Ait.*) China . . . . $1/2$-1 —

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Bletia Woodfordii *Hook.* (Phajus maculatus *Ldl.*) Ostind. | 2 | — |
| Brassavola cordata *Ldl.* Jamaica | 1 | — |
| — tuberculata *Hook.* Rio Janeiro | 2 | — |
| Brassia caudata *R. Br.* Jamaica | 1 | 15 |
| — maculata *R. Br.* Jam. | 5 | — |
| — striata *Hort.* Brasilia | 5 | — |
| — verrucosa *Lindl* (Covani *Hort*) Guatemala | 2 | — |
| — Wagneri *Rchb. fil.* Columbia | 3-5 | — |
| Burlingtonia candida *Lem.* | 2 | — |
| — rigida *Lindl.* (Rodr. rigida *Rchb. fil.*) Brasilien | 2 | — |
| — venusta *Lindl.* Rodr. venusta *Rchb. fil.*) Brasilien | 6 | — |
| Catasetum callosum *Lindl.* (Myanthus) La Guayra | 4 | — |
| — mentosum *Lind.* | 5 | — |
| — Naso *Lindl.* Caracas | 5 | — |
| — planiceps *Lindl.* | 3 | — |
| Catleya Aclandiae *Ldl.* Bras. | 5 | — |
| — amethystina *Morr.* St. Catharina (intermedia Grah. var. ameth.) | 4 | — |
| † — citrina *Lindl.* Mexico | 6 | — |
| † — crispa *Lindl.* (Laelia crispa *Rchb. fil.*) Brasilien | 4 | — |
| † — Forbesii *Lindl.* (isopetala, vestalis *Hort.*) Brasil. | 2 | — |
| † — granulosa *Lindl.* Guatemala | 5 | — |
| — guttata *Hook.* Brasil. | 5 | — |
| — — Leopoldii *Versch. & Lindl.* | 10 | — |
| — Harrisonii *Lodd.* Brasilia | 3 | — |
| * — labiata *Lindl.* Brasil. | 5 | — |
| — Perrinii *Lindl.* (Laelia Batem.) Brasilien | 8 | — |
| * — Skinneri *Lat.* Guatem. | 5 | — |
| †Cirrhaea fusco-lutea *Hook.* (saccata *Ldl.*) Brasil. | — | 15 |
| † — viridi-purpurea *Lodd.* Brasilia | 1 | — |
| Coelia Baueriana *Lindl.* (triptera *Don.* Cymbidium *Sw.*) Jamaica | 2 | — |
| Coelogyne fimbriata *Lindl.* (Broughtonia linearis *Woll.*) China | 2 | — |
| Coryanthes Rückerii Venezuela | 6 | — |
| †Cymbidium aloifol. *Sw.* China | — | 20 |
| † — crassifolium *Wall.* Ostind. | 1 | — |
| † — ensifolium *Sw.* China | — | 20 |
| — giganteum *Wall.* (Limodorum longifolium *Ham.*) Nepal. | 4 | — |
| — marginatum *Ldl.* (Maxillaria gracilis *Lodd.*) Rio Janeiro | 2 | — |
| — pumilum *Hort.* China | 2 | 15 |
| † — sinense *Willd.* China | — | 15 |
| — triste *Willd* (Epid. teres *Thunb.* E. triste *Forst.* Louisia teretif. *Gaud.* = trichorrhiza *Hook.*) Japan, Ceylon, Nepal. | 1 | — |
| † — xiphiifolium *Ldl.* China | — | 15 |
| † Cypripedium barbatum *Ldl.* Mont Ophyr | 2 | 15 |
| † Cypripedium insigne *Wall.* Silhet. | — | 20 |
| † — purpuratum *Ldl.* Java | 2 | — |
| † — spec. e Java | 5 | — |
| † — venustum *Wall.* Silhet | 1 | 15 |
| Cyrtochilum flavescens *Ldl.* (Miltonia flav.) Mexico | 1 | — |
| — leucochilum *Planch.* (Oncidium *Bat.*) Guatemala | 2 | — |
| Dendrobium aggregatum *Roxb. Lindley. Steud.* Ostind. | 2 | — |
| — calamiforme *R. Br.* Neu-Holl. (striolatum *Rchb. fil.*) | 5 | — |
| — Farmeri *Pxt.* Calcutta | 5 | — |
| — Cambridgeanum *Pxt.* Ind. or. | 4 | — |
| — clavatum *Wall.* (Stachyobium) Ostindien | 10 | — |
| — crumenatum *Sw.* (Onychyum *Bl.*) Manilla | 4 | — |
| — Dalhousianum *Pxt.* Ostind. | 7 | — |
| — Devonianum *Pxt.* Ostind. | 5 | — |
| — densiflorum *Wall.* Calcutta | 4 | — |
| — fimbriatum *Wall.* Ostind. | 1 | 15 |
| — humile *Wight.* Neu-Holland | 1 | — |
| — Jenkinsi *Lindl.* Ostindien | 1 | — |
| — macranthum *A. Rch.* (macrophyllum *Ldl.*) Manilla | 5 | — |
| — moschatum *Wall.* (Cymb *Willd.* Epd. *Ham.* Stachyob. *Ldl.* Dendrob. Calceolus *Wall.* Dendr. cupreum *Hort.* Dendr. Calceolaria *Hk.*) | 1 | — |
| — nobile *Ldl.* China | 1 | — |
| — Paxtoni *Ldl.* Ostind. | 4 | — |
| — plicatile *Ldl.* Manilla | — | — |
| — pulchellum *Rxb.* (buxifolium) Silhet | 1 | — |
| — rotundifolium Neuholland | 5 | — |
| — sanguinolentum *Ldl* Ceylon | 4 | — |
| † Epidendrum adenocarpum *La Llav.* Mexico | 5 | — |
| — atropurpureum *W.* Hispan. | 6 | — |
| †— aurantiacum *Bat.* Guatem. | 3 | — |
| † Epidendron ciliare *L.* Westind. | 1 | — |
| †— — var. major *Hort.* W.-Ind. | 1 | — |
| — Candollei *Ldl.* (cepaceforme *Hk.*) Venezuela | 3 | — |
| †— cochleatum *Ldl.* Jam. | $^1/_2$-1 | — |
| — — majus Mexico | 1 | — |
| — cuspidatum *Ldl.* Westind. | 1 | — |
| — floribundum *H. & Kth.* Demerara | 1 | — |
| — fragrans *Sm.* (lineare *Sal.*) Jamaica | 1 | — |
| — fuscatum *Tw.* (Amphiglottium *Lnd.*) Jamaica | 1 | 15 |
| — giganteum | 5 | — |
| — heterodatum *Rchb. fil.* Col. | 5 | — |
| †— macrochilum roseum *Hook.* Guatemala | 4 | — |
| — nocturnum *Ldl.* Martinique | 2 | — |
| — odoratissimum *Ldl.* (Encyclia *Ldl.*) Brasilien | 4 | — |
| — oncidioides *Ldl.* (Encyclia *Ldl.*) Südamerika | 6 | — |
| — panchrysum *Rchb. fil.* Mex. | 5 | — |
| — Parkinsonianum *Hk.* Mex. | 4 | — |
| — patens *Sm.* (Encyclium *Ldl.*) Westindien | 4 | — |
| — phoeniceum *Ldl.* (vanillosmum *Ch. Lem.*) Cuba | 4 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Epidendron radiatum *Ldl.* (Osmophyllum *Ldl.*) Mexico | 1 | — |
| — selligerum *Bat.* Guatemala | 1 | 15 |
| — spec. e Mexico | — | — |
| — — e Venezuela | 1 | — |
| †— tigrinum *Ldl.* (coriaceum) Neugranada | 1 | — |
| — tovarense *Rchb. fil.* Venezuela | 10 | — |
| — virgatum *Ldl.* Mexico | 5 | — |
| Eria flava *Ldl.* (Octomeria *Wall.*) Nepal. | 2 | — |
| — floribunda *Ldl.* Singapore | 1 | — |
| — rosea *Lindl.* | 1 | 10 |
| Eulophia streptopetala *R. Br.* | 4 | — |
| Gomeza planifolia *Kltzsch. & Rchb. fil.* (Rodriguezia *R. & Pl.* densiflora) Columbia | 2 | — |
| — recurva *Hook.* Brasil. | 1 | 10 |
| — virescens *Hoffm.* | 1 | 20 |
| † Gongora atropurpurea *Hk.* Demerara | 1 | 20 |
| † — — major *Hort.* | 1 | 15 |
| † — bufonia *Ldl.* Brasilien | 1 | 20 |
| † — leucochila *Ch. Lm.* Chiapas | 2 | — |
| † — maculata *Lindl.* Guyana | 1 | 15 |
| † — — alba Guyana | 1 | 15 |
| † — — blanda *Rchb. fil.* Columbien (tricolor) | 1-3 | — |
| † — — erythrorrhachis *Kl.* | 2 | — |
| † — — pallida Guyana | 1 | 15 |
| — — quinquenensis *Ruiz. & Pav.* | 2-4 | — |
| — — tricolor Panama | 3 | — |
| † — — var. Hookeriana *Kl.* | 3 | — |
| † — odoratissima *Ch. Lem.* Col. | 1 | 15 |
| † Goodyera discolor *Ker.* (Haemaria *Ldl.*) Brasilien | 1/3-3 | — |
| † — procera *Hook.* Nepal. | 2 | — |
| Houlletia vittata *Lindl.* Guyana | 8 | — |
| Isochilus roseus *Hort.* (lineare *R. Br.*) Westindien | 2 | — |
| Lacaena bicolor *Lindl.* Guatem. | 5 | — |
| Laelia acuminata *Lind.* Neugran. | 4 | — |
| — albida *Batem.* Mexico | 3 | — |
| — anceps *Lindl.* Mexico | 2 | 15 |
| — — *Lindl.* var. Barkerian. | 3 | 15 |
| — aurantiaca *Lindl.* Mexico | 5 | — |
| — autumnalis *Ldl.* (Bletia *La Llave*) Mexico | 3 | — |
| — Bryssiana *Lam.* | 10 | — |
| — cinnabarina *Batem.* China | 5 | — |
| — spec. | 2 | — |
| — sulphurea *Josst.* Brasilien | 6 | — |
| — violacea *Lindl.* (Lael. purpurea *Lindl.*) Mexico | 12 | — |
| Leptotes bicolor *Lindl.* Brasil. | 2 | — |
| Lissochilus spec. | — | — |
| Lochhartia parthenocomos *Rchb. fil.* var. purpurata Caracas | 2 | — |
| †Lycaste biseriata (brevispatha *Kl.*) Columbien | 5 | — |
| †— cruenta *Ldl.* Guatemala | 1 | — |
| †— Deppei *Lindl.* Mexico | 1 | — |
| — gigantea *Ldl.* (Heynderieksii) Caracas | 2-4 | — |
| †— macrophylla *Ldl.* Columb. | 2 | — |
| †— picturata | 8 | — |
| †— Skinneri *Ldl.* Guatemala | 5 | — |
| Masdevallia fenestrata *Lindl.* Brasilien | 1 | — |
| † Maxillaria aromatica *Hook.* (Lycaste *Ldl.*) Mexico | 1/2-1 | — |
| †— atro-rubens Südamerica | 1 | — |
| †— Barringtoniae *Lodd.* Westindien | 2 | — |
| — callichroma *Rchb.* | 2 | — |
| †— Colleye *Bat.* Mexico | 1 | — |
| †— crocea *Lindl.* Rio Janeiro | 1 | 15 |
| — cucullata *Ldl.* Südamerica | 1 | — |
| †— densa *Lindl.* Mexico | — | 15 |
| †— foveata *Ldl.* (Xylobium) Venezuela | 1 | — |
| — guareimensis var. purpurea venosa *Rchb. fil.* Columb. | 2-4 | — |
| *— Harrisoniae *Ldl.* (Bifrenaria Harr. *Reichb. fil.*) Bras. | 1 | 10 |
| †— Kleei *H. Hamb.* (Madeii *Bat.*) Guatemala | 3 | — |
| †— Parkerii *Hook.* Demerara | 1 | — |
| †— picta *Hook.* Brasilien | 1 | — |
| †— picturata *Rchb. fil.* Brasil. | 3 | — |
| — porrecta major *Ldl.* Brasil. | 4 | — |
| †— Rollisoni *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien | 4 | — |
| — rufescens *Lindl.* s. erythroloma | 2 | — |
| — sordida | 2 | — |
| — stenopetala *Lodd.* | 2 | — |
| — stapelioides *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien | 1 | 15 |
| †— tetragona *Ldl.* Brasilien | 1 | 15 |
| — variabilis *Bat.* var. unipunctata *Ldl.* Vera Cruz | 1 | — |
| Megaclinium falcatum *Lindl.* Sierra Leona | — | 15 |
| Miltonia candida *Ldl.* Brasil. | 6 | — |
| — Clowesiana *Ldl.* Brasil. | 6 | — |
| — spectabilis *Ldl.* Brasilien | 4 | — |
| Octomeria graminifolia *R. Br.* Antillen | 1 | — |
| — tridentata *Lindl.* | 3 | — |
| — Wagneri | 5 | — |
| †Odontoglossum grande *Ldl.* Guatemala | 2 | 20 |
| † — Insleayi *Ldl.* Mexico | 5 | — |
| † — pulchellum *Bat.* Guatem. | 3 | — |
| — — grandiflor. Guatemala | 4 | — |
| — sp. e Peru (Warzewicz) | 8 | — |
| Oncidium altissimum *Sw.* Jam. | 1 | 15 |
| — ampliatum majus *Ld'.* Guat. | 1 1/2-3 | — |
| — ansiferum *Rchb. fil.* (ensatum *H. Berol.* hyeroglyphicum *Hort.*) | 5 | — |
| — barbatum | 5 | — |
| — Baueri *Ldl.* Panama | 10 | — |
| — bicallosum *Ldl.* (bicornutum *Hook.* pubens *Ldl.* Miltoniastrum) Guatemala | 3 | — |
| — Boothianum *Rchb. fil.* Ven. | 10 | — |
| — caesium *Rchb. fil.* | 3 | — |
| — Cebolleta *Sw.* (juncifolium *Ldl.*) Columbien | 1 | — |
| † — ciliatum *Ldl.* Brasilien | 4 | — |
| — citrinum *Ldl.* Trinidad | 6 | — |
| — clavatum | 5 | — |
| — columbae *Hort. Belg.* | 3 | — |
| — crispum *Hk.* var. macranth. Brasilien | 4 | — |
| — cupreum *Sprgl.* Süd-Amer. | 5 | — |
| † — divaricatum *Ldl.* Brasilien | 2 | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Oncidium ferugineum | 4 | — |
| †— flexuosum *Sims.* Brasil. | 1 | 15 |
| — Galeottianum *Drapiez.*(Odontoglossum citrosmum *Lindl.*) | 3 | — |
| — incurvum *Bark.* (albo violaceum) Mexico | 5 | — |
| — Lanceanum *Ldl.* Guyana | 4 | — |
| — — elegans | 4 | — |
| — luridum *Ldl.* Jamaica | 4 | — |
| — *Lindl.* var. guttatum | 3 | — |
| — — maxiligerum *Hort. V. H,* Guayaquil | 5 | — |
| — monoceras (unicorne *Ldl.*) Rio Janeiro | 2 | — |
| — pantherinum *Hffmgg.* Mexico | 6 | — |
| †— Papilio *Ldl.* Venezuela | 2-3 | — |
| — pergamineum *Lindl.* Guatemala | 5 | — |
| †— Pinellianum *Rich.* (Batemannianum *Parm.*) Bras. | 2 | — |
| — pubes *Lindl.* (bicornutum *Hook.*) Rio Janeiro | 3 | — |
| — pulvinatum *Lindl.* (divaricatum B *Lindl.*) Rio Janeiro | 4 | — |
| — roseo-striatum *Hort.* Hondums | 3 | — |
| †— sphacelatum *Ldl.* Mexico | 2 | — |
| — trulliferum *Lindl.* Bras. | 6 | — |
| — uniflorum *Benth.* Bras. | 3 | — |
| — unguiculatum *Ldl.* Mex. | 5 | — |
| — urophyllum *Lodd.* Bras. | 5 | — |
| — variegatum *Sw.* (Epidendron *Sw.*) Cuba, Domingo | 8 | — |
| — Wentworthianum *Bat.* Guatemala | 4 | — |
| — Wrayae *Hook.* Mexico | 8 | — |
| Ornithidium Sophronitis *Rchb. fil.* Venezuela | 5 | — |
| †Peristeria Barkerii *Batem.* (Acineta *Ldl.*) Mexico | 3 | — |
| — Humboldti *Lindl.* (Acineta *Lindl.*) Peru | 5 | — |
| — elata *Hook.* Panama | 2 | — |
| — pendula *Hook.* Demerara | 3 | — |
| Phalaenopsis amabilis *Bl.* Philippin. | 35-40 | — |
| — grandiflora *Ldl.* Java | 25-30 | — |
| Pholidota jamaicensis | — | — |
| — imbricata *Lindl.* Ostind. | 2 | — |
| — pallida *Lindl.* Ostind. | 2 | — |
| Physosiphon Loddigesii *Lindl.* | 1 | 10 |
| Pilumna laxa *Lindl.* | 3 | — |
| Pleurothallis racemiflora *Lindl.* (Dendrobium. Epidend. *Sw.*) Westind. | 1 | — |
| — Raymondi | 3 | — |
| — stenopetala | 3 | — |
| — Wallichiana *Ldl.* (Coelogyne *Ldl.*) Bengalen | 3 | — |
| Promenaea guttata (Ponera violacea) Brasilien | 1 | — |
| Prescotia plantaginea *Lindl.* Brasilien | 6 | — |
| Renanthera coccinea *Lour.* China | 2-8 | — |
| — matutina *Lindl.* (Aerides *Bl.*) Java | 8 | — |
| †Restrepia elegans *Karst.* (punctulata *Ldl.*) Merida | 3 | — |
| † — vittata *Ldl.* Caracas | 2 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Rodriguezia Barkerii *Hook.* (Gomeza) Brasilien | 1 | 15 |
| Saccolabium guttatum *Ldl.* | 30 | — |
| — papillosum *Ldl.* | 3 | — |
| Sarcanthus rostratus *Lindl.* (Vanda recurva *Hook.*) China | 2 | — |
| Schomburgkia crispa *Lindl.* Demer. | 3 | — |
| — marginata *Lindl.* Surinam | 6 | — |
| †— undulata *Ldl.* Venez. | 1-5 | — |
| Sobralia decora *Bat.* Guatem. | 4 | — |
| — Galleotiana *Rich. & Galleotti* Neu-Granada | 5 | — |
| †— Liliastrum *Ldl.* Guyana | 2-5 | — |
| †— macrantha *Ldl.* Mexico | 2-4 | — |
| — sessilis *Ldl.* Demerara | 1 | — |
| — spec. de Moritz. Caracas | 6 | — |
| Sophronitis cernua *Ldl.* Bras. | 2 | — |
| †Stanhopea aurea *Lodd.* (Wardii *Lodd.* var.) Caracas | 3 | — |
| — aurantiaca *Lodd.* B Labello punct. Guatem. | 4 | — |
| †— Bucephalus *Ldl.* Ecuador | 5 | — |
| †— eburnea *Ldl.* Südamerica | 1-2 | — |
| — expansa Trinidad | 4 | 4 |
| — Fregeana *Rchb. fil.* Caracas | 6 | — |
| — grandiflora *Ldl.* Trinid. | 1 | — |
| — graveolens *Ldl.* Guat | 3 | — |
| — — alba | 5 | — |
| — guttulata *Ldl.* Guatem. | 3 | — |
| — insignis *Frost.* Brasil. | 1 | — |
| — — major Brasilien | 2 | — |
| — — speciosa Brasil. | 1 | — |
| — — punctatissima Bras. | 2 | — |
| — Jenischiana *Rchb. fil.* Panama | 7 | — |
| — Martiana *Ldl.* Mexico | 5 | — |
| — oculata *Ldl.* Mexico | 1-2 | — |
| — — Barkeriana | 4 | — |
| — — hypochilio violaceo-purpureo | 3 | — |
| — — pallida | 1-2 | — |
| — — punctatissima | 3 | — |
| — pardina | 6 | — |
| — quadricornis *Lindl.* Columbia | 4 | — |
| — Ruckeri *Ldl.* Mexico | 6 | — |
| — tigrina *Bat.* Mexico | 2-4 | — |
| — latimaculata *H. Belg.* Mexico | 3 | — |
| — — superba *H. Belg.* Mexico | 3 | — |
| — saccata *Bat.* Guatem. | 2 | — |
| — spec. | 3 | — |
| — — de Guatemala | 3 | — |
| — Wardii *Lodd.* Caracas | 1.3 | — |
| Stelis *Sw.* grandiflora *Ldl.* Jamaica | 1 | — |
| Stenorrhynchus speciosus *Rich.* (*Neottia Jaq.*) | 3 | — |
| Tunia alba *Rchb. fil.* (Phajus *Ldl.*) Ostindien | 2 | — |
| Trichopilia albida *Wendl.* Ven. | 4 | — |
| — candida (Warszewiczella? *R. f.*) | 5 | — |
| — coccina *Warsc.* (marginata *Henfrey.*) Col | 8 | — |
| — suavis *Lindl.* Central-Amer. | 10 | — |
| — tortilis *Ldl.* Mexico | 1 | — |
| Trigonidium ringens Mexico | 5 | — |
| Uropedium Lindeni *Ldl.* Col. | 10-20 | — |

Durchgewurzelte Originalpflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Vanda fulva *Ldl.* (Cymbidium *W.* Epidendrum *L.*) . | 6 | — |
| — teres *Ldl.* Ostindien . | 2-4 | — |
| — tricolor *Ldl.* . . . . | 25 | — |
| Vanilla planifolia *Andr.* Mex. | ½-1 | — |
| Warrea cyanea *Ldl.* Caracas | 3 | — |
| Xylobium squalens *Ldl.* Bras. | 1 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Xylobium squalens βbrevibracteatum | 2 | — |
| Zygopetalum intermedium *Lodd.* Brasilien . . . . | 1 | 20 |
| — brachypetalum *Lindl.* Brasilien . . . . | 4 | — |
| — Makayi *Hook.* Brasil. . | 1 | 20 |
| — maxillare majus *Lodd.* Brasil. | 5 | — |
| — velutinum *Hffg.* Brasil. | 3 | — |

# Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclantheae.

Selbst wer sie nicht gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen. Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen; denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existens bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe. Bei der verschiedensten Benennung, welche für gleiche Arten in verschiedenen Gärten gebraucht wird, legte ich bei deren Bearbeitung den Index Palmarum und Wendland zu Grunde, wonach die Namen der Gärten angeführt werden, in welchen der vorgestellte Name unter einem anderen geführt wird. In gerechter Würdigung der immer grösser werdenden Vorliebe für Palmen, brachte dieser schönen Familie auch in diesem Jahre namhafte Opfer; unter den Einführungen aus deren Vaterland, verdienen aber die wahrhaft g i g a n t i s c h e n C y c a s - S t ä m m e ganz besondrer Erwähnung, d i e g r ö s s t e n h a b e n 9—10 Fuss Höhe und 18—20 Zoll Durchmesser.

| | Stamm- Höhe Fuss | Stärke Zoll | Ganze Höhe Fuss | Wedelzahl | Preis Thlr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenga saccharifera *La Bill.* (Borassus Gomutus *Lour.* Gomutus *Spr.* Saguerus *Roxb.*) | 1 | 4 | 8 | 5 | 40 |
| — — Kleinere . . . . . . | — | — | 1 | 2-3 | 10 |
| Areca alba *Bory.* . . . . . . . | 1 | 1½ | 4 | 4 | 20 |
| — horrida (Oncospermum) . . . | — | — | — | — | 4 |
| — rubra *Bory* . . . . . . . . | 1 | 1½ | 4 | 3 | 8 |
| Astrocaryum Ayrii *Mart.* (Toxophoenix aculeatissima *Schott.*) . . . . . | 5 | 3 | 15 | 13 | 80 |
| Attalea maracaibensis . . . . . | — | — | 2 | 6 | 10 |
| — speciosa *Mart.* . . . . . . | — | — | 1-3 | 4-7 | 3-6 |
| Bactris spinosa *Mart.* . . . . . . | — | — | 2 | 2 | 8 |
| Borassus flabelliformis *L.* . . . . . | — | — | 1½ | 2 | 10 |
| Brahea dulcis *Mart.* . . . . . . | — | — | 1½ | 3 | 5 |
| Calamus micranthus *H. Bog.* . . . . (Kleinere 5-10 Thlr.) | — | — | 4½ | 6 | 15 |
| — Rotang *L.* . . . . . . . . (Kleinere 10 Thlr.) | 3 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| Carludovica atrovirens *Wendl. f.* . . . | — | — | 2 | 5 | 2 |
| — incisa *Wendl. f.* . . . . . | — | — | — | — | 1 |
| — Hookerii *H. Berol.* . . . . . | — | — | 2½ | 5 | 5 |
| — latifolia *Ruiz. & Pav.* . . . (Kleiner 2 Thlr.) | — | — | 3 | 6 | 8 |
| — Moritziana *H. Berol.* . . . | — | — | 4 | 6 | 5 |
| — palmata *Rz. & Pav.* . . . . (Kleinere ½-1 Thlr.) | — | — | 5 | 6 | 6 |
| — Plumierii *Kth.* (palmaefolia *H. Lodd.* plicata *H. Ber.*) . . . . . . (Kleinere von 2-3 Thlr.) | — | — | 2 | 3 | 5 |
| — Sartori . . . . . . . . | — | — | — | — | 10 |
| — spec. Meridor . . . . . . (Kleinere 2 Thlr.) | — | — | 3 | 5 | 8 |

| | Stamm- | | Ganze Höhe | Wedelzahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Stärke | | | |
| | *Fuss* | *Zoll* | *Fuss* | | *Thlr.* |
| Carludovica spec. Venezuela . . . (Kleinere 2 Thlr.) | — | — | 4 | 4 | 20 |
| Caryota appendiculata . . . . . . | — | — | 8 | 5 | 30 |
| — Cumingii *Lodd.* (C. urens *H. Berol.*) | 1 | $1\frac{1}{2}$ | 5 | 4 | 40 |
| — furfuracea sp.? *H. i. Pav. Potsd.* . (Kleinere 5 Thlr.) | $\frac{3}{4}$ | 1 | $4\frac{1}{2}$ | 3 | 6 |
| — mitis *Mart.* . . . . . . . | — | — | 6 | 5 | 15 |
| — propinqua *Bl.* . . . . . . (Kleinere 5 Thlr.) | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| — urens *L.* . . . . . . . . | — | — | 2 | 5 | 20 |
| Ceratozamia mexicana *Brogn.* . . . | $\frac{3}{4}$ | 4 | 4 | — | 10 |
| Chamaedorea Arenbergiana . . . . | — | — | 3 | 3 | 3 |
| — Casperiana *Kt.* . . . . . | — | — | — | 14 | 25 |
| — desmoncoides *Herm. Wendl.* (elatior *H. Parm.* regia *Hort.* repens *H. i. pav. Potsd.?* robusta *H. Lodd.* scandens *H. Berol. H. Makoy. H. Par.*) . . . . . . (Kleinere 6 Thlr.) | 17 | 2 | 20 | 8 | 40 |
| — Ernesti-Augusti *H. Wendl.* (Morenia *Wdl.* Ch. latifrons *H. Arenb.* simplicifrons *H. Brux.* Geonoma latifrons *H. Makoy.*) | $3\frac{1}{2}$ | 2 | 6 | 6 | 6 |
| — geonomaeformis *Herm. Wendl.* (fenestrata *H. v. Houtt.* humilis *H. Ber.*) . . (Kleinere 4 Thlr.) | 2 | $\frac{1}{2}$ | 4 | 6 | 15 |
| — Karwinskiana *Herm. Wdl.* (elatoir *H. Ber. H. i. pav. Potsd. H. Amst. H. Lugd- Bat. H. Gand.*) . . . . . . . . (Kleinere 1-6 Thlr.) | 2 | $\frac{1}{2}$ | 4 | 8 | 25 |
| — Lindeniana *H. Wendl.* (concolor *H. Paris* scandens *H. Brux.*) . . . . . | 8 | $\frac{3}{4}$ | 11 | — | 6-10 |
| — lunata . . . . . . . . . | — | — | — | 6 | 6 |
| — oblongata *Mrt.* (Morenia *Herm. Wendl.* aurantiaca *H. Belg. & Gall.* Lindeniana *H. Brux.* scandens *H. Ber.*) . . (Kleinere 8 Thlr.) | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $3\frac{1}{2}$ | — | 5 |
| — resinifera . . . . . . . . | — | — | — | 5 | 15 |
| — Schiedeana *Mart.* (Kunthia xalapensis *Otto & Dietr.* gracilis *H. Lood.* speciosa *H. Ber.*) . . . . . . . . (Kleinere 5 Thlr.) | 8 | $\frac{3}{4}$ | 10 | 5 | 15 |
| — spec. Meridor *H. Bessg.* . . . . | 4 | $\frac{1}{2}$ | 6 | 7 | 15 |
| — — I. . . . . . . . . | — | — | — | — | 4 |
| — — II. . . . . . . . . | — | — | — | — | 4 |
| — — III. . . . . . . . . | — | — | — | — | 4 |
| — — VI. . . . . . . . . | — | — | — | — | 4 |
| Chamaerops excelsa *Wall.* . . . . . | — | — | — | — | 2-6 |
| — humilis *L.* (conduplicata *H. Gand.* humilis macrocarpa? *H. Ber.* fructu elongata *H. ins. Pav.*) . . . . . . | $\frac{3}{4}$ | 4 | 4 | 12 | 40 |
| K* — *L.* 1jähr. . . . . . . . | — | — | — | — | 1 |
| K* — Palmetto *Mx.* . . . . . . | — | — | — | — | 2 |
| — stauracantha *Hort.* . . . . . | — | — | — | — | 3 |
| Cocos butyracea *Mart.* . . . . . . | — | — | 3 | 2-6 | 5 |
| Corypha Gebanga *Bl.* (macrophylla *H. Arenbg.*) | — | — | 1 | 2 | 20 |
| Cycas circinalis . . . . . . . . | 2 | 6 | 9 | 8 | 160 |
| — — . . . . . . . . . | 4 | 10 | 11 | 5 | 350 |
| — inermis *Lour.* . . . . . . . | $\frac{1}{2}$ | 4 | 3 | 10 | 15 |

In allen Stärken von 3—8 Zoll 4—10 Thlr.

## Cycas revoluta.

Die nächsten 5, verhältnissmässig höher notirten Stämme, sind ausgezeichnet gebaut, bewurzelt und belaubt., wie sie in keiner Sammlung des In- und Auslandes weiter zu finden sind.

| | Stamm- Höhe *Fuss* | Stamm- Stärke *Zoll* | Ganze Höhe *Fuss* | Wedelzahl | Preis *Thlr.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycas revoluta *Thbg.* (revoluta var. *H. Herrehn. H. Amst.*) | 10 | 20 | 12 | verschieden | 600 |
| — | 9 | 18 | 12 | | 600 |
| — — | 8 | 17 | 12 | | 900 |
| — — | 6 | 15 | 8 | - | 550 |
| — — | 6 | 15 | 9 | - | 300 |
| — — | $4\frac{1}{2}$ | 10 | 8 | - | 150 |
| — — | 4 | 10 | 6 | - | 125 |
| — — | 3 | 9 | $5\frac{1}{4}$ | - | 90 |
| — — | $3\frac{1}{3}$ | 10 | 5 | - | 100 |
| — — | 3 | 10 | 5 | - | 80 |
| — — | 2 | 8 | 4 | - | 50 |
| — — | 2 | 7 | 4 | - | 45 |
| — — | $1\frac{2}{3}$ | 7 | $3\frac{1}{3}$ | - | 30 |
| — — | $1\frac{3}{4}$ | 5 | 3 | - | 25 |
| — — | $1\frac{1}{2}$ | 7 | $3\frac{3}{4}$ | - | 20 |
| — — | $1\frac{1}{2}$ | 6 | $3\frac{1}{2}$ | - | 15 |
| — — | $1\frac{1}{3}$ | $5\frac{1}{2}$ | 3 | - | 20 |
| — — | $1\frac{1}{4}$ | 5 | 3 | - | 18 |
| — — | $1\frac{1}{4}$ | 7 | 3 | - | 12 |
| — — | $1\frac{1}{6}$ | $4\frac{1}{2}$ | 3 | - | 12 |
| — — | $1\frac{1}{6}$ | 5 | 3 | - | 15 |
| — — | $1\frac{1}{6}$ | $4\frac{1}{2}$ | 3 | - | 12 |
| — — | 1 | 5 | $2\frac{1}{2}$ | - | 12 |
| — — | 1 | 5 | 3 | - | 12 |
| — — | 1 | 4 | $2\frac{1}{2}$ | - | 10 |
| Ausser diesen meist in der Jetzzeit importirten, besitze ich noch eine Menge gut bewurzelte, ausgetriebene Stämme von $\frac{1}{4}$—1 Fuss Höhe, deren Preis sich auf $\frac{1}{3}$—6 Thlr. stellt. | | | | | |
| — Rumphii *Miq.* | — | — | 4 | 4 | 8 |
| Cyclanthus cristatus *Kl.* | — | — | — | — | 8 |
| — Plumierii *Poit.* (angustifol. *H. Ber. H. Amst. H. Lodd.*) | — | — | — | — | 6 |
| Daemonorops melanochaetes *Bl.* | — | — | 4 | 4 | 8 |
| Desmoncus horridus *Hort.* | — | — | 2 | 6—8 | 2—6 |
| — orthacanthus *Mart.* | 4 | $\frac{1}{2}$ | 5 | 5 | 20 |
| — polyanthus *Mart.* | — | — | — | — | 10 |
| Dion edule *Lindl.* (Platyzamia rigida *Zucc.*) | $1\frac{1}{4}$ | 9 | 4 | 8 | 40 |
| — — *Mq.* kl. Samenpflanzen, | 6 | — | — | — | 6 |
| Encephalartos caffer *Lehm.* | 5 | 15 | 9 | 36 | 1200 |
| Ein seltenes Prachtexemplar, dessen walzenförmiger Stamm einen Umfang von ziemlich 4 Fuss hat. | | | | | |
| — horridus *Lehm.* | $\frac{1}{2}$ | 5 | 3 | 7 | 40-50 |
| — longifolius *Lehm.* (E. longifol. var. angustifolius *Miq.* e Prompnt. b. sp. *H. Amst.* Zamia pungens *H. Par.?* longifol. var. *H. Amst.*) | $\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{2}$ | 5 | 11 | 30 |
| — spec.? junge Pflanzen | — | — | — | — | 5 |
| — spinulosus *Lehm.* | $\frac{1}{3}$ | 2 | 2 | 6 | 40 |
| — tridentatus *Lehm.* (spiralis *H. Ber.*) | $\frac{3}{4}$ | 9 | 3 | 3 | 20 |
| Freycinetia nitida (Kleinere 1—2 Thlr.) | 2 | 5 | $3\frac{1}{2}$ | viel | 8 |
| Iriartea sp. nova e Venezuela | — | — | — | — | 4—6 |
| Latania Commersonii *Mart.* (rubra *Jacq.*) | — | — | 1 | 4 | 30 |
| — Jenkinsoniana *Griff.* | — | — | 3 | — | 20 |
| Licuale elegans *Bl.* (Kleinere 3—5 Thlr.) | — | $\frac{1}{3}$ | 4 | 6 | 10 |
| — horrida *Bl.* (Rhapis javanica *H. ins. Pv. H. mult.* Bat. & Big.) (Kleinere 4 Thlr.) | — | — | 2 | 5 | 20 |

| | Stamm- | | Ganze Höhe | Wedelzahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe *Fuss* | Stärke *Zoll.* | *Fuss* | | *Thlr.* |
| Livistonia chinensis *Mart.* (Latania *Jcq.* Latania borbonica *Lam.* Livist. mauritiana *Wall.* Saribus chinensis *Bl.* Lat. *borb. H. Decker. H. i. pav. Potsd. H. Leod. H. Makoy. H. Arenb. H. Paris H. Kew. H. Lodd. H. Edinb.* Lat. chinens *H. Ber. H. Brux.* Saribus subglobosus *HH. mult. Batav. & Belg.*) | $1\frac{3}{4}$ | 7 | 6—8 | 6-10 | 40--60 |
| (Kleinere 3—15 Thlr.) | | | | | |
| — Mauritiana | — | — | 1—3 | 5—8 | 6—12 |
| — olivaeformis *Mart.* (Saribus *Hasskr.* Chamaerops Biroo *H. Lugd.-Bat., H. i. pav. H. Makoy. H. Brux. H. Maelen. H. Parm.* Latania borb. *H. Ber.* Saribus olivaeformis. rotundifolius etsubglobosus *HH. mult. Batav. et Belg.*) | 4 | 20 | 20 | 27 | 650 |
| Eine sehr starke Prachtpflanze. (Kleine 8—25 Thlr.) | | | | | |
| — rotundifolia *Mart.* vera non subglobosa *Hrt.* (Corypha *Lam.* Sabal *Bl.*) | — | — | 4 | 7 | 20 |
| Maximiliana regia *Mart.* (Elaeis guianensis *H. Ber.*) | — | — | 6 | 2 | 25 |
| Oenocarpus utilis *Kl.* | — | — | 4 | 4 | 12 |
| Oreodoxia regia *Kth.* | 1 | 2 | 4 | 3 | 4—6 |
| Pandanus furcatus *Roxb.* | — | — | — | — | 15 |
| Ein sehr schönes kräftiges Exemplar von 3 Fuss Höhe mit 4 Fuss langen Blättern. | | | | | |
| — gramineus (Freycinetia graminea *H. Amst.*) | — | — | $1\frac{1}{2}$ | viel | 6 |
| (Kleinere 1 Thlr.) | | | | | |
| — javanicus fol. var. | — | — | — | — | 5 |
| — inermis *Roxb.* | $\frac{1}{3}$ | 2 | 2 | — | 20 |
| — odoratissimus | 3 | 5 | 10 | viel | 70 |
| Kleine à | — | — | — | — | 5 |
| — pygmaeus *Thour.* (graminifolius *HH. Germ. Batav. Belg. Gall. & Angl.* Foullioya graminifolia *H. Pav.* Freyc. graminifolia *H.* Freyc. leucacantha *H. Amst.*) | — | — | $\frac{3}{4}$ | — | 1 |
| — reflexus *Lodd.* | — | — | — | — | — |
| — utilis *Bory.* (Fr. essbar) | — | — | 1 | — | 12 |
| — viridis | — | — | — | — | — |
| Phoenix dactylifera *L.* (dactylifera microcarpa *H. e. pav. Potsd.*) | 1 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| K. — — 1- & 2j. | — | — | — | — | $\frac{1}{2}$-2 |
| — farinifera *Rxb.* (leonensis *H. Lodd.* pygmaea *H. Ber.* Elata sylvestris *H. Paris?*) | $\frac{1}{2}$ | 6 | 7 | 7 | 35 |
| — — *Rxb.* Samenpflanzen | — | — | — | — | 2—4 |
| — reclinata *Jcq.* (farinifera *H. Lodd.* leonensis *H. Ber.* paludosa *H. Ber. H. Brux.* pusilla *H. i. pav. Potsd.*) | 1 | 3 | 8 | 6 | 40 |
| — sylvestris *Roxb.* | 1 | 4 | 7 | 9 | 30 |
| Plectocomia elongata *Mart.* (Calamus maximus *Reinw. H. Lodd.* Zalacca assamica *H. Decker. H. Makoy*) | — | — | 2 | 4 | 15 |
| Rhapis flabelliformis *Ait.* In allen Grössen von | — | — | — | — | 1-10 |
| Sabal Adansonii *Guerns.* (Corypha minor *Murr. H. i. pav. Potsd.* Cor. pumila *Walt.* Sabal pumila *Pers. H. Houtl.*) | — | — | 6 | 8 | 40 |
| Kleinere $\frac{1}{2}$-10 Thlr. | | | | | |
| — — major (S. Adansoni *H. Mak. H. Maelen.* S. Palmetto *H. Brux.*) | — | — | $2\frac{1}{2}$ | 4 | 15 |
| — Mocini *O. & Dietr.* | — | — | — | — | 3 |
| — umbraculifera *Mart.* (Corypha *Jcq. H. Ber.* S. Blackbourniana *H. i. pav. Potsd.*) | — | — | 7 | 3 | 60 |
| Stachyophorbe Deckeriana *Kl.* | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 4 | 5 | 10 |
| Synechoultus fibrosus (Georgia) | — | — | — | — | 20 |

| | Stamm- Höhe | Stamm- Stärke | Ganze Höhe | Wedelzahl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuss | Zoll. | Fuss | | Thlr. |
| Thrinax radiata *Lodd.* (argentea *H. Ber.* elegans *H. Lodd.* gracilis *H. ins. Pav.* parviflora *H. Brux.* Mauritia flexuosa *H. Ber.*) . | 2 | 6 | 10 | 12 | 80 |
| — elegans . . . . . . . . . | — | — | 2 | 7 | 5 |
| — spec . . . . . . . . . | — | — | 3 | 5 | 4 |
| Trithrinax mauritiaeformis *Hort.* . . . | — | — | 3 | 6 | 10 |
| Wallichia caryotoides *Roxb.* (Harina *Ham.*) (Kleinere 10 Thlr.) | — | — | 4 | 3 | 15 |
| — porphyrocarpa *Mart.* (Caryota humilis *Reinw.* Orania *Bl.* Orania regalis *Bl.* Wallichia Oranii *Bl. H. Ber. H. Amst. H. Makoy. H. Brux.* Oran. porph. *H. i. pav Potsd. O.* reg. *H. Ber. H. Amst. H. Gand. H. Paris.*) (Auch kleiner 10 Thlr.) | — | — | 2 | 6 | 20 |
| Zamia horrida . . . . . . . . | 1/2 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| — muricata *Willd.* (spinosa *H. Parm.*?) | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 |
| — integrifolia *Ait.* . . . . . . | — | — | 3 | 3 | 30 |
| **Im Palmenhause befinden sich noch:** | | | | | |
| Bambusa arundinacea mit 3 Trieben . . | — | — | 26 | — | 20 |

# Pflanzen, welche zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Fruchtbäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe; und es wird nicht mehr allein Vergnügungs- und Luxussache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet, wie auch endlich die Ausstellungsprogramme anfangen, Preise für derartige Sammlungen auszusetzen.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem K gehören ins Kalthaus, während das hintenstehende K — wie überall — Knollen bedeutet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Abroma augustum *L. f.* — Kakaomalve Wurzel und Rinde antisporisch — . . . | — | 15 |
| Acacia arabica *W.* . . . | 1 | — |
| — Farnesiana *W.* — Bablaschote — . . . . | — | 10 |
| K — Sophora *R. Br.* — Siliquae Bablah — . . . . | — | 10 |
| — vera *L. Bauh.* . . . | 1 | — |
| arabica und vera liefern Gummi arabicum, s. Mimosae. | | |
| Fr. Acanthus mollis *L.* . | — | 5 |
| Fr. — spinosus *L.* — Bärenklau — Hb. Brancae ursinae | — | 6 |
| Fr. S. Acer dasycarpum *Ehrh.* | — | 3 |
| Fr. — Negundo *L.* (Negundo fraxinifolia) . . . . | — | 3 |
| Fr. — saccharinum *L.* . | — | 6 |
| Dienen zur Zuckerbereitung in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. | | |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr. Achillea moschata *L.* — Edle Schaafgarbe — . | — | 5 |
| Fr. — nobilis *L.* — Hb. Ach. nob. | — | 5 |
| Fr. — Ptarmica *L.* (Ptarmica vulgaris *DC.*) — Hb. & Flor. Ptarm. — . . . . . | — | 2 |
| Fr. Achyrophorus maculatus *Sp.* - Hb. & Fl. Costi nostralis, Gemüse — . . . . | — | 2 |
| Fr. Aconitum Lycoctonum *L.* — Hb. Aconiti lutei — . | — | 2 |
| Fr. — Napellus *L.* . . . | — | 2 |
| Fr. — Stoerkianum *Rchb.* — Eisenhut, Rad. & Hb. Aconiti | | |
| Fr. Acorus Calamus *L.* — Calmus Rad. Calami aromatica — | — | 5 |
| Fr. Actaea spicata *L.* — Christophskraut, Rad. Christophori — | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Aegle Marmelos *Correa* . | 5 | — |
| Ostind. Fruchtbaum. | | |
| Fr.Allium Moly *L.* — Rad. Mol. lut. — . . . . . k | — | 2 |
| Fr. — nigrum *L.* 1jähr. Sampfl. — Rad. Moly latifol. — k | — | 10 |
| Fr — Victorialis *L.* — Allermannsharnisch, Rad. Victor. longae — . . . . k | — | 4 |
| K.Aloë soccotorina *Lam.* — Resina Alois — . . . | 1 | — |
| Amomum Cardamomum *L.* — Cardamomum rotundum — | — | 5 |
| — granum Paradisii *L.* — Grana Paradisii — . . . . | — | 20 |
| K.Anagyris foetida *L.* . . . | — | 15 |
| Blätter purgirend. | | |
| Fr.Anchusa officinalis *L.* — Rd. Hb. & Flor. Buglossi — Ochsenzunge. . . . . | — | 2 |
| Fr.Anemone Hepatica *L.* — Leberblume, Hepatika, Hab. Hepat. nobil. — . . . | — | 2 |
| Fr. — nemorosa *L.* — Rad. & Hb. Ranunculi albi — . k | — | 2 |
| Fr. — pratensis *L.* (Pulsatill. *Mill.*) . . . . . | — | 5 |
| Fr. — Pulsatilla *L.* — Puls. vulg. — Hb. & Rad. Pulsatillae — | — | 5 |
| Fr.Angelica Archangelica *L.* — Arch. officinal. Rad. Angelicae, Engelwurz — . | — | 5 |
| Anona Humboldti — Flaschenbaum, wohlschm. Frucht — | 4 | — |
| — palustris *L.* — Zucker- od. Zimmet-Apfel — . . | 5 | — |
| Antennaria margaritacea *Gaertn.* (Gnaphalium *L.*) . . | — | 2 |
| Fr.Anthemis tinctoria *L.* — Fl. & Hb. Buphthalmi — . | — | 3 |
| Fr. — nobilis *L.* — Römische Kamille, Fl. Chamom. rom. — | — | 3 |
| Anthericum Liliago *L.* — Graslilie, Hb. & Sm. Anther. nonramos. — . . . . | — | 5 |
| Fr. — ramosum *L.* — Sandlilie Hb. Sem. Flor. Phalang. ramos. — . . . . . | — | 3 |
| Antiaris toxicaria *L.* — Indischer Upas oder Giftbaum — | 5 | — |
| Fr.Antirrhinum majus *L.* — Löwenmaul, Hb. Orontii maj. — | — | 2 |
| Fr.Apios tuberosa *Pursch.* (Glycine Ap. *L.*) — Kartoffelsurrogat — . . . . k | — | 5 |
| Fr.Aralia nudicaulis *L.* — Rad. Sarsaparillae glabrae — | — | 5 |
| — papyrifera *Hook.* — Chines. Papierpflanze, auch sonst ausgezeichnete Blattpfl. — | $\frac{1}{2}$-2 | — |
| K.Aristolochia Pistolochia — Rd. Pistolochiae — . . . | — | 15 |
| Fr.Armeria elongata *Koch.* — Fol. Statices . . . . . | — | 2 |
| Artocarpus imperialis *Roxb.* (Ficus macrophylla *Roxb.* Roxb. *Hort.* Covellia *Miq.*) . | 1-3 | — |
| — glaucus . . . . . | 3 | — |
| — incisa *L. fil.* . . . . | 4-6 | — |
| — rigidus . . . . . | 3 | — |
| Liefern die austral. Brodfrucht. | | |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr.Arum maculatum *L.* K. — Aronstab. Rad. Ari — . | — | 5 |
| Fr.Arundo Donax *L.* — Italienisches Schilf, Rad. Donacis s. Cannae garganicae — . | — | 15 |
| Fr.Asperula odorata *L.* — Waldmeister, — Hb. Mastrisylviae | — | 2 |
| Fr. — tinctoria *L.* — Hb. Asper. tinctor. — . . . | — | 3 |
| Fr.Asphodelus luteus *L.* — Affodill, — Rad. Asph. lutei — | — | 3 |
| K.Aspidium coriaceum *Sw.* — Rad. Calagualae — . | — | 7 |
| Fr. — Lonchitis *Sw.* — Hb. Lonchitis major — , . | — | 10 |
| Fr. — Filix mas. *Sw.* — Rad. Filicis — . . . | — | 5 |
| Fr.Aster Amellus *L.* — Hb. Asteria — . . . . . | — | 2 |
| K.Astragalus Tragacantha *L.* — Traganth, Gummi Tragac. — | 1 | — |
| Fr.Astrantia major *L.* — Hb. & Rd. Astr. s. Imperat. nigrae | — | 2 |
| Fr.A.Athamanta Mathioli *L.* — Sem. Dauci cretici — | — | 10 |
| Fr.Atropa Belladonna *L.* — Tollkirsche, — Rad. & Hb. Belladonnae — . . . . | — | 10 |
| Fr.Bambusa arundinacea *Retz.* | — | 20-30 |
| — aurea *Hort.* . . . | 1 | — |
| Liefern das Bambusrohr. | | |
| Fr.Barbarea vulgaris *R. Br.* — Hb. Barbareae — . . . | — | 3 |
| K.Benthamia fragifera *Lindl.* | — | 5 |
| Frucht wie Erdbeere; essbar. | | |
| †Blighia sapida *Kg.* — Cupania Akcesia, trop. Fruchtbaum | 4 | — |
| Boehmeria argentea *L.* . | — | 15 |
| K. — utilis *Bl.* (Urtica tenacissima *Roxb.*) . | — | 10 |
| Beide liefern den Stoff zu feinen Nesseltuchen. | | |
| Boussingaultia baselloides *H.B.K.* | — | 5 |
| Kartoffelsurrogat, liefert viel Ertrag, und zugleich hübsche Rankpflanze mit sehr wohlriechenden Blumen. | | |
| Fr.Bryonia alba *L.* . . . r | — | 5 |
| Fr. — dioica *L.* — Zaunrübe Rad. Bryoniae — . , r | — | 5 |
| Fr.Bunias orientalis *L.* — Gemüse | — | 5 |
| Butomus umbellatus *L.* — Rad. & Fl. Junci flor. — . | — | 5 |
| Caesalpinia Sappan *L.* — falsch. Sandelholz — . . | 1 | — |
| Fr.Calla palustris *L.* — Rd. Dracunc. aquat. & palustr. — | — | 10 |
| K.Callitris quadrivalvis *Vent.* — Sandarak, Gummi Sandarac. | — | 20 |
| Fr.Caltha palustris *L.* — Hb. & Fl. Calthae p. — . . | — | 4 |
| Capparis ferruginea *L.* — Kapernstrauch — . . | — | 10 |
| — flexuosa *Bl.* (cynophallophora *Mill.*) — Eine Sorte Kapern — . . . . | — | 15 |
| — spinosa *L.* — Kapern, Knospen essbar — . . | — | 15 |
| Carica microcarpa *Jcq.* var. monoica *Desf.* — Melonenbaum | 1 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Calodracon terminalis *Planch.* | 1/4-1 | — |
| Wurzeln dienen auf den Sandwichsinseln zu berauschenden Getränken. | | |
| Cassia Fistula *L.* (Baeobotris) — Fr. Cass. fist. — | 1 | — |
| Fr. — marylandica *L.* — Blätter purgirend — . . . . | — | 6 |
| K. — occidentalis *L.* — Trijolli — Amerikanische Sennesblätter. | — | 15 |
| Fr.St. Ceanothus americanus *L.* Neu-Yerseythee . . . | — | 10 |
| — azureus *Desf.* — Virginianische Fieberrinde — , | — | 7 |
| Cecropia palmata *W.* . . | 1 | — |
| — peltata *L.* — liefern Caoutchouk, Resina elastica — | 1-3 | — |
| Cedrela odorata *L.* — Zuckerkistenholz, Cort. Cedrelae | 3 | — |
| Fr.St. Cedrus Deodora *Roxb.* — Ol. Deodorae — . . | 1 | — |
| K — Libani *Loud.* (Pin. Cedr. *L.*) — Ced. v. Libanon, Lign. Resina & Manna Cedri — | 1 | — |
| Fr. Centaurea montana *L.* — Fl. Cyani major — . . | — | 2 |
| Cephaëlis Ipecacuanha *L.* — Rd. Ipecacuanhae — . . | 4 | — |
| K. Ceratonia Siliqua *L.* — Johannisbrodbaum, Siliquae dulces — | | 5-10 |
| Fr. Ceterach officinarum *W.* — Hb. Ceterach — . . . | — | 15 |
| Chiococca racemosa *Jcq.* — Radix Caincae — . . . | — | 10 |
| Chloranthus erectus *Wall.* . | 3 | — |
| Wird wie die Blüthen einiger anderer Gehölze, zum Parfümiren des Thee's gebraucht. | | |
| Fr. Chrysosplenium alternifolium *L.* | | 3 |
| Fr. — oppositifolium *L.* — Hb. Saxifragae aur. — . | — | 3 |
| K. Cibotium glaucescens *Knze.* — Agnus scythicus — . | 3 | — |
| — Schiedei *Schlchtd.* b. Baumfarrn . . . . . | 4 | — |
| Die Wolle beider, als Wundmittel; auch Lophosoria affinis vd. Baumfarrn. | | |
| Fr. Cicuta virosa *L.* — Wasserschierling, Rad. Cicutae — | — | 3 |
| Fr. Cimicifuga foetida *L.* — Flohkraut. Hb. Cimicifugae | — | 5 |
| Fr. — racemosa *Bart.* — Gegen Schlangenbiss — . . . | — | 10 |
| Cinchona ovata (ovalifolia *Mutt.*) — — Tucujensis *Karst.* . | 6 | — |
| Liefert die echte Maracaybo-Chinarinde. | | |
| Cinnamomum eucalyptoides *N. ab E.* — Fol. Malabathri | 1 | — |
| — javanicum *Bl.* — Cortex Sintoc — . . . . . | 1 | — |
| K. Cissus antarctica *Vent.* — Beeren zum Kanguroowein — . | — | 10 |
| K. Cistus ladaniferus *L.* — Gummi Ladanum in baculis — | — | 15 |
| K. Citrus Medica *L.* — Fol. & Fruct. Citri — . . . . . . | — | 5 |
| K. — sinensis *Pers.* (japonica *Thunb.*) Früchte essbar | 1/8-3 | — |
| Fr. Clematis angustifolia *Jcq.* | — | 2 |
| Fr. — erecta *L.* . . . . | — | 3 |
| Fr. — flammula *L.* — Waldrebe Hb. Clematidis — . . . | — | 6 |
| Coffea arabica *L.* — Kaffeebaum Sem. Coffeae — . . | 1/3-1 | — |
| Blätter in neuerer Zeit als vorzügliches Surrogat des Chines. Thee's. | | |
| — — var. Mocka . . | 1 | — |
| — mauritiana *Lam.* . . | 1 | — |
| Fr. Colchicum autumnale *L.* k. — Herbstzeitlose, Rd. & Sm. | — | 2 1/2 |
| Fr. St. Colutea arborescens *L.* Blasenstr. . . . . | — | 5 |
| Fr. St. — cruenta *Ait.* — Fol. Sennae germ. — . . . | — | 5 |
| Condaminea corymbosa *D.C.* (Macrocnemum *c. R. & P.*) — Ersatz der Chinarinde, Cortex antifebrilis — . . | 4 | — |
| Fr. Conium maculatum *Lk.* — Hb. & Sem. Con. mac. Gefleckter Schierling — . . . | — | 5 |
| Fr. Convallaria latifolia *Jcq.* (Polygonatum *Dsfn.*) . . | — | 6 |
| Die jungen Triebe als Spargel. | | |
| Fr. — majalis *L.* — Maiblume Fl. Lilior. Convallium — | — | 2 |
| Fr. — multiflora *L.* (Polyg. m, *All.*) . . . . . . | — | 3 |
| Fr. — Polygonatum *L.* (Polyg. officinale *All.*) . . | — | 3 |
| Beide liefern Rad. Sigilli Salomon. | | |
| Cookia punctata *Retz.* — Wampenfrucht — . . . | 2 | — |
| Coreopsis verticillata *L.* . | — | 3 |
| In Virginien zum Rothfärben. | | |
| Fr. St. Coronilla Emerus *L.* — Vogelwicke, Fol. Coluteae s. scorpioid. — Indigohaltig — | — | 2 |
| K. Correa alba *Andr.* — N.-Süd-Wales-Thee — . . . | — | 5 |
| Fr. Corydalis cava *Schweigg.* (tuberosa *D.C.*) — Rad. Aristoloch. cav. — . . . . k | — | 3 |
| Fr. — fabacea *Pers.* — Rad. Arist. fabaceae — . k | — | 3 |
| Fr. Crambe maritima *L.* — Meerkohl, Hb. Brassicae mar. | — | 3 |
| Crataeva Tapia *L.* — Cortex febrifugus — . . . . | 2 | — |
| Crescentia Cujute *L.* — Früchte gegen Fieber — . . | 1 | — |
| Fr. Crocus sativus *L.* — Saffran, Crocus v. stigmata Croci — k | — | 5 |
| Croton Cascarilla *L.* — Cortex Cascarillae — . . . | 1 | — |
| Fr. Cucubalus bacciferus *L.* (Silene) — Hb. Viscaginis baccif. | — | 2 |
| K. Cupressus sempervirens *L.* — Lign. & nuces cypressi — | — | 10-20 |
| Curcuma cordata *Wall.* — Rad. Curcumae — . . . . k | — | 15 |
| — fusca — Gelbwurz — k | — | 10 |
| — longa *L.* — Rad. Curcum. k | — | 10 |
| — Zedoaria *Rosc.* — Rad. Zed. rotund. — . . . k | — | 10 |
| Fr. Cyclamen europaeum *L.* — Rad. Arthanitae — . k | — | 5 |

Thlr. Ngr.

Fr.Cydonia japonica *P.* — Früchte essb. u. sehr. wohlriech. — 10

Fr.Cynanchum Vincetoxium *R.Br.* (Asclepias *L.*) — Rad. Vincetox — . . . . . . — 2

Cyperus esculentus *L.* . k— 3

Erdmandel, Wurzeln wie Mandeln.

Fr.Czackia Liliastrum *Andrcz.* — Rad. Liliastr. — . . . — 5

K.Dammara australis *Don.* — Resina Kecuri s. Kouri — 3 —

— orientalis *Don.* — Rs. Dammarae indic. — . . 3 —

Fr.Daphne Laureola *L.* nidii — Lorbeer - Seidelbast, Sem. Coccoy. — . . . . — $7\frac{1}{2}$

Fr. — Mezerum *L.* — Seidelbast Kellerhals, Cort. Mezerei — 5-10

K.Delphinium Staphysagrya *L.* — Stephanskraut — . — 10

Fr.Dentaria digitata *Lam.* k— 4

Fr. — polyphylla *W. & K.* — Rad. Dentar. minor. — k— 5

Fr.Digitalis grandiflora *Lam.* — Hb. Digit. luteae — . — 2

Er. — purpurea *L.* — Hb. Digit. purp. — . . . . . — 2

Fr.Dictamnus albus *L.* — Diptam. Rad. Dict. albi — — 5

Fr.Dioscorea alata *L.* . . — 5

— Batatas *Decn.* . k— 5

— discolor *Otto* . — 10

Als Ersatz für die Kartoffel empfohlen Batatas; hält im Freien aus.

— japonica . . r— 10

— villosa e glabra . r— 10

Yams; Kartoffelsurrogat.

Dorstenia Contrayerva *L.* — Rd. Contrayerva. — . . — 10

Dracaena Boerhavii *Ten.* . 4 —

— Draco *L.* Sämlinge . 3 —

Drachenblutbäume, liefern Sanguis Dracon.

K.Drymis chilensis *L.* — Cort. Melambo — . . . . 2 —

K. — Winteri *Foerst.* — Gewürzrinde, Cortex Winterana — . . . . . — 25

Duranta Ellisii *L.* — Fr. essb. — 10

Durio Zibethinus *L.* - Fr. essb. 10 —

Fr.Echinops sphaerocephalus *L.* Kugeldistel - Hb. Echinopsidis — . . . . — 3

Fr.Elymus arenarius *L.* . — 5

Zur Bodenbefestigung, Samen von Getreide.

Fr.Empetrum nigrum *L.* . — 10

Rauschbeere, Fr. essbar, diuretisch.

Fr.St.Ephedra distachya *L.* — — Amenta uvae marinae — 15

Fr.Eranthis hyemalis *Salisb.* (Helleborus *L.*) — Rad. Helleb. hyem. s. Aconit. hyem. k— 3

K.Eriobotrya japonica *Lindl.* — 20

Erythrina Corallodendron *L.* (spinosa *Mill.*) — Diuretisch — 1 —

Eugenia Jambos *L.* — Jambosaäpfel — (Jambosa vulgaris *D.C.*) . . . . . 1 —

Thlr. Ngr.

K.Eugenia Ugni *Hook. & Arn.* (Myrtus *Molin.*) . . — 10

Blätter; Chiles. Thee, Früchte sehr wohlschmeckend.

F.Eupatorium aromaticum *L.* — 5

Liefert Einlage zu den Havanna-Cig.

K.Euphorbia Caput Medusae *L.* — Resina Euphob. — . — 20

— officinarum *L.* — Offic. Wolfsmilch, Res. Euphorb. 3 —

Exostemma floribundum *R. & S.* (Cinchona *Sw.*) — Cortex Chinae St. Luciae s. Chinae Piton. — . . . 4 —

K.Fagara piperita *Thunb.* . — 20

Früchte u. Blätter wie Pfeffer verwdt.

Fr.Ferula tingitana *Herm.* (F. Ferulago *L.*) — Sem. arom. 1 —

Ficus elastica *Rxb.* Gummibaum — Resina elastica — . $\frac{1}{3}$-10 —

— indica *L.* . . . . — 10

— religiosa *L.* . . . — 10

Liefern Schellack, Gummi lacca.

Franciscea Hopeana *Hk.* Mercurius vegetabilis — antisyphilitisch — . . . — 10

Fr.Str.Fraxinus Ornus *L.* . — 8

— Mannaesche. —

Fr.Fritillaria imperialis *L.* — k. Rad. coronae imper. — — 4

Galactodendron utile *H. B. K.* 4 —

Milch- oder Kuhbaum, liefert trinkbare Milch.

Fr.Galega officinalis *L.* Hb. Galeg. v. — Rutae caprin. — 2

Garcinia Cowa *Roxb.* (dioica *L.* Mangostana *L.*) . . 6 —

Liefern s. wohlschmeckende Früchte.

Fr.St.Gaultheria procumbens *L.* — 10

Fr.St. — Shallon *Pursh.* . — 10

Nordamer. Thee. Früchte essbar.

Fr. Gentiana acaulis *L.* — Rad. Gent. alp. — . — 5

Fr. — asclepiadea *L.* — Rad. Gent. nostratae — — 5

Fr. — cruciata *L.* — Hb. Gentian. minoris — — 5

Fr. — lutea *L.* — Rd. Gent. lut. — 15

Fr. — Pneumonanthe *L.* — R. & Fl. Pneum. s. Antirrhini coer. — — 5

Fr. — punctata *L.* Enzian — 10

Fr. — purpurea *L.* — Rd. Gent. purpur. . — 15

Fr. — Saponaria *L.* — Rad. Gent. amer. — — 5

Fr. — verna *L.* — Rad. Gentianellae — . — 4

Fr..Geranium sanguineum *L.* — Rad. Sanguinariae — . — 3

Fr. Gladiolus communis *L.* k. — Schwertel Rad. Victorial. rotunda — . . . . — 2

Fr.Glycyrrhizae chinata *L.* — Rad. Liquir. rossicae — . — $7\frac{1}{2}$

— glabra *L.* — Süssholz Rad. Liquirit. germ. — . . — 10

Thlr. Ngr.

Fr. Glycyrrhiza lepidota *Nutt.* — Süssholz — . . . — 5

Gossypium arboreum *L.* — Baumwolle — . . . . . — 15

Fr. Gratiola officinalis *L.* — Gottesgnadenkraut — Hb. Gratiolae *L.* . . . . . . — 3

Guajacum sanctum — liefert Lignum sanctum — . . 5 —

Gunnera scabra *Ruitz.* (tinctoria *Miel.*) . . . . . — 10

Gegen Dyssenterie; jung. Blattstiele gleich Spargel, Färbestoff, dient zum Gerben, der Saft mit Wasser als kräftigendes Getränk; aber auch ausgezeichnet als Rasenblattpflanze.

Fr. St. Hedera Helix *L.* — Lign. Fol. Bacc. & Res. Hed. — — 5-15

Fr. Helleborus foetidus *L.* — Rd. & Hb. Helleb. foet. — . — 5

— niger *L.* — Schw. Nieswurz Rad. Hellebor. nigr. — — 5

Fr. Hemerocallis flava *L.* — Fl. Lilio-Asphodeli — . . — 2

Fr. Hesperis matronalis *L.* — Nachtviola, Hb. & Sem. Hesperidis — . . — 2

Heterotropa asaroides *Morr. & Dcne.* — Asarum japonic. — 20

Medicinalpflanze Japans.

Hibiscus Abelmoschus *L.* (Abelmoschus officinalis *Endl.* A. moschatus *Mch.*) — Officin. Abelmoschus — . . — 20

Hura crepitans *L.* . . $\frac{1}{2}$-2 —

Streusandbüchsenbaum; sehr geschätzt von den Homöopathen; ich lasse auch gern Tropfen in chemisch reinem Spiritus ab.

Hymenaea Courbaril *L.* — Res. Copal. mexic. — . . 5 —

Fr. St. Jasminum officinale *L.* — Flores Jasm. — . . — 5

Jatropha Curcas *L.* — Sem. Ricini major. s. infernalis Nuces cathart. — . . 1 —

— Manihot *L.* (Janipha Manihot *Knth.*) — Maniok, Amylum Tapiocca — . . 1 —

Fr. St. Ilex Aquifolium *L.* — Fol. & Baccae Aquif. — . — 5

K. — Cassine *Ait.* . . — 12

K. — Dahoon *Walt.* . . — 20

Beide Theearten Carolina & Florida's.

K. — paraguayensis *Lam.* var. angustifol. — Paraguaythee — 10-20

Wird von den Südamerikanern dem chinesischen Thee vorgezogen.

K. — vomitoria *Ait.* . . — 10

Apalachenthee.

Illicium anisatum *L.* — Sternanis — 10

Ist nach Endlicher. mit I. religiosum „Illic. anisatum *Lour.* mater anisi stellati, stiops botanicis cisignota." *Endl. Hort.* Vindob. II. p. 204.

— floridanum *L.* — Cort. arom. — 15

Surrogat der Cascarillrinde.

Fr. Imperatoria Ostruthium *L.* — Rad. Imperator. — . — 10

Inula Helenium *L.* — Rd. Inulae — 3

Thlr. Ngr.

Ipomoea Purga *Wender.* — Rad. Jalappa — . . . — 20

Fr. Iris florentina *L.* — Veilchenwurzel — . . . — $7\frac{1}{2}$

Fr. Isatis tinctoria *L.* Hb. Glosti — Waid, wilder Indigo, — 2

Fr. St. Juniperus communis *L.* — Baccae J: — . . . — 5-10

Fr. St. — Sabina *L.* — Hb. Sab. — 5-$7\frac{1}{2}$

K. r. Kadsura japonica *D. C.* — 10

Haarwuchsstärkendes Mittel.

Kaempferia Galanga *L.* — Galgant — . . k. — 10-20

K. Knowltonia vesicatoria *Sims.* 1 —

Blasen ziehend.

Fr. Lactuca Scariola *L.* . — 8

Giftlattig — Hb. Lactucae sylvestris. —

Fr. — virosa *L.* . . . . — 5

Giftlattig — Hb. Lactucae virosae. —

Lagetta Lintearia *Lam.* . — —

Spitzenbaum. Bast zu Geweben.

Fr. St. Lappa edulis *Sieb.*

Riesiger Stellvertreter der Mohrrübe, s. Beilage zur Natur No. 5. pag. 38.

Fr. St. Laurus Benzoin *L.* — Benzoë — (Benzoin odoriferum *N. ab. Es.*) . — 15

— Camphora *L.* (Camphora officinar. *Bauh.*) Kampherb. 1 —

— Cassia *Roxb.* (Cinnamom. albiflor. *N. ab Es.*) — Zimmetkassie — Cort. Cassiae $\frac{1}{2}$-1 —

— Cinnamomum *N. ab Es.* (Cinnam. zeylanic. *Bl.* verum *Sw.*) — echter Zimmet — Cort. Cinnamomi acuti — $\frac{1}{2}$-2 —

— nobilis *L.* — Lorbeer — Fruct. & Fol. Lauri — . . — 10-20

*Lavendula* Stoechas *L.* (macrostachya *Ging.* Pseudostoechas *Rchb.*) Fl. Stoech. arabic — 5

Fr. St. Ledum latifolium *L.* — 9

— Labradorthee —

Fr. Leptandra virginica *Nutt.* (Veronica *L.* Callistachys *Ruf.*) — Rad. purg. & em. — 8

K. Leptospermum Scoparium *Sm.* — 5

Neuholländ. Thee.

Fr. Leucojum vernum *L.* k. — Rad. Leucoji bulb. — . . — 5

Fr. *Levisticum* officinale *Koch.* — 5

— Liebstöckel. Rad. Levistici. —

Fr. Lilium candidum *L.* k. — Rad. & flor. Lilior. alb. — — 2

Limonia spectabilis — Limonie, essbare Frucht — . $\frac{1}{3}$-1 —

K. Lippia citriodora *Kth.* (Verbena *L.* triphylla *L'Her.* Aloysia *Orteg.*) 10

— Sehr wohlriechendes Theesurrogat. —

Fr. St. Liquidambar styraciflua *L.* — Storax v. Balsamum v. Ambra liquida — — 10

Fr. St. Liriodendron Tulipifera L. — Tulpenbaum — Cort. Liriodendris — klein — 5

K. Lobelia inflata *H.* — Hb. Lob. infl. — . . . . . — 5

Fr. — syphilitica *L.* — Rad. emetica & antisyph. — — 5

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr. Lunaria biennis *Mich.* (annua *L.*)— | | 2 |
| — redivica *L.* — Sem. Violae lunar. — . . . . — | | 3 |
| Mammea americana *L.* — Mamayfrucht. starke Pflanzen — | 2-5 | — |
| Mandragora vernalis *Bert.* (Atropa Mandrag. *W.*) — Alraunwurzel, Springwurzel Rad. Mandrag. — . . . — | | 20 |
| Maranta arundinacea *L.* — Arrow-Root, Rad. Marantae, amylum Mar. — . . — | | 10 |
| Fr. Marrubium creticum *L.* . . — | | 5 |
| Fr. — vulgare *L.* — Hb. Marrubi — | | 2 |
| Melaleuca Cajuputi *Roxb.* — | | — |
| Liefert das echte Cajeputöl. | | |
| K. — Leucadendron L. . . — | | 20 |
| Melicocca bijuga *L.* Honigbeere | 2-4 | — |
| Fr. Melilotus officinalis *Pers.* — | | 2 |
| — alba *Desc.* — Hb. & Fl. — Melioti — Honigklee — — | | 2 |
| Fr.— macrorrhiza *Pers.* . — | | 2 |
| Fr. Melittis Melissophyllum *L.* — Hab. Melissophylli — . — | | 5 |
| Fr. Menyanthes trifoliata *L.* — Hb. Trifolii fibr. — . — | | 5 |
| Fr. Meum athamanticum *L.* — Rad. Mei. — . . . . — | | 5 |
| Mikania Guaco *Hort. & Humb.* — | | 5 |
| Schlangengegengift & Universalmittel im tropischen Amerika, besonders gegen Cholera wirksam. Nur die echte Pflanze dieses Namens (Humbie Bonpl.) hat diese Wirkung. | | |
| Monarda didyma *L.* — N.-Amer. Theesurrogat — . . . — | | 3 |
| Fr. — Kalmiana *Pursh.* . — | | 3 |
| L. Muehlenbergia complexa *Meissn.* | | 5 |
| Die Stengel geben den sogenannten Austral. Sassaparill. | | |
| Musa Cavendishi *Hook. Paxt.* — Banane, Pisang, Paradiesfeige — . . . . . | 1/2-6 | — |
| — coccinea *Andr.* (Uranoscopus *Lour.*) . . | 1-2 | — |
| — Dacca *Mak.* . . | 1/2-6 | — |
| — paradisiaca *L.* . . | 2-4 | — |
| — rosea *Jacq.* . . . | 2-4 | — |
| — speciosa *Tenore* . . | 2 | — |
| — zebrina *H. V. H.* . | 1-4 | — |
| Fr. Muscari moschatum *W.* (Hyacinthus *L.* k.) — Muscathyacinthe, Rad. muscari mosch. — | | 4 |
| Fr. St. Myrica cerifera *L.* — Wachsbeere — . . . — | | 8 |
| Fr. St. Myricaria germanica *Desv.* (Tamarix *L.*) — Cort. Tamarisci — . . . . . . — | | 4 |
| Myristica Horsfieldii *Hrt. n. Spr.* — Muskatnussbaum. | | 10 |
| Fr. Myrrhis odorata *Scop.* — Hb. Rad. & Sem. Myrrhid. . — | | 10 |
| K. Myrsine africana . . — | | 10 |
| Gegen Bandwurm. | | |
| Myrthus Pimenta *L.* (Eugenia *D.C.*) Nelkenpfeffer — Sem. Amomi, Piper jamaicense | 1/2-1 | — |
| Fr. Narcissus Pseudo-Narcissus *L.*— | | 1 |
| Fr. — poëticus *L.* k. — Rad. Narcissi . . . . , k— | | 1 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| K. Nerium Oleander *L.* — Fol. Oleandri — . . . . — | | 5 |
| K. Olea fragrans *Thbg. Vahl.* — | | 10 |
| Blüthen zum Parfümiren des chines. Thees. | | |
| Oryza sativa *L.* Reis . — | | 5-15 |
| Fr. Osmunda regalis *L.* — Juli Osmundae herba — . — | | 10 |
| Fr. St. Paeonia Moutan *Sims.* (arborea *Hort.*) . , . — | | 10 |
| Chines. und Japan. Arzneimittel. | | |
| K. Pancratium maritimum *L.* k. — Rad. Pancr. mar. — — | | 15 |
| Fr. Papaver orientale *L.* . — | | 4 |
| Opiumpflanze. Das echte Opium liefert Papaver somniferum und P. officinale. | | |
| Passiflora edulis *Sims.* . — | | 5 |
| — quadrangularis *L.* . — | | — |
| Früchte beider essbar; die Wurzel letzterer sehr giftig. | | |
| K. Persea gratissima *Gaertn.* (Laurus Persea *L.*) Avogadobaum | 3 | — |
| Fr. Peucedanum officinale *L.* — Hb. Foeniculi porcini — — | | 10 |
| Fr. St. Phillyrea latifolia *L.* — Cort. Phillyraeae — . — | | 5 |
| Phlomis tuberosa — *L.* Wurz. essb. — | | 5 |
| Phormium ferrugineum . | 1 | 15 |
| K. — tenax *L.* . . . . | 1 | — |
| Neuseeländ. Hanf. Zugleich eine der prächtigsten Rasenpflanzen. die am üppigsten gedeiht, wenn an Wasserränder gepflanzt. | | |
| Fr. Physalis Alkekengi *L.* — Judenkirsche. Bacc. Alkeck. — | | 2 |
| K. — peruviana *L.* (edulis) — | | 15 |
| Peruv. Judenkirsche, Frucht essbar. | | |
| Fr. Phytolacca decandra *L.* k— | | 5 |
| Farbenpflanze, Kermesbeere. Wurzel purpurfärbend. | | |
| F. — esculenta *V. H.* — Kartoffelsurrogat — . . k— | | 5 |
| Fr. St. Pinus balsamea *L.* — — | | 10 |
| Fr. St. — canadensis *L.* — Terebinth canad. — . . — | | 10-25 |
| Piper Betle *L.* (Chavica *B. Miq.*) Betel-Pfeffer — Fol. Betle — | | — |
| Wird in Ostindien gekaut. | | |
| — Cubeba *Hort.* (Cubeba officinalis *Miq.*) — Kubebenpfeffer, Cubebae — . — | | 25 |
| — nigrum *L.* — Schwarz. Pf. Piper nigr. & album — — | | 10-20 |
| — spurium *Lk.* (nigrum *H.*) falscher Pfeffer . . — | | 15 |
| K. Pistacia Lentiscus *L.* — Mastixbaum. Gummi s. Resina Mastix & lign. lentiscinum — | | 10 |
| K. — Terebinthus *L.* — Therebinthin.cypria & Gallae pistacinae — . . . . — | | 10 |
| — vera *L.* — Nuces Pistaciae s. Amygdal. viridia, Pistacia | 1 | — |
| Fr. St. Plantago Cynops *L.* — Flohsamen, Sem. Psyllii s. Pulicariae — . . . . — | | 7 1/2 |

Thlr. Ngr.

Plectranthus fruticosus *L.* — 5-10
Eine wenn auch schon ältere Heilpflanze, doch in neuerer Zeit, ganz besonders gegen alte Wunden und Gicht empfohlen. s. Neuberts Magaz. Heft 40.

Pogostemon Patchouli Pelod. — 10
Beliebtes Parfüm.

Fr. Polymonium coeruleum *L.* — Hb. Valerian graec. — — 2
Fr. Polygonum amphibium *L.* — Hab. Persicar. acid. Jungermann. — . . . . . — 3
Fr. — Bistorte *L.* — Rad. Bistortae — . . . . . . — 3
Fr. — Sieboldii . . . . — 10
Neue Nutzpfl., auch Decorationspfl. s. Beilage zur Natur No. 5 p. 38.

Polypodium crassifolium *L.* — Rad. Calagualae — . — 10
Fr. — vulgare *L.* — Engelsüss. Rad. Filiculae dulc. s. Polypodii — . . . . . — 5
Fr. Potentilla rupestris *L.* — Rad. Quinquefol. fragif. Blumen in Sibirien zu Thee — 2
Prunus Laurocerasus *L.* Cerasus *L.* Loisel — Kirschlorbeer Fol. Lauroc. — . . . — 5-15
Psidium Acre (Araca *Raddi.*) — 20
— Cattleyanum *Sab.* . — 10
— feruginеum *Presl.* . — 10
— montanum *Sw.* . . — 10
— obovatum *Mart.* . . — 10
pyriferum *L.* . . . — 10
Guajavabäume; liefern die Birnen d. Tropen.

Fr. Pulmonaria offinalis *L.* Lungenkraut — Hb. Pulmon. — 2
— virginica *L.* (Mertensia virginica P. *D. C.* — Virginisches Lungenkraut gegen Diarrhoe, sehr schöne Pflanze — . . . . — 8
K. Punica Granatum *L.* — Granat. Cort. radic. Flores & Malicorium Granator — — 5
Fr. Pyrethrum Balsamita *Bl.* — Hb. Balsamitae — . . — 2
— carneum *M. B.* . . — 5
— roseum *M. B.* . . . — 5
Liefern das persiche Insectenpulver.

K. Quercus coccifera *L.* Coccus Ilicis . . . . . — 12
K. — esculenta . . . . — 24
K. — glabra Thunb. . . — 15
K. — Ilex *L.* . . . . . — 12
Früchte essbar, letztere liefert auch Kork.

— Suber *L.* — Korkeiche Cortex Suberis — . . — —
— tinctoria *W.* — Quercitronholz Lign. tinctorium — — 10
Fr. Rhamnus Frangula *L.* — Fauldornholz Cort. Frangulae s. Alni nigri — . . . — 5
Fr. St. — tinctorius *W. & K.* — Farbepflanze. — . — $7\frac{1}{2}$

Thlr. Ngr.

Fr. Rheum Emodi *Wall.* (australe *D. Don.*) — Rhabarber, R. Rhei. — . . — 10
— palmatum *L.* Rhabarber — Rad. Rhei. angl., gallic. s. austriaci — . . — 15
Fr. — Rhaponticum *L.* — Rhabarber Rad. Rhei. Barbarivi s. sibir. — . — 5
Fr. Rhodiola rosea *L.* — Rosenwurz k. Rad. Rhadiolae — 5
Fr. St. Rhododendron ferrugineum *L.* — Stipites Rhododendri — klein . — 5
Fr. Rhus aromaticum *Ait.* . — 18
Fr. St. — Copallina *L.* — Copal — 9
Liefern den Saft zum Lackiren der Chin. und Japan. Lackwaaren.

Fr. — Cotinus *L.* Cort. — Lign. Cotini — . . — 5
— Toxicodendron *L.* — Giftsumach Hb. Toxicodendri — . . . — 10-20
Bei reizbarer Haut erzeugt nicht nur die Berührung der Blätter sofort Geschwulst, sondern ergreift auch die Körpertheile, welche man nachher berührt.

Fr. St. — typhinum *L.* — Fol. & Sem. — . . . . . — 5
K. Richardia aethiopica *Kth.* Calla k. Rad. Aethiop. — . — 5-10
Roxbourghia officinalis *Hort.* 3 —
Fr. Rubia tinctorum *L.* Krapp. — Rad. Rubiae tinctor. — — 3
Fr. Rubus articus *L.* Niedliches schönblühendes Pflänzchen; die Beeren essbar. . — 10
A. Rumex alpinus *L.* Mönchsrhabarber — Rad. Rhabarbari monachor — . . . . — —
— obtusifolius *L.* — Rad. Lapathi obt. fol. purpur. — — 4
Fr. Ruscus aculeatus *L.* — Mäusedorn Rad. & Turion Rusci — 5
Fr. Ruta divaricata *Ten.* . — 6
— graveolens *L.* Raute — Hb. Rutae 4
Saccharum officinarum *L.* — Zuckerrohr. — . . $\frac{1}{2}$-2 —
— violaceum *Juss.* . . 1 —
Fr. Sagittaria sagittaefolia *L.* — Pfeilwurz. Rad. Sagitt. — — 7
Wurzel essbar.

Fr. Salvia officinalis *L.* — Salbei Hb. & Fol. Salviae — . — 3
— Sclarea *L.* — Hb & Fol. Salv. roman. — . . . — 4
Fr. Sambucus Ebulus *L.* — Bac. Ebuli — . . . . . — 5
Sapindus Saponaria *L.* — Seifenbaum Nuculae Sapon. — $\frac{2}{3}$-$1\frac{1}{2}$
Sapota Achras *Mill.* (Achras Sapota) — Sapotaapfel, Breiapfel — . . . . . 3 —
Fr. Saxifraga crassifolia *L.* — Sibirischer Thee — . — 3
Fr. Scolopendrium officinarum *Sw.* — Hb. Scolopendr. s. Ling. cervin. — . . — 10

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr.Scutellaria lateriflora *L.* — Hb. Scutella, lateriflora — . | — | 3 |
| Fr.Sedum album *L.* — Hb. — Sedi albi — . . . . | — | 3 |
| Fr. — purpureum *Lk.* k. — Hb. Crassulae major. — | — | 5 |
| Fr.Sempervivum tectorum *L.* — — Hauslaub Hb. Sedi maj. | — | 5 |
| Fr.St.Smilax aspera *L.* . | — | 10 |
| Fr.St. — Sarsaparilla *L.* — Sarsaparille, Rd. Sarsaparillae | 1 | — |
| Fr.St.Spartium junceum *Lk.* — Hb. Sem. Genistae hispan. | — | 6 |
| Fr.St. — scoparium *L.* — Sem. Spartii s. Genistae scop. | — | 3 |
| Fr.Spiraea Aruncus *L.* — Hb. Barba Caprae — . . | — | 5 |
| Fr. — Filipendula *L.* — Rad. Saxifr. rubrae — . . | — | 3 |
| Fr. — Ulmaria *L.* — Hb. Reginae pratens. — . . . | — | 3 |
| Spondias Mombin *L.* (purpurea *L.*) Mombinpflaume . | 1-3 | — |
| Fr.Statice Limonium *L.* — Rad. Limonii — . . . . | — | 8 |
| Stenotaphrum glabrum *Trin.* — Rad. saccharina — . | — | 10 |
| Fr.Sternbergia lutea *Ker.* k. — Rad. Lilio-Narcissi — . | — | 4 |
| Strychnos Curare *Hort. Lind.* — Krähenauge — . . | 1-2 | — |
| Soll die echten Nuces Vomicae liefern; s. giftig. Nach Untersuchungen des H. Geh. Medic.-R. Prof. Dr. Goeppert soll der Saft dieser Pflanze Strychnin enthalten. | | |
| Styrax officinalis *L.* — Gummi Styr. & Cort. Thymiamatis | — | 15 |
| Swietenia Mahagoni *L.* — Mahagonibaum, Cort. & Lign. Mahagoni — . . . . | 9 | — |
| Tamarindus indica *L.* — Tamarinde, Fructus Tamarindorum — . . . . . | 1/2-1 | — |
| Fr.St.Tamarix gallica — Tamarisk, s. libanotica (mannipara) — . . . . | — | 6 |
| Liefert Manna. | | |
| Fr.Tamus communis *L.* k. — Bryoniawurzel, Rd. Tam. s. Bryon. nigrae — . . | — | 20 |
| K. — Elephantipes *L.* — (Testudinar.) Elephantenfuss — | 5-15 | — |
| Aus dem sagoreichen Mark bereiten die Kaffern eine Art Brod. | | |
| Fr.St.Taxus baccata *L.* — Eibenbaum, Lign. Folia bacc. Taxi — . . . . . | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Teucrium Chamaedrys *L.* — Gamander, Hb. Chamaedryos | — | 5 |
| Fr.Thalictrum aquilegifolium *L.* — Rad. Thalictr. s. Pseudo-Rhabarb. s. Rhab. pauper. | — | 3 |
| K.Thea Bohea *L.* — Assam-Thee (chinens. *Sims.* c. Bohea aut-) | — | 15 |
| K. — viridis *L.* — Theepflanze | — | 20 |
| Theobroma montana *Bergm.* — Bergkakao — . . | 10 | — |
| Fr.St.Thuja occidentalis *L.* — Hb. arbor. vitae — . | 1/3-2 | — |
| Fr.Tussilago Farfara *L.* — Huflattig, Hb. & Flor. Farf. | — | 2 |
| Fr. — alba — Hb. Cacaliae tom. | — | 2 |
| Fr.Typha latifolia *L.* — Sem. Typhae — . . . . | — | 5 |
| K.Ullucus tuberosus *Lozan.* | — | 6 |
| Quitensisches Kartoffelsurrogat. | | |
| Fr.Umbilicus pendulinus *D.C.* k. (Cotyledon Umb. *Hort.*) | — | 8 |
| Homöopathisches Mittel. | | |
| Fr.Uvularia grandiflora *Sm.* | — | 5 |
| Gegen Schlangenbiss. | | |
| Fr.Valeriana dioica *L.* Baldrian — Rad. Valerian. minoris & palustris —. . . . | — | 2 |
| Vanilla planifolia *Andr.* — Vanille Siliquae Vanillae — . | 1/2-1 | — |
| Fr.Veratrum album *L.* (1jähr.) | — | 10 |
| Fr. — — v. Lobelianum (viride) | — | 10 |
| Fr. — nigrum *L.* — Weisse Nieswurz, Rad. Helleb. albi — | — | 10 |
| Fr.Veronica Beccabunga *L.* — Bachbunge, Hb. Beccabungae | — | 1 |
| Fr.St.Viburnum Lantana *L.* — Bacc. & Fol. Lantan. — | — | 5 |
| Fr.St. — Opulus *L.* — Cort. & Bacc. flor. Sambuci aquat. | — | 5 |
| Fr.Vinca major *L.* — Hb. Vincae Pervincae — . . | — | 3 |
| Fr. — minor *L.* . . . . . | — | 2 |
| Fr.St.Virgilia lutea *Lam.* . | — | 25 |
| Gelbholz vom Cumberlandfluss. | | |
| Fr.St.Vitex Agnus Castus *L.* — Sem. Agni casti . . . | — | 5 |
| Fr.St.Weigelia lutea (Diervilla canadensis *W.*) — Stipites Diervillae . . | — | 5 |
| Xantochymus pictorius *Roxb.* — Gummi Guttae v. Mysore | 7 | — |
| Zingiber Cassumunar *Roxb.* k. Ingwer, Rad. Cassumunar s. Zedoareae luteae — · | — | 10 |
| — officinale *Rosc.* k. — echter Ingwer, Rad. Zingiberis | — | 10 |
| Fr.St.Zizyphus Paliurus *W.* — Paliurus aculeata, Bacc. diuret. | — | — |

# Plantæ aquaticæ.

Durch die Victoria regia wurden wir aufmerksam gemacht, mit welchem Unrecht wir unsere Bassins, Teiche und See'n vernachlässigt, und um welchen Genuss wir uns bisher durch Hintansetzung der so köstlichen Wasserpflanzen gebracht! In der neuesten Zeit hat man sich bemüht, diese Unterlassung wieder gut zu machen und davon die herrlichsten Erfolge geerntet. Herrn Inspec-

tor C. Bouché des berliner botanischen Gartens gebührt aber vor Allem der Ruhm, zuerst erkannt zu haben, dass es einer Kreuzung der so selten blühenden Nymphaea rubra bedürfe, um nicht nur reichlich, sondern auch brillant blühende Bastarde zu erzeugen. Seiner unendlichen Umsicht verdanken wir die mit C. B. bezeichneten Hybr. — Es ist ein Farbenspiel vom zarten Rosa bis zum feurigsten Purpur — so feurig, dass, wie ich mich selbst überzeugt — das Auge geblendet wird.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr. Acorus Calamus *L.* officin. | — | 5 |
| — gramineus *Ait.* fol. var. | — | 5 |

Medizinalpflanze Japans.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Alisma cordifolium *L.* . . | — | 10 |
| Fr. — Plantago *L.* B lanceolat. Offic. Plantago aquatica | — | 6 |

Früher gegen Wasserscheu gerühmt.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Anacharis alsinastrum *Bab.* | — | 10 |

Im Canal seit Kurzem in Massen auftretend, woselbst sie kleinen Fahrzeugen Schwierigkeiten bereitet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Aponogeton monostachys *Ait.* | — | 15 |
| K. Arum div. spec. v. Aroideae | — | — |
| Fr. Arundo Donax *L.* . . . | — | 15 |
| K. Atteriscus aquaticus *D. C.* (Buphtala *L.*) . . | — | 15 |
| Fr. Butomus umbellatus *L.* | — | 5 |
| Calla Dracontium *Mey.* . | — | 10 |
| Fr. — palustris *L.* . . . | — | 8 |
| †Carex variegata . . . | — | 5 |
| Cyperus alternifolius *L.* . | — | 15 |
| Fr. — badius *Desf.* (thermalis *Schrad.*) . . . . . | — | 8 |
| Fr. — longus *L.* . . . . | — | 10 |
| — pungens *H. Ber.* (textilis *Thbg.*) . . . . . | 1/3-3 | — |
| Euryale ferox *Salisb.* . . | 2 | — |
| Herpestes cuneifolia *Pursh.* | — | — |
| Hydrocotyle bonariensis *Lam.* | — | 20 |
| Hydrolea spinosa *L.* . . | — | 12 |
| Fr. Iris Pseudacorus *L.* . | — | 5 |
| Jussieua sp. . . . . . | — | 10 |
| K. Marsilea aegyptiaca (Wasserfarrn) . . . . . | 2 | — |
| Fr. Menyanthes trifoliata *L.* (off.) | — | 5 |
| Nelumbium Count of Thun *H. Tetschen* . . . . | 1-2 | — |
| — flavescens . . . . | 1-2 | — |

Das Bassin, dem Nelumbien fehlen, entbehrt der höchsten Zierde. Vielen dürfte es aber unbekannt sein, dass die 2 Fuss breiten Blätter sowie die köstlich duftenden grossen blassrothen Blüthen oft ellenhoch übers Wasser ragen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr. Nuphar luteum *Sw.* . . | — | 5 |
| Fr. Nymphaea biradiata *Som.* stark | — | 10-20 |
| — cyanea *Roxb.* . . | — | 10 |
| — gigantea *Hook.* . . | 3 | — |
| — hybrida Inspector Bouché. (Bouchéana *Bche.*) . | 1 | 15 |

Blassrosa, die inneren Petalen weiss, die Staubfäden gelb. Dies war der erste glückliche Vorläufer der Bouché'schen Züchtung!

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — — A. Borsig, *C. Bouché.* hellrosa . . . | 1 | 15 |
| — — Adele *C. B.*, purpur mit orangenen Staubfäden . | 1 | 15 |
| — — Caspariana, *C. B.*, purp. mit rothbraunen Staubf. | 1 | 15 |
| — — Dr. Klotzsch. *C. B.*, hellpurpur mit rothbraunen Staubfäden . . . . | — | 20 |
| Nymphaea hybrida Elisabeth, *C. B.*, blassrosa, sehr grossblumig, mit gelben Staubfäden | 1 | 15 |
| — — Friederike, *C. B.*, rosa mit ocherfarbigen Staubf. | 1 | 15 |
| — — General-Director Lenné, *C. B.*, zart rosa, im Innern fast weiss mit gelben Staubfäden . . . . | 1 | 15 |
| — — Gustav Fintelmann, *C. B.*, dunkelpurpur mit braunen Staubfäden . . | 1 | 15 |
| — — Louis Mathieu, *C. B.*, rosa mit bläulichem Anflug und orangenen Staubfäden | 1 | 15 |
| — — Professor A. Braun, *C. B.* blassrosa, sehr breite Petalen und gelbe Staubfäden | — | 20 |
| — — — C. Koch, *C. B.*, hellpurpur . . . . . | — | 20 |
| — — Theodor Jannoch, *C. B.* rosa, sehr grossblumig . | 1 | 15 |
| — — — Nietner, *C. B.*, purpur mit bläulichem Anflug und orangenen Staubfäden | 1 | 15 |
| — — Van Houtte, *C. B.*, rosa mit bläulichem Anflug und ocherfarbigen Staubfäden | 1 | 15 |
| — — Wendland, *C. B.*, hellpurpur mit ocherfarbenen Staubfäden . . . | 1 | 15 |
| — pygmaea *H. & K.* . k | 1 | — |
| Fr. Oryza sativa *L.* Reis . | — | 5-15 |
| Ouvirandra fenestralis *Poiret.* stark, durchwinterte Knollenpflanzen . . . . | 30 | — |

Eine köstliche Einführung aus Madagascar! die besonders durch den originellen Netzbau ihrer Blätter zu einer Erscheinung wird, wie sie unter den Pflanzen bisher noch nicht bekannt war. Man hat ihre Schönheit bestritten, doch glaube ich bestimmt, dass nur der daran zweifeln kann, der noch keine kräftige Pflanze sah.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Papyrus antiquorum *Lk.* (Cyperus Papyrus *L.*) . . | 3 | — |
| Fr. Phragmites comm. Trin. fol. var. . . . . . . | — | 15 |
| Philodendron s. Aroideae. | | |
| Fr. Polygonum amphibium *L.* | — | 3 |
| †Fr. Pontederia cordata *L.* . | — | 10 |
| †Pothos v. Aroideae. | | |
| Richardia aethiopica *Kth.* (Calla *L.* Zantedeschia *Spr.*) . | — | 5-15 |
| Sagittaria lancifolia *L.* . | 1 | — |
| Fr. — sagittaefolia *L.* . . | — | 8 |
| †Fr. Saururus cernuus *L.* . | — | 5-10 |
| — lucidus *L.* . . . | — | 15 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Fr.Stratiotes aloïdes *L.* | — | 10 |

Als schwimmende im Freien ausdauernde Wasserbromeliacee, eine der merkwürdigsten Erscheinungen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Thalia dealbata *L.* | — | 15 |
| Fr.Typha latifolia *L.* | — | 5 |
| K.Fr.Vallisneria spiralis *L.* fem. | — | 5 |
| Victoria regia *Lindl.* | 4 | — |
| K.Villarsia parnassifolia *R. Br.* | — | 8 |

Die mit † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand der Töpfe ins Wasser gestellt werden.

# Scitamineæ & Musaceæ.

An Reichthum der Blattformen, des Colorit's, der Eleganz, stehen sie den Aroideen kaum nach, an Originellität und Schönheit der Blüthen übertreffen sie jene noch, und ich hoffe, der bessere Ueberblick, den ich durch die Ausscheidung der ganzen Familie über dieselbe verschaffte, wird den vielen Freunden derselben willkommen sein.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Alpinia Aluchas *Rosc.* | — | 15 |
| — humilis *Hort.* | — | 12 |
| — nutans *Rosc.* | — | 15 |
| Amomum Cardamomum *L.* | — | 5-10 |
| Calathea flavescens *Ldl.* | — | 10 |
| Canna Achiras *Gillier.* | — | 10 |
| — Altensteinii *Bouché.* | — | 7½ |
| — amoena *Bouché.* | — | 10 |
| — aurea *Bouché.* | — | 10 |
| — aureo-vittata *Lodd.* (limbata *Rosc.*) | — | 20 |
| — Bengalensis *Bouché.* | — | 10 |
| k — Bolleana *Bouché.* | — | 5 |
| — calosantha *Bouché.* | — | 10 |
| k — coccinea *Ait.* (crocea *Roem. & Schult.* speciosa major. *Hegetsw.*) | — | 5 |
| k — discolor *Lindl.* | — | 5 |
| — elegans *Bouché.* | — | 10 |
| k — flavescens *Ls.* (orientalis var. flava *Rosc.* indica var. flava *Roxb.*) | — | 5 |
| — flaccida *Rosc.* grossbl. | — | 10 |
| — formosa *Bouché.* | — | 10 |
| — heliconiaefolia *Bouché.* | — | 15 |
| k — iridiflora *R. & Pav.* | — | 10 |
| — Karsteniana *Bouché.* | — | 15 |
| — Lagunensis *Bouché.* | — | 7½ |
| — Lüpkeana *Bouché.* | — | 20 |
| k — lutea *Rosc.* | — | 5 |
| — luteo-picta *Hort.* | — | 20 |
| — nanna pallida | — | 20 |
| — pallida *Rsc.* (commutata *Bché.*) | | 10 |
| — patens *Rosc.* | — | 5 |
| — pedunculata *Sims. Bouché. Weinm.* | — | 7½ |
| — peruviana *Bouché.* | — | 15 |
| k — picta *Hort.* | — | 10 |
| — pruinosa *Bouché.* | — | 15 |
| — rubicunda *Bouché.* | — | 15 |
| — sanguinea *Lodd.* | — | 5 |
| — saturate-rubra *Bouché.* | — | 10 |
| — Schuberti *Bouché.* | — | 15 |
| k — spec. e Havannah | — | 10 |
| — — - Meridor | — | 5 |
| k — spectabilis *Bouché.* | — | 15 |
| — stenogyna *Bouché.* | — | 10 |
| — staminea *Bouché.* | — | 10 |
| — texenis *Bouch.* | — | 10 |
| — variegata *Bouché.* | — | 10 |
| k — violacea *Hort. Berol.* | — | 5 |
| Canna Wagneriana *Bouché.* | — | 10 |
| k — Warscewiczii *Otto & Dietr.* | — | 5 |

Da man sie wegen ihres imponirenden Blatt- und Blüthenschmuck's jetzt sehr als Gruppenpflanze für's freie Land sucht, habe die Sammlung bedeutend erweitert.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Costus comosus, mit weich behaarten Blättern | 2 | — |
| — elegans | 1 | 10 |
| — speciosus *Sm.* (arabicus *L.*) | — | 15 |
| — spiralis *Rosc.* | — | 10 |
| Curcuma Amada *Roxb.* | — | 5 |
| — fusca | — | 10 |
| — longa *L.* | — | 10 |
| — Roscoëana *Wall.* | — | 20 |
| — speciosa | — | 15 |

Ausser decorativer Haltung blüht sie so dankbar als schön.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Elettaria cardamomum *White & Mont.* (Alpinia Cardam. *Rxb.*) | — | 10 |
| Hedychium flavum *Roxb. Wall.* | — | 15 |
| — Gardnerianum *Wall.* | — | 10 |
| Heliconia angustifolia *Hook.* | ½-1 | — |
| — aurea | 2 | — |
| — Bihai *Swt.* | — | 10 |
| — buccinata *Roxb.* (indica *Lam.* Phrynium *Hort.*) | — | 8 |
| — discolor *H. Berol* | — | 10 |
| — psittacina *L.* | — | 10 |
| — pulverulenta *Ld.* (farinosa *Rddi.*) | — | 12 |
| — spec. Mirador | 1 | 15 |
| Kaempferia Galanga *L.* | — | 10-20 |
| — longa *Jacq.* (rotunda *L.* rotundif. *Hort.* versicolor *Sal.*) | — | 20 |
| Maranta arundinacea | — | 10 |
| — bicolor *Ker.* | — | 5 |
| — cannaefolia *H. Amst.* | — | 20 |
| — coccinea floribunda *Rendatler* | 1 | — |
| — eximia *V. Houtte.* | — | 10 |
| — fasciata *Lind.* | 2 | — |
| — glumacea *V. Htte.* | — | 10 |
| — gracilis *Rudg.* | — | 10 |
| — lutea *Jacq.* | — | 10 |
| — ornata *Kcke.* | — | 10 |
| — — s. roseo lineata *Lind.* | 2-3 | — |
| — — o. regalis *V. H.* | 3 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Maranta sanguinea Hort. (Phrynium Hk. Stromanthe Loud.) | 1/3-1 | — |
| — Sellowii Hort. | — | 5 |
| — species e Venezuela | 1 | — |
| — variegata Lodd. | — | 20 |
| — vittata H. Belg. (Phrynium pumilum) | — | 20 |
| — Warszewiczii Kl. (Phryn.) | 1-2 | — |
| — zebrina Sims.(Calathea Ldl.) | 1/2-1 | — |
| Musa Cavendishii Hook. | 1/2-6 | — |
| — coccinea Andr. | 2/3-1 | — |
| — Dacca Mak. | 1/2-6 | — |
| — paradisiaca L. | 2/3-1 | — |
| — rosacea Jacq. | 1-3 | — |
| — speciosa Tenore. | 2 | — |
| — zebrina H. v. Htte. | 1-4 | — |

Im Zimmer gehören sie zu den schönsten Decorationspflanzen, nur verlangen dieselben reichlichen Düngerguss.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Myrosma cannaefolia L. fil. | — | 10 |
| — comosa (Mar. truncata Hrt.) | — | 10 |
| Phrynium leptostachyum Hort. Petrop. | — | 10 |
| — marantinum Willd. | 2/3-1 1/2 | — |
| — Riedellii | 1 | 15 |
| — setosum Roxb. | — | 5 |
| — spicatum Roxb. | — | 10 |
| — rubricaule | — | 10 |
| Scitamineae sp. e Surinam | 2 | 15 |

Blätter schön hellgrün gestreift.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Strelitzia augusta Thnb. (Heliconia alba L.) | 10-15 | — |
| Thalia dealbata Rosc. (Maranta Fras. Heliconia Lodd. Peronia stricta D. C.) | — | 15 |
| Urania speciosa Schrb. (Ravenala madagascariensis Sonner) vera! | 10 | — |
| K. Zingiber Cassumunar. Roxb. | — | 10 |
| K. — officinale Rosc. | — | 10 |

# Kalthauspflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Abutilon Alphonse Karr Hort. | — | 8 |
| — Bedfordianum H. angl. f | — | 5 |
| — Comtesse de Maria Spada | — | 8 |
| — flore albo | — | 8 |
| — marmoratum Hort. (Hibiscus Ch. Lem.) fl | — | 8 |
| — parviflorum H. | — | 5 |
| — Sonneratianum Hort. f (Sida W. Cav.) | — | 5 |
| — Souvenir d'Arragon Hort. | — | 8 |
| — — de Cauchy Hort. | — | 8 |
| — striatum Ldl. f | — | 5-20 |
| — Tour de Malakoff | — | 8 |
| — van Houtte | — | 8 |
| — venosum Ch. Lem. f | — | 5-20 |

Im Sommer decoriren die Abutilon köstlich im Freien, lassen sich ohne Nachtheil einpflanzen, im Winter imponiren die herrlichen Glöckchen. Nächst den bekannten A. striatum und venosum sind es vorzüglich die Gartenhybriden Alphonse Karr, Souv. d'Arragon und Souv. de Chauchy, welche sowohl in Grösse der Blumen, als Zartheit der Farben alle anderen übertreffen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acacia argyrophylla Hook. | 1 | — |
| — Bartheriana V. Houtte. | 1 | — |
| — brachyphylla | 2 | — |
| — brevifolia Lodd. | — | 5-20 |
| — capensis Colla. | — | 10 |
| — dealbata Lk. | — | 10 |
| — decipiens R. Br. | — | 15 |
| — dolabriformis Wendl. | — | 10 |
| — Douglassii | 1 | — |
| — Eburnea W. | — | 20 |
| — falcata W. | — | 10 |
| — Farnesiana W. | — | 10 |
| — floribunda W. | — | 7 1/2 |
| — glaucescens W. B. Hügelii | — | 15 |
| — grandis A. Henfr. | — | 15 |
| Acacia hispidissima D. C. | — | 15 |
| — ixiophylla | — | 10 |
| — Julibrissin W. | — | 5 |
| — latifolia Benth. | — | 5 |
| — leiophylla Benth. (Bloomei Ohlendorf) | — | 10 |
| — Melanoxylon R. Br. | — | 5 |
| — Neumanni Hort. | — | 15 |
| — ovoidea Benth. (galliophylla Hort.) | — | 20 |
| — Oxycedrus Sbr. | — | 10 |
| — paradoxa D. C. | — | 5-15 |
| — plumosa | 1 | — |
| — pulchella R. Br. | — | 10 |
| — — R. Br. var. major. | — | 10 |
| — retinoides Schlechtend. | 1 | — |
| — rotundifolia Hook. (obliqua Chant.) | — | 10 |
| — ruscifolia Cunn. | — | 20 |
| — Sophora R. Br. | — | 10 |
| — strombulifera W. | — | 20 |
| — tenuiflora W. | — | 15 |
| — trinervis Sbr. | — | 10 |
| — verticillata W. | — | 5 |
| Aeonium cruentum Webb. | — | 5 |
| — cuneatum Bolle. | — | 5 |
| — complanatum Bolle. | — | 5 |
| — decorum Bolle | — | 5 |
| — gomeraceum Bolle. | — | 5 |
| — polychrysum Bolle. | — | 5 |
| — polystachyum Bolle. | — | 5 |
| — urbicum Bolle. | — | 5 |
| — viscatum Bolle. | — | 5 |
| *Agave americana L. stark | 2 | — |
| — lurida Ker. | — | 20 |
| Ageratum coelestinum Sims. | — | 5 |
| — cyaneum novum Hort. | — | 5 |
| — suffruticosum Rgl. (Eupatorium novum H. Gall.) | — | 5 |
| Albizzia Lophanta Benth. (Acacia L.) | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Alonsoa Warszewiczii *Rgl.* | — | 5 |
| Aichrysum villosum *Bolle* | — | 5 |
| — dichotomum *Bolle* | — | 5 |
| — sp. de Saltaderos | — | 5 |

Beide Genera sehr niedlich in Miniaturtöpfchen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Anagallis Brewcri *Hort.* | — | 5 |
| Anagyris indica | — | 15 |
| Androsaemum officinale *All.* | — | 5 |
| Antherium graminifolium *W.* | — | 10 |
| Antholyza aethiopica *L.* | — | 5 |

Eine brillante scharlachroth blühende Irideae.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Aristea cyanea *Ait.* | — | 8 |
| — pusilla *Ker.* | — | 8 |

Blüht sehr dankbar fast den ganzen Sommer im schönsten Smalteblau!

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Astelia Banksii *R. Br.* | — | 10 |
| †Arundinaria falcata *N. E.* | — | 7-15 |
| Banksia australis *R. Br.* | — | 20 |
| — palludosa *R. Br.* | — | 20 |
| Backhousia multiflora (Stachhousia?) | — | 15 |
| Baueria humilis *Swt.* | — | 5 |
| Beaufortia decussata *R. Br.* | — | 10 |
| Benthamia fragifera *Ldl.* | — | 5 |
| Beschorneria tubiflora *Knth.* (Fourcroya *Knth. & B.*) | — | — |
| Bignonia capensis *Hrt.* (Tecoma) | — | 5 |
| — jaminoides *Cunn.* | — | 8 |
| — pandorana *Andr.* r | — | 5 |
| Billardiera variifolia *D. C.* (Marianthus coelestis *Putterl.*) | — | 15 |
| — longiflora *Labill.* (Sollya heterophylla *Ldl.*) r | — | 5 |

An Drahtgittern gezogen gewähren sie durch ihr feines Laub und durch die grossen herrlichen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Boronia alata *Sm.* | — | 10 |
| — tetrandra *La Bill.* (microphylla) | — | 20 |

Blühen im Frühjahr sehr dankbar und verbreiten einen köstlichen Wohlgeruch.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Bossiaea ovata *G. Don.* | — | 10 |
| Fr. Boussingaultia baselloides *Kth.* | — | 5 |

Vorzüglich zum Beranken von Lauben.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Bouvardia angustifolia *H. B. K.* | — | 6 |
| — Brillant *Hort.* | — | 15 |
| — delicata *Henders.* | — | 15 |
| — hirtella *H. B. K.* | — | 6 |
| — Houtteana *Schldl.* | — | 10 |
| — hybrida Hogarth *Hend.* | — | 15 |
| — — Laura *Hend.* | — | 15 |
| — — Oriana *Hend.* | — | 15 |
| — — Rosalinda *Hend.* | — | 15 |

Diese neueren in England gezüchteten Hybriden empfehlen sich durch besonderen Blüthenreichthum und Farbenpracht. Ueberhaupt ist die ganze Gattung als Gruppenpflanze zu empfehlen. Im Frühjahr ins Freie verpflanzt, sind sie den ganzen Sommer über mit schönen, weissen, gelblichen, fleischfarbenen, und scharlachrothen, Blüthendolden geschmückt, und blühen oft im Winter noch im Warmhause.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Bouvardia Jacquini *H. B.* (Houstonia coccinea *Andr.*) | — | 5 |
| — leiantha *Benth.* | — | 5 |
| — longiflora *H. B. K.* | 20 | — |
| — splendens *Hook.* | — | 5 |
| — versicolor *Ker.* | — | 10 |
| Brachysema undulatum *Ker.* | — | 5 |
| Bravoa geminiflora *Clav. & Lexar* (Zetocapria *Lk. & Otto*) | — | — |
| Bursaria spinosa *Cav.* | — | 10 |
| Buddlea connata *R. & P.* | — | 8 |
| — mexicana | — | 8 |
| — Neemda *Hort.* (brasiliensis *Jacq. fil.*) | — | 8 |
| Bystropogon altissimum *Bolle* | — | 5 |
| — rugosum *Moritz* | — | 5 |
| Callicarpa lanceolaria *Rxb.* | — | 5 |
| — rosea | — | 10 |
| Calceolaria rugosa *R. & P.* Candidat *f* | | 5 |
| Callistemon lophanthus *Swt.* | — | 10 |
| — pinifolius *Swt.* | — | 10 |
| — rigidus *R. Br.* | | 7½ |
| — rugulosus *G. Don.* (Metrosideros aspera *Hffg.* M. glandulosa *Def.* M. macropunctata *Dum. Cours.*) | | 7½ |
| — viminalis. *G. Don.* | | 7½ |
| Calothamus quadrifida *RB.* | — | 8 |
| Canna vide Scitamineae | — | — |
| Campanula fragilis *Cyril.* (cochlearifol. *Vahl.* crassifol. *N. E.* Cav. *a. Len.*, diffusa *Vahl.*) | — | 10 |
| — Vidalii *Wats.* | — | 7½ |
| Cantua buxifolia *Lam.* (dependens *Hort.*) | — | 5 |

Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Carmichaelia australis *RB.* | — | 10 |
| Cassia bicapsularis *L.* | — | 10 |
| — species nova | — | 10 |
| — tomentosa *L.* (multiglandulosa *Jacq.*) | — | 15 |
| — Tora *L.* | — | 15 |
| Casuarina australis | 1 | — |
| — stricta *Ait.* | 1 | — |
| — tenuissima *Sbr.* | 1 | — |
| — torulosa *Ait.* | 1 | — |
| Ceanothus albiflorus *Hort. Belg.* | — | 15 |
| — azureus *Desf.* | — | 7 |
| — coeruleus *Lag.* (azureus *Desf.*) | — | 5 |
| — Delilianus *Spach.* 1 jähr. | — | 7½ |
| — dentatus *Bot. Mag.* | — | 10 |
| — divaricatus *Hort.* nec. *Nutt.* (thyrsiflorus *Eschw.*) | — | 10 |
| — Lobbianus *Hook.* | — | 15 |
| — papillosus *Torr & Grh.* | — | 5 |
| — rigidus *Bot Mag.* | — | 10 |
| — thyrsiflorus *Eschw.* (divaricatus *Hort.* nec *Nutt.*) | — | 10 |
| Cedronella mexicana *Benth.* (Dracocephalum) | — | 5 |
| Cerasus ilicifolia *Nutt.* | — | 15 |
| Cestrum aurantiacum *Lindl.* *f.* | — | 5 |
| — pendulinum *Jacq.* *f.* | — | 5 |
| — salignum *Hort.* *f.* | — | 5 |

Blühen im Herbst und Winter sehr dankbar.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Chironia floribunda *Paxt* *f.* | — | 5 |
| — grandiflora. | — | 10 |

Thlr. Ngr.

Cheiranthus mutabilis *L'Herb.* — 10

Hübsche reichblühende Pflanze, erst gelb, dann bläulichrosenroth ändernd.

Chorizema Chandleri 1 jährig — 20
— ilicifolium *LaBill.* . — 10
— ericoides *Hort.* (ericaefolia *Hort.*) . . . — 10
— rhombeum *RBr.* . . . — 7½
— varium *Benth.* (elegans *Hrt.* rotundifolium *Hrt.*) — 10

Cineraria platanifolia *Schott.* (Petasites *Sims.*) . . — 5
— Webbii *Low.* . . — 5

Cinnamomum Reinwardtii *H. Belg.* 1 —

Chrysocephalum arenarium *F. Müll.* . . . . — 8

Cissus antartica *Vent.* . — 10

Als Rankpflanze für's Zimmer sehr empfohlen.

Cistus lucidus *Hort.* (Helianthemum *Hornem.*) . . — 7
— creticus *L.* . . . . — 7½
— populifolius *L.* . . — 7
— salviaefolius *L.* . . . — 7½
— vaginatus *Ait.* . . — 7

Citrus Aurantium *L.* . . — 10
— sinensis . . . . ⅓ 1 —
— — myrtifolia . . — 10
— — salicifolia . . — 12

Citharexylum cyanocarpum *Hook.* 10

Clianthus magnificus *Cunn.* . — 10
— puniceus *Soland.* . . — 5

Magnificus übertrifft an Grösse und Farbenpracht unseren alten Liebling, den puniceus.

Clematis appendiculata . — 20
— indivisa lobata *Hook.* . — 15
— smilacifolia *Wall.* . . — 10
— sp. e Bahia . . . . — 20
— trifoliata *Thbg.* . . — 10

Coelestina ageratoides *H. B. K.* (Ageratum coelestinum *Bot. Mag.*) . — 7½

Coleonema alba *Bartl. & Wendl.* (Diosma *Thbg.*) . . . . — 5

Convolvulus Cneorum *L.* . — 5

Coronilla glauca *L.* (odorata *Hort.*) . . . . . — 5

Correa alba *Andr.* . . — 5
— Grevilli *Hort.* . . . — 10
— rufa *Gärt. fil.* . . . — 10

Crassula Beauté de Charante — 5
— Bonnaparte . . . . — 5
— coccinea *L.* . . . — 5
— dentata . . . . . — 5
— hybrida Charonne . . — 5
— — nitida odorata . — 5
— — Phoebus . . — 5
— — praecox . . . — 5
— lanceolata . . . . — 5
— Rival . . . . — 7½
— tetragona *L.* . . . — 10

Zu alt und bekannt mit ihren feurigen lange ausstehenden Blumenbüschen um einer Anpreisung zu bedürfen.

Crataegus glabra *Bot. Mag.* (Mespilus *Lk.* Photinia serrulata *L.*) . . — 5

k Cyclamen africanum *Hort.* (macrophyllum *Hort.*) . — 12
— intermedium *Wendl.* . — 12

Cyclamen Atkinsonii . 2 —
k — coum *Mill.* . . . — 10
k — europaeum *L.* (aestivum *Rchb.* hungaricum *Hort.* litorale *Sadl.* officinale *Wender*, Clusii *W. Lehm.*) — 5
— europaeum *L.* fl. albo — 20
— persicum *Mill.* . . — 12
— — album *Mill.* . . — 20
— — A odoratum. . . — 20
— — B punctatum . . — 20
k — hederaefolium *Ait.* europaeum *Mill.-Lem.* autumnale *Bovs.* neapolitan. *Tenor. H.Neap.* graecum *Lk.* ficariaefolium *Rchb.*) — 10
*Fr.*— repandum *Sieb. Sm.* . — 15
— vernum *Mill.* . . — 15

Unermüdliches Blühen köstlicher Duft haben ihnen längst einen wohlverdienten Platz als Zimmerpflanze geschaffen.

Crotalaria retusa *L.* . . — 10

Cuphea eminens *Planch. & Lind.* 7½

Richtig cultivirt, eine der schönsten.
— platycentra *Hort.* non *Benth.* (ignea *D. C.*) . *f* — 5-10
— pubiflora *Benth.* (strigulosa *Hort. Belg.*) . . — 5
— strigulosa *H. & K.* . — 5

Cunonia capensis *L.* . . — 15

Cynara horrida *Ait.* . . — 5

Cytisus albidus *D. C.* . . — 5
— Attleyanus *Hort.* (Telline *C. Koch.*) . . . . — 10
— canariensis *H.* (Genista) — 7½
— candicans *Lam.* . . — 15
— chrysobotrys *Fisch.* . — 10
— filipes *Hort.* (Spartocytisus *Hook. & Benth.* veredelt . . . . . — 10
— — wurzelächt . . — 15
— nubigenus *Lk.* . . — 12
— racemosus *Marnock.* . — 10

Unzählige goldene Trauben bedecken sie im zeitigen Frühjahr; daher in jedem Garten willkommen.

Daphne Acklandia *Hort.* . — 20
— collina *Sm.* . . . — 20
— Dauphini *Hort.* . . — 5-15
— Delahayana *Hort.* . — 20
— Fioni *Hort.* . . . — 10
— indica *Hort.* alba . — 15
— odorata *Thbg.* . . — 8
— — fol. var. . . . — 10

Schon der köstliche Duft der Blumen leichteste Cultur und zeitiges Blühen genügen zur Empfehlung aller Daphnen.

Datura arborea *Hort.* . . *f* ⅓-3 —
— cornigera *Hook.* B. flore-pleno (Brugmansia Knightii fl. pl. *Hort.*) . . — 15

Kaum weiss ich die Frage zu beantworten, warum diese köstlichen Pflanzen so wenig zu treffen sind, denn wo sie blühen, und sie thun dies am besten im freien Lande, mit jedem Boden vorlieb nehmend — da können sie unmöglich ungesehen bleiben, ständen sie auch im äussersten Winkel, denn ihre langen, grossen, blendend weissen Blumen, leuch-

Thlr. Ngr.

ten unendlich weit! Dabei sind sie so hart, dass selbst, während der Blüthe ausgehoben, sie noch lange fortfahren, das Haus zu zieren, und zugleich so bescheiden, dass sie nach dem Blühen mit jedem nur irgend trockenen, frostfreien Plätzchen vorlieb nehmen.

Digitalis canariensis *L.* (Isoplexis *Ldl.*) . . . . — 10
— sceptrum *L.* (Isoplex. *Ldl.*) — 20
Dillenia scandens *W.* . . . — 5-10
Diosma ciliata *Berg.* . . — 5
— rubra *L.* . . . . — 5
Diplacus glutinosus *Nutt.* var. grandiflorus . . . . — 5
Blüht schon als junger Steckling eben so schön als andauernd.
— puniceus *Nutt.* . . . — 5
Dolichos lignosus *L.* . . . — $7^1/_2$
Doronicum cruentum *Bolle.* — 5
Dracaena nutans *Hort.* . 1 —
Dryandra nivea *R. Br.* . 2 —
Echeveria bracteolata *Lk. Kl. O.* — 5
— caespitosa *D. C.* . — 8
— campanulata *Kze.* . — 8
— coccinea *D. C.* . . . — 5
— grandifolia *Haw.* . . — 5
— pumila *V. Htte.* (secunda *Ldl.*) . . . . . . — 5
— retusa *Ldl.* (fulgens *V. H.*) — 10-15
— rosea *Ldl.* . . . . . — 5
Besonders jung sehr gesucht als Nipptischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich passen.

Echium Decaisnei *Bolle.* . — 5
— fastuosum *Jcq.* (candicans *D. C.*) . . . . . — $7^1/_2$
— lineatum *Jacq.* . . . — 6
— Plinianum *Bolle.* . . . — 6
Edwardsia grandiflora *Salisb.* — 10
Edgeworthia chrysantha *Ldl.* (Daphne papyrifera *Sieb*). 1 —
Epacris grandiflora *Sm.* (longiflora *Cav.*) . . . . — 15
— intermedia *Hort.* . . . — 15
— paludosa *R. Br.* . . . — 10
Erica gracilis *Wendl.* var. autumnalis . . . . — 5
— mediterranea *L.* . . . — 5
Eriobotrya japonica *Lindl.* . — 20
Eriostemum amoenum . . . — 20
— buxifolius *Sm. B.* var. intermedium . . . — 15
Erodium hymenodes *L'Hr.* (Geranium trifoliatum *Cav.*) — 8
Erythrina crista galli *L.* . . — 10
Escallonia alba . . . . — 15
— macrantha *Hook. & Arn.* . . . . . . — 7
— macrostachya *Hort.* . — 20
— Montevidensis *D. C.* (bifida *Lk. & Otto*, Aenopetala et floribunda *Hrt.*) 1 —
— pterocladon *Hook.* . — 7
— rubra *Pers.* . . . — 5
Blühen schon sehr jung mit schönen rothen Dolden.

Eucalyptus robusta *Sm.* . — 15
— cordata *La Bill.* . . — 20

Thlr. Ngr.

Eugenia australis *Wendl.* . $^1/_3$-1 —
— Ugni *Hook. Arn.* . — 10
— Luma Berg. (Myrtus apiculata *Hort.*) . . . . . — 20
Ist als eine der vorzüglichsten Kalthauspflanzen sehr gerühmt und erzeugt sehr feinschmeckende, an das Arom der Ananas und Erdbeeren erinnernde Früchte.

Eupatorium omphaliaefolium *Kunth*, et *Bouché* . . . . — 15
— cannabinum *L.* (spec. Mirador) . . — 5
— glaucum *Hort.* (glabellum *O. & D.*) . . — 5
— grandifolium *Regel.* . — 5
— odoratissimum *Regel.* . — 5
— rugosum *Schrad.* (Schraderia *D. C.*) . . . . — 5
— sinese . . . . — 5
— sp. Mexico . . . . — 10
Blühen sehr dankbar im Winter!

Fabiana imbricata *R. P.* . — 5
Fagonia cretica *L.* . . 1 —
Ficus Lichtensteinii *Lk.* . — 10
Sehr zu empfehlende Kalthauspflanze!

Frankenia laevis *L.* Ampelpflanze . . . . . — 5
Garrya Mac Fadyana *Hort?* — 5
Gazania rigens *R. Br.* . — 5
Genista ephedroides *L.* . — 10
— fragrans *R. Br.* (Cytisus) . . . . — 8
— linifolia *L.* (Spartium *Desf.*) . . . . . — 8
— monosperma *Sm.* (Retama.) — —
— Rhodopna *Hort.* (Rodaphne) — $8^1/_2$
— Scorpius *L.* . . . . . 10
— spartioides *Boll.* . . — 15
Geitonoplesium cymosum *R. B.* s. angustifol. . . — 12
Geranium anemonifolium *L'Her.* (palmatum *Cav.*) — 5
Gladiolus Cardinalis *Curt.* . — 2
— gandavensis *H. Belg.* . — 3
— psittacinus *Ldl.* (natalensis *Reinw.*) . . — 2
— ramosus aurantiaca . — 7
— — Beautè-rouge . . — 5
— — Emilius . . . — 4
— — magnificus . . . — 5
— — Queen Victoria . — 5
— — rose triumphant . — 10
Goodia lotifolia *Salisb.* . — 5
Gomphocarpus fruticosus *R. B.* (Asclepias) wohlriechend. . . — 10
Gnidia oppositifolia *L.* . — 7
Gonocalyx pulcher. *Planch. & Lind.* — 20
Greenovia rupifraga *L'Her.* — 5
Für Miniaturtöpfe.
Grevillea Bauerii *R. Br.* . — 10
— robusta *Cunn.* . . — —
— rosmarinifolia *Cunn.* . — 5-10
— Thelemanniana *Hügel* (absinthifolia *Hrt. Blg.*) — 10
Habrothamnus corymbosus *Endl.* — 5
— elegans *Ait. Brogn.* . — 5
— fasciculatus *Endl.* (Cestrum roseum *H. B. K.*) . — 5

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Habrothamnus Hügelii *Hort.* | — | 5 |
| — Oselii . . . . | — | 10 |
| — scaber *Hort.* (hybr.) . | — | 5 |
| — Zephyrinae *Hort.* (hybr.) | — | 5 |

Zum Auspflanzen ist nichts empfehlenswerther als Habrothamnus. Vorzüglich H. scabra und Zephyrinae.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hakea salisburioides . . | — | 20 |
| Halleria lucida *L.* . . . | — | 20 |
| Hardenbergia macrophylla *Bnth.* (Kennedya *Lndl.*) . . | — | 10 |
| Heimia myrtifolia *Cham. Schldl.* | — | 5-10 |
| Helianthemum Tuberaria *Mill.* | — | $7^1/_2$ |

Zeigt das Vorkommen v. Trüffeln an.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Helichrysum felinum *Less.* . . | — | 10 |
| — orientale *T. L.* . . . | — | — |
| — stoechalinum *Hort.* (Stoechas *D. C.*) . . . . | — | 5 |
| Hibbertia dentata *R. B.* . | — | 7 |
| F.Humea elegans *J. Sm.* . | — | 5 |

Herrliche Pflanzen mit hängenden Blüthentrauben, rothglänzend.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hypericum floribundum *Ait.* | — | 5 |
| — oblongifolium *Choisy.* . | — | 5 |
| — platysepalum *Walt.* (Webbia *Spach.*) . . . . | — | 5 |
| — Webbii *Steud.* (Androsaemum Triadenia *Spach.*) | — | 5 |
| Indigofera decora *Lindl.* . | — | 10 |
| — Dosua *Hamilt.* . . | — | 10 |
| — macrostachya *Vent.* . | — | 20 |
| — Roylei . . . . . . | — | 10 |
| — speciosa *Hort.* . . . | — | 10 |
| Jasminum elegans . . . | — | 20 |
| — floribundum . . . . | — | 10 |
| — grandiflorum *L.* . . . | — | 10 |
| — heterophyllum *Wall.* (Jacksonia lucida *H. Ten.*) . | — | 5 |
| — odoratissimum *L.* . | — | 5 |
| — simplex . . . . | — | 7 |
| — triumphans *Hort.* . . . | — | 5 |
| Ilex aestivalis *Lam.* (Prinos deciduus *D. C.*) . . . . | 1 | — |
| — Aquifolium siehe Freilandpflanzen. | | |
| — balearica*Dsf.*(maderensis *W.*) | — | 12 |
| — — fol. varg. *Hort* . | — | 20 |
| — — tricolor . . . | — | 20 |
| — brexifolia *Hort.* . . . | — | 15 |
| — Cassine *L. Ait.* (caroliniana *Mill.* cassinoides *Lk.* laurifolia *Hort*) . . . . | — | 12 |
| — — var. carolinianum . | — | 15 |
| — castaneaefolia *Hort. v. Htte.* | — | 15 |
| — crassifolia *Hook.* . . . | — | 20 |
| — cornuta *Lindl.* . . . | — | 20 |
| — Cunninghami *Hort.* . | 1 | — |
| — Dahoon *Walt.* . . . | — | 15 |
| — Denhami *Hort.* (Nemopanthes Andersoni? *H. Cels.*) | — | 15 |
| — dipyrena *Wall.* (Cunninghami *Hort.*) . . . . | — | 15 |
| — elliptica *D. Don.* (Doniana *D. C.* nepalensis *D. Dietr.*) | — | 15 |
| — excelsa *Hort.* . . . . | — | 15 |
| — furcata *Lindl.* . . . . | — | 20 |
| — latispina *Hort.* . . . | — | 25 |
| — ligustrina *Hort.* . . . | — | 15 |
| — lucida *Hort.* . . . . | 1 | — |
| — lyrata *Hort.* . . . . | — | 12 |
| Ilex maderensis *Lam.* (crassifolia *Meerb.* Perado *Auct.*) . | — | 25 |
| — magellonica *Loud.* . | — | 15 |
| — microcarpa *Lindl.* . . . | — | 20 |
| — nepalensis *Hort.* . . | — | 15 |
| — opaca*Ait.* (quercifolia*Meerb.*) | — | 20 |
| — Perado *Ait.* (platyphylla *Web. & Bertholet*) . . . | — | 15 |
| — phyllyraeifolia *Hort.* . | — | 24 |
| — prinoides *Hort.* . . . | — | 12 |
| — vomitoria *Ait.* . . . | — | 15 |

Von Ilex aquifolium, aqu. argenteo u. aureo variegata, ciliata, undulata, besize grosse buschige Prachtpflanzen von 3-4 Fuss Höhe, die ich mit 2-3 Thlr. pro Stück berechne. Mit ihrem dunklen Grün und grosser Dauer, so dass sie bei milderem als unserem Gebirgsclima im Freien aushalten, ist ihnen eine grosse Rolle als Decorationspflanzen aufgespart.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Iris foetidissima *L.* fol. var. | — | 15 |
| — Susiana *L.* . . . . | — | 5 |

Eine der prachtvollsten, weiss u. fast schwarz punctirt, grossblumig und wegen ihrer eigenthümlichen Färbung als Grabschmuck sehr geeignet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Ixia diverse species, gemischt | — | 4 |
| Jendarus Athadoa . . . | — | — |
| Jovellana punctata *R. B.* (Calceolaria violacea *Cav.*) | — | 5-10 |
| Kennedya arenaria *Benth.* . | — | 10 |
| — monophylla *Vent.* . r | — | 5 |
| — purpurea *Hort.* (ovata *Ker.*) | — | 10 |
| — rubicunda *Vent.* (Glycine *Curt.*) . . . . . r | — | 10 |
| Laurus glauca *Thbg.* . . . | — | 20 |
| Lechenaultia formosa *R.Br.* stark | — | 10 |
| Leptodactylon californicum *Hook. & Arn.* . . . . | — | 10 |
| Leptospermum acerosum *H.Ber.* | — | 5 |
| — attenuatum *Sm.* . . . | — | 5 |
| — lanigerum *Ait.* . . . | — | 5 |
| — multiflorum *Cav.* . . . | — | 5 |
| — persiflorum *Rchb.* (grandiflor. *Lodd.* purpurascens *H. Berol.*) . . . . . | — | 10 |
| — scoparium *Forst.* . . . | — | 5 |
| — stellatum *Cav.* . . . | — | $7^1/_2$ |
| Leucophaë candicans *Wbbi.* | — | 10 |
| — dasygeaphalon *Webbi.* | — | 10 |
| Leucophyta Brownii *Cass.* . | — | 10 |
| Ligustrum laurifolium . | — | 10 |
| — spicatum *Don.* (nepalense *Wall.*) . | — | 10 |
| Limonia australis *Cungh.* (Citrus) | — | 10 |
| Linum monogynum *Frt.* . | — | 10 |

Grossblüthig, blüht im Winter.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — suffruticosum *L.* . | — | 10 |
| Lomatia ilicifolia *R.Br.* . | 1 | — |
| Lonicera chinensis *Watson.* var. purpurea . . | — | 5 |
| Lopezia longiflora *Hort.* . | — | 5 |
| — miniata *D. C.* . . . | — | 5 |

Vorzüglich für den Winterflor.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Lophospermum erubescens *D.Don.* B. atropurpureum | — | 10 |
| — scandens *D. Don.* . | — | 10 |
| Magnolia fuscata *Andr.* . | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Magnolia grandiflora *L.* | — | 5 |
| Mahonia Ehrenbergi *J. Mak,* | 2 | — |
| — pallida *Benth.* | — | — |

M. Ehrenbergi und pallida sind zwei sehr empfehlenswerthe Neuheiten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — anemonifolia | 3 | — |
| — Fortunei *H. Angl.* *f.* | 1 | — |
| — Lechenaultii | 3 | — |
| — trifoliata *Cham.* (ilicifolia *Schlechdt.* Berberis trifolia *Schult.*) | — | 15 |
| — tenuifolia *Lindl.* | — | 15 |
| Mahernia pinnata *L.* (bipinnata *D. C.*) | — | 5 |
| Manglesia cuneata *Ldl.* (glabrata *Lindl.* Grevillea Manglesii *Hrt.* Anadenia Manglesii *Grah.*) | — | 8 |
| Marica coelestis *Lehm.* (Cipura *Lehm.*) | — | 10 |
| Melaleuca armillaris *Sm.* (alba *Hrt.*) | — | 5 |
| — agathosmaefolia *Hort.* | — | 8 |
| — decussata *R. Br.* | — | 5 |
| — Huegelii *Endl.* | — | 5 |
| — hypericifolia *Sm.* | — | 6 |
| — ovalifolia *Hort.* (Leptospermum *Swt.*) | — | 5 |
| — pulchella *R. Br.* | — | 5 |
| — viminea *Lab.* | — | 5 |

Sie liefern unser bestes Bouquetgrün nur müssen sie den Sommer dazu ausgepflanzt werden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Melia Azedarach *L.* | — | 5-10 |
| Melianthus major *L.* | — | 20 |
| Menispermum laurifolium *Roxb.* (Cocculus) | — | 5 |
| Mesembrianthemum acinaciforme *L.* | | 7½ |
| — deltoides *Law.* | — | 7½ |
| crassifolium *L.* | — | 5 |
| — tigrinum *Haw.* | — | 5 |
| Metrosideros lanceolata *Sm.* | — | 5-20 |
| — florida (Myrtus robusta) | — | 8 |
| — linarifolia *Sms.* (rigidifolia *Hffg.*) | | 8 |
| — semperflorens *Lodd.* | ⅕ | 4 |
| — *Lodd.* var. multiflorum | — | 10 |
| Mimosa prostrata *Hort.* (marginata *Lindl.*) | — | 10 |
| Mikania scandens *W.* | — | 7½ |
| Mitraria coccinea *Cav.* | — | 5 |

Fast aus jedem Blattwinkel hängen die kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass sie eben so reich als imposant blüht.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Mühlenbeckia complexa *Meissen. r.* | — | 5 |
| Muraltia Heisteri *D. C.* | — | 10 |
| Myrtus bullata *Salisb.* | — | 10-20 |

Schon das sonderbar braune Colorit der Blätter, mehr aber noch die eigenthümliche Form derselben machen sie zu einer der orginellsten Pflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — communis *L.* | — | 5 |
| — — flore pleno | — | 5 |
| — gracilis *Hort.* (Baeckea) | — | 10 |
| Myrica-Faya *Ait.* | — | 10 |
| — Galé *Lin.* | — | 15 |
| — quercifolia | — | 15 |
| Myrsine africana *L.* | — | 5 |
| — retusa *Ait.* | — | 10 |
| Nandina domestica *Thbg.* | — | 20 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Nerium Oleander *L.* var. atropurpureum | — | 10 |
| — — cupreum | — | 10 |
| — — Fondeolumeanum | — | 10 |
| — — grandifl. pl. | — | 10 |
| — — purpureum carneum | — | 10 |
| — — roseum pl. | — | 10 |
| — — Richardii | — | — |
| — — rubrum fl. pl. | — | 10 |
| — — splendens giganteum | — | 10 |
| Nicotiana glauca *Grah.* | — | 5 |
| Ophiopogon spicatus *Ker.* | — | 6 |
| Origanum Dictamnus *L.* | — | 10 |
| — sypileum *L.* (hybridum *Mill.*) | — | 10 |

Als dankbar und nett blühend zu empfehlen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Oxalis Bowiei *Ait.* | — | 5 |

Sehr grossblumig.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — versicolor *L.* | — | 5 |

Die zierlichste des ganz. Geschlechtes.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Passerina filiformis *L.* | — | 5 |
| Pentstemon cordifolium *Benth.* | — | 15 |
| Pernettya floribunda (Arbutus ?) | — | 15 |
| Perymenium discolor *Schrad.* | — | 10 |

Blüht im Winter.

Petunia vide Sortimentspflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Phygelius capensis *E. Mey.* | | 5 |

Aehnelt sehr den Pentstemon, erfreut aber viel länger als diese mit seinen scharlachnen Blumen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Phillyraea angustifolia *L.* | — | 5 |
| Phlomis ferruginea *Ten.* | — | 5 |
| Phylica ericoides *L.* | — | 5 |
| Phormium tenax *L.* | 1 | — |

Bekannt als neuseeländischer Hanf; und nicht genug zu empfehlen, im Sommer auf Gruppen als Einzelnpflanze macht sie mit ihren langen schwertförmigen Blättern und ihrem gigantischen Wuchse einen sehr guten Effect.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Pimelea decussata *R. Br.* | — | 15 |
| Pittosporum cornifolium *Cunn.* | — | 15 |
| — Mayi *H. Belg.* | — | 15 |
| — Tobira *Ait.* | ½-2 | |
| Platanus californicus | 1 | — |
| Poinciana pulcherrima *L.* (Caesalpinia *W.*) sehr schöne Pfl. | — | 15 |
| Polygala Dalmaisiana *Hort. Belg.* | — | 15 |
| — grandis *Hort.* (grandifl ? *Lodd.*) | — | 15 |
| — myrtifolia *Linn.* | — | 10 |
| Prostanthera grandiflora *H. Belg.* | — | 5 |
| — rotundifolia *R. Br.* | — | 5 |
| Psoralea bituminosa *L.* | — | 5 |
| — strobilacea *Bolle.* | — | 15 |
| Pultenaea Brownii *Benth.* | — | 10 |
| — subumbellata *Hook.* | — | 5 |
| — stricta *Sims.* | — | 10 |
| — tenuifolia *R. B.* | — | 10 |
| Punica Granatum *L.* | | 10 |
| — — flava | — | 5 |
| — — *L.* fl. albo pl. | — | 10 |
| — — Legrelliae *H. Versch.* | 2 | — |

Befindet sich in vielen Werken abgebildet, und verdient danach alle Beachtung.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — — lutea pl. | — | 25 |
| — nana *L.* | — | 10 |
| Quercus Ballota | — | 10 |
| — glabra *Thbg.* | — | 15 |

Thlr. Ngr.

Quercus sp. e. mont. Atlanticis — 15
— — nova fol. argent. . — 15
Restio tectorum *Thbg.* . . — 20
Eine der sonderbarsten Pflanzen.

Retama rhodorrhizoides *Bolle.* — 10
Rhamnus crenulata *Ait.* . — 8
Rhaphiolepis japonica *Lieb. & Zuccar.* . . . . . — 20
Rhodocistus Bertoletianus *Bolle.* — 8
Rhodoleia Championi *Hook.* 1 —
Royena lucida *L.* . . — 10
Ruscus androgynus *L.* . r — —
Sempervivum Donkelarii . — —
Senecio Giesbreghtii . . — 10
Schöne Blattpflanze.

— Farfugium *C. Koch.* (Farfugium grande *Lindl.*) 1/2-1 —
Eine der effectvollsten buntblättrigen Decorationspflanzen der Neuzeit.

Serissa foetida *Commers.* . — 5
Wer Noth um blühende Myrte hat, der cultivire diese niedliche Serissa, und sie wird ihm oft mit ihren weissen, dicht gefüllten Blumen aus der Verlegenheit helfen.

Scrophularia calliantha *Bolle.* — 6
Sibthorpia europaea *L.* . — 5
Eine wahre Nipptisch-Ampelpflanze.

Siphocampylus bicolor *G. Don.* — 5
— canus *H. Belg.* (Tuba crassicaulis *Hk.*) . . . — 5
Skimmia japonica *Thbg.* . 1 —
Sollya heterophylla *Lindl.* . — 8
— Drumondi *Hort.* . . — 15
Beliebt durch ihre schönen dunkelblauen Beeren.

Soulangea thymifolia *Brngt.* — 10
Spartocytisus congestus *Bolle.* (Spartium) . . . — 15
Spiraea Blumei *G. Don.* . — 8
Stachys coccinea *Jcq.* . — 5
— purpurea . . . . — 5
Statice arborea *Brous.* . 1 —
— brassicaefolia *Webb.* . 1-2 —
— Fortunei *H. Angl.* gelbblühend 15
— frutescens *Lm.* (arborea *W.*) 1 —
— fruticosa *Webb.* . . — 15
— Halfords *Hort. Angl.* . — —
— imbricata *Webb.* . . — 20
— macrophylla *W.* (platyphylla) 1 —
— macroptera *Webb.* . 1 —
— Reinwardtii *H. Belg.* . — 5
— rosea *Sm.* . . . — 10
— spathulata *Desf.* . . — 10
— suffruticosa *L.* . . — 10
Die drei ersten St. sind prachtvolle Erscheinungen. Die feine leichte Tracht und Massen von kleinen Blüthen haben ihnen gerechtes Ansehen verschafft. Um so mehr sollten sie jetzt cultivirt werden, da sich die Blüthen sehr leicht trocknen lassen und zu den so in Aufnahme gekommenen unverwelklichen Bouquets ein gewiss schätzbares Material liefern.

Salicornia fruticosa *L.* . . — 5
Stauntonia latifolia *Wall.* (Holboelli *Dckn.*) . . . r — 10

Thlr. Ngr.

Stylidium adnatum *R. B.* . — 8
— suffruticosum . . — 5
Styphelia viridiflora *R. B.* (viridis *Andr.*) . . . 1 —
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* — 10
— galegifolia *R. B.* . . — 10
— Grayana *Lindl.* . . — 10
— Osborni . . . . — 10
— purpurea grandiflora . — 10
Tamus edulis *Bolle.* . . 1 —
Tagetes signata *Bartl.* . — 5
Tecoma grandiflora *Swt. D. C.* (Bign. *Thbg.* B. chinensis *Lam.* Campsis adrepens *Lour.* Incarvillea *Spgl.* non *Hort.*) — 10
— Latrobea . . . — 25
Tetratheca ericifolia *Sw.* B. hirsuta . . . . . . — 25
Teucrium multiflorum *L.* . — 5
Thibaudia vaccinifolia *Hort.* — 12
Todaroa aurea *Bolle.* . . — 5
Tremandra verticillata *Hort. Belg.* — 8
Tritomantha media *Lk.* . — 10
— pumila *Lk.* . . . — 5
— Uvaria *Lk.* . . . — 10
Tropaeolum Carolina . . — 5
— Chaixianum . . . — 5
— Fintelmannii . . — 5
— Hookii . . . . — 5
— Lobbianum *H. Veitch.* r — 5
— Lobbii tricolor . . — 5
— Maziliense . . . — 5
k — pentaphyllum *Lam.* . — 10
— Scheuerianum . . — 3
— — coccineum . . — 3
— W. Neubert . . — 5
— Zipserii multiflorum . — 5
Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre Eigenheiten belauscht, wird reichen Lohn finden im feinsten Laub und dem zierlichsten Blumenflor; nur gönne man der knolligen Art, ihre Ruhe.

Tweedia coerulea *D. Don.* — 5
Veronica amabilis (*hybr.*) . f — 6
— Andersonii fl. albo . — 5
— Bedfordia . . . — 5
— decussata var. Devoniana — 6
Ganz neue in England gezüchtete Hybride von seltener Schönheit.

— elegans (*hybr.*) . . f — 5
— flore variegato *L.* . — 5
— florib. var. . . . — 5
— formosa *R. Br.* . . f — 5
— Fortunei (*hybr.*) . — 5
— Hendersoni . . . — 5
— kermesina . . . — 5
— lilacina compacta (*hybr.*) f — 5
— — superba (*hybr.*) . f — 5
— Liabaudii . . . — 5
— magnifica . . . — 10
— Mildensis . . . — 5
— multiflora . . . — 5
— salicifolia *Forst.* (Lindleyana *Hort.*) . . . . f — 5
— Salterii (*hybr.*) . . f — 5
— speciosa *Cunningh.* . — 5
— — rubra . . . — 5
— splendida (*hybr.*) . . — 5
— superba „ . . f — 5
— Thibauti „ . . — 5

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Veronica Verschaffelti *(hybr.)* *f* | — | 5 |
| — violacea purpurea „ *f* | — | 5 |

Dankbare Gattung fürs freie Land. Vorzüglich dankbar blühen die neuen Hybriden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Viburnum Awabuki *Sieb.* | — | 10 |
| — chinense *Zeyh.* (odoratissimum *Ker.* Coffea monosperma *Hook.*) | — | 20 |
| — cylindricum *Hamilt.* | — | 12 |
| — dilatatum | — | 10 |
| — japonicum *Spr.* | — | 10 |
| — macrocephalum *Forst.* | — | 15 |

Die Grösse der Dolden übertrifft alles Dagewesene in dieser Gattung.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — multratum *Hort.* | — | 10 |
| — plicatum *Thbg.* | — | 15 |
| — rugosum *P.* (rigidum *Vent.*) | — | 10 |
| Viburnum suspensum *H. Angl.* | — | 25 |
| — Tinus *R.* | 1/6-4 | — |
| — — foliis variegatis | — | 8 |
| Westringia latifolia grandiflora | — | 15 |
| Witsenia corymbosa *Sm.* | — | 20 |
| Xanthosia rotundifolia *D. C.* | — | 5 |
| Xerothes longifolia *R. B.* decorativ | 1 | — |
| Yucca aloifolia *L.* 1 jährig | — | 15 |
| — angustifolia *Pursh.* | 2 | — |
| — draconis *L.* fol. var. | 3-6 | — |
| — flaccida *Haw.* | 2 | — |
| — gloriosa *L.* | 1 | — |
| — recurva *Salisb.* | 1-5 | — |
| — stenophylla *Steud.* (angustifolia *Karw.* non *Pursh.*) | 2 | — |
| Zieria lanceolata *R. Br.* | — | 8 |
| — macrophylla *Bonpl.* | — | 8 |
| Zichya coccinea *Benth.* | — | — |

# Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste. Jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten ausrangirt, so dass, wie bei den Tropen, auch der Freund der Caphauspflanzen eine reiche Auswahl des Besten findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

## I. Azalea.

Die Preise beziehen sich auf buschige Pflanzen.

### Varietäten von A. indica L.

#### I. Aeltere.

| | Ngr. |
|---|---|
| 1 Adolphi fl. pleno *v. Houtte.* | 8 |
| 2 alba | 8 |
| 3 — flore pleno | 10 |
| 4 — insignis *Rinz.* | 8 |
| 5 — magna *de Fraser.* | 8 |
| 6 — striata *Liebig.* | 8 |
| 7 — triflora *Knight.* | 8 |
| 8 Alexander *Verschaffelt.* | 8 |
| 6 amaranthina *Makoy.* | 8 |
| 10 amoena *Liebig.* | 8 |
| 11 Anais | 8 |
| 12 Ariadne *Liebig.* | 8 |
| 13 augustissima *Knight.* | 8 |
| 14 aurantiaca elegans | 8 |
| 15 — superba | 8 |
| 16 Aurora *Knight.* | 8 |
| 17 barbata *Knight.* | 8 |
| 18 Baron von Hügel *Liebig.* | 8 |
| 13 Beali | 8 |
| 19 Bautè d'Europe *Demarcq.* | 8 |
| 20 blanda *Knight.* | 8 |
| 21 Calypso *Knight.* | 8 |
| 22 carnea floribunda grandiflora | 5 |
| 23 carnosa *Knight.* | 8 |
| 24 cenerentola *Knight.* | 8 |
| 26 coccinea elegans | 5 |
| 27 — grandiflora | 5 |
| 28 color di lacca *Knight.* | 10 |
| 29 Comte de Flandre | 8 |
| 30 Crimson | 8 |
| 31 cuprea splendens *Rinz.* | 8 |
| 32 — superba | 8 |
| 33 Danielsiana | 5 |
| 34 — superba *Rinz.* | 8 |
| 35 Dawsonii *Knight.* | 8 |
| 36 decora *Knight* | 8 |
| 37 delicata *Ivery.* | 8 |
| 38 — *Van Houtte.* | 8 |
| 39 Diana *Knight* | 8 |
| 40 Duc de Brabant *V. Houtte* | 8 |
| 41 elata | 8 |
| 42 — plena | 8 |
| 43 electa *Liebig.* | 8 |
| 44 elegans | 8 |
| 150 Eulalia *van Geert.* | 8 |
| 45 expansa *Smith.* | 8 |
| 46 exquisita *Knight.* | 8 |
| 47 flammea *Liebig.* | 8 |
| 48 Flora *Knight* | 8 |
| 49 formosa *Ivery.* | 8 |
| 50 — *Liebig.* | 8 |
| 51 formosissima | 8 |
| 52 Frazeri | 5 |
| 53 Friedrich August *Liebig.* | 8 |
| 54 fulgens *Knight.* | 5 |
| 55 Gabriele *Liebig.* | 8 |
| 56 Gledstanesii | 8 |
| 57 Glory of Sunninghill | 8 |
| 18 grandidissima | 5 |

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 144 | Herzog Adolph v. Nassau *Mrdn.* | 10 |
| 145 | Hrzgn. Adelheid v. — *Mrdn.* | 10 |
| 146 | — Pauline V. — *Mrdn.* | 10 |
| 59 | Hibberti | 5 |
| 60 | Hookeri superba | 5 |
| 61 | Illustris nova *Versch.* extra | 8 |
| 62 | Isabella *Liebig.* | 8 |
| 63 | Königin Marie *Liebig.* | 8 |
| 64 | lactea floribunda *Liebig* | 8 |
| 65 | lateritia | 8 |
| 66 | ledifolia fimbriata | 8 |
| 67 | liliiflora | 5 |
| 68 | Louis Napolèon | 8 |
| 69 | macrantha purpurea | 8 |
| 70 | magnifica *Knight.* | 8 |
| 71 | magniflora *Knight* | 8 |
| 72 | Mars | 8 |
| 73 | Melbournei *Knight.* | 8 |
| 74 | Mignonne *Liebig.* | 8 |
| 75 | Millneri | 5 |
| 76 | mirabilis *Knight.* | 8 |
| 77 | munda | 5 |
| 78 | mundula *Knight.* | 8 |

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 79 | neriiflora rubra | 5 |
| 80 | nivea flore pleno *Mardner.* | 8 |
| 81 | notabilis *Liebig.* | 8 |
| 82 | ornata *Liebig.* | 8 |
| 83 | picta | 8 |
| 84 | Prima Donna *Knight.* | 8 |
| 85 | Prince Albert *Knight.* | 8 |
| 86 | — Camille de Rohan *V. Houtte.* | 8 |
| 87 | — de Joinville *V. Houtte.* | 8 |
| 88 | — Leopold *V. Houtte.* | 8 |
| 89 | Prinz Rohan *Liebig.* | 8 |
| 147 | Prinzessin Mathilde von Anhalt-Dessau *Mrdn.* | 8 |
| 148 | — Friedrich v. Anh.-D. *Mrdn.* | 8 |
| 149 | — Hilda v. — *Mrdn.* | 8 |
| 90 | princeps | 8 |
| 91 | purpurea magnifica *Knight.* | 8 |
| 92 | — superba | 8 |
| 93 | Queen perfection. | 8 |
| 94 | refulgens *Knight.* | 8 |
| 95 | regina | 5 |
| 96 | Reine des Belges. | 8 |

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 97 | Reine de Portugal | 8 |
| 98 | — Louise *V. Houtte.* | 8 |
| 99 | rosea pavetta | 8 |
| 100 | — punctata | 8 |
| 101 | rubra | 8 |
| 102 | Salopensis *Knight.* | 8 |
| 103 | Selima *Liebig.* | 8 |
| 104 | semi-double pink | 8 |
| 105 | symmetry *Lee.* | 8 |
| 106 | Smiths bright pink | 5 |
| 107 | — coccinea | 5 |
| 108 | — fine large pink | 5 |
| 109 | — pink | 5 |
| 110 | — scarlett pink | 5 |
| 111 | — speciosa | 5 |
| 112 | splendida *Knight.* | 5 |
| 113 | striata formosissima *V. Houtte.* | 8 |
| 114 | superba venusta | 5 |
| 115 | Susanna *Liebig.* | 8 |
| 116 | Stanleyana *Davies.* | 8 |
| 117 | Thisbe *Liebig.* | 8 |
| 118 | Toinette *Delmotte.* | 8 |
| 119 | tricolor (nec plus ultra) | 8 |
| 120 | variabilis | 5 |
| 121 | variegata | 8 |
| 123 | versicolor *V. Houtte.* | 8 |
| 124 | vittata Fortunei *Fort.* | 8 |
| 125 | — punctata *Fort.* | 8 |
| 126 | — rosea | 8 |
| 127 | Victor Jacquemont *V. Houtte.* | 8 |

---

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 128 | Azalea amoena *Ldl. & Hook.* | 8 |
| 129 | — crispiflora *Hk.* | 10-20 |
| 130 | — sinensis *Lodd.* var. lutea | 10 |

## II. Neuere.
## à Stück 10 Ngr.

152 Abd-el Kader
197 alba illustrata
183 Amalia *L.*
184 Amelia *L.*
211 Bernhard Andreas *Mrd.*
185 Blanchard *L.*
153 Boeckmannii
198 brillante *Scheuermann.*
199 carminata.
186 Catharine *L.*
154 Charlotte Corday.
187 Coelestine *L.*
200 correcta.
155 Diamant.
202 Duke of Devonshire.
203 — — Wellington.
156 Elvira.
204 Estranea
157 Eugenia.
188 F. Dreisse *L.*
158 Felicitas.
159 Franklinii.
160 Franz Joseph.
212 Friedrich Breul *Mrdn.*
161 Friedrich II.
189 Gloriette *L.*
162 Goethe; ausgezeichnet
163 Hammonia.
164 Henriette Sonntag.
191 Ida *L.*
205 Iveryana.
165 Jeanne d'Arc.
166 Jenny Lind.
213 John Metzger *Mardn.*
167 Libussa.
168 Lisbeth.
190 Lüdicke *L.*
192 Malvina *L.*
169 Maria Stuart.
214 Marie von Schönberg *Mardn.*
170 Meda.
215 — *Mardn.*
216 Modèle *Mardn.*
171 multiflora alba.
172 — rubra.
206 narcissiflora *S. & N.*
173 Natalia.
174 Oberon.
176 Pavonia.
177 Radetzkii.
150 Reginae *Mrdn.*
193 Rudolph *L.*
180 Sophie Schröder.
207 Stanleyana *Davies.*
181 Teutonia.
194 Therese *L.*
208 Trotteriana.
209 Vesta.
195 Victorina *L.*

## Neueste bestens empfohlene.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 217 | Admiral *Liebig.* | 10 |
| 233 | albo cincta *Ivery* | 20 |
| 241 | Alexander II. *v. H.* | 20 |
| 218 | Bar. de Vrière *Vrsch.* | 20 |
| 240 | Cedo nulli *Mard.* | 20 |
| 219 | Cleopatra *Mabire.* | 20 |
| 220 | Empress Eugen *Roll.* | 20 |
| 242 | fol. argent var. | 20 |
| 243 | — aureo — | 20 |
| 239 | Fried. Breuil *Mrdn.* | 20 |
| 222 | gigantiflora *Vrsch.* | 20 |
| 223 | Leeana *Lée.* | 15 |
| 234 | Lorely *Mrdn.* | 15 |
| 225 | magniflora (magnifica) *Spad.* | 20 |
| 224 | Mme. Miellez *Demar.* | 15 |
| 226 | Napoleon III. *Gain.* | 15 |
| 229 | Princesse royale *Rollis.* schönste; lachsroth auf jedem Blatt ein rother Fleck. | 30 |
| 236 | Rhenania *Mrd.* | 25 |
| 231 | Schoene Mainzerin *Mardn.* | 25 |
| 237 | Teutonia *Mard.* | 25 |
| 232 | the bride *Huds.* | 20 |
| 233 | Thusnelda *Mrd.* | 25 |

## Allerneueste Züchtung Liebig's.

**Donna Maria Anna** . . . . . . . . . . . . 3 Thlr.
Daran gewöhnt, dass dieser Züchter nur Vorzügliches dem Handel übergiebt, beschränken wir uns nur darauf, anzuführen, dass sie an Farbenreichthum die so sehr beliebte A. Herz. Ad. v. Nassau übertrifft, ebenso soll sie sich zu Massencultur als Frühtreiberei eignen.

**Tannhäuser** . . . . . . . . . . . . . . . 1 Thlr.
Uebertrifft die allbekannte A. Prince Albert an reiner Färbung, die noch in's Carmin übergeht, ebenso durch vollkommneren Bau und graciösem Wachsthum.

### Azalea pontica à Stück 10 Ngr.

132 aestivalis ornata.
133 aurantiaca.
134 calendulacea mennigf. m. ochergelb.
143 calosantha, gelb mit orange.
135 coccinea major, zinnoberroth.
145 colorans, gelb m. ocher.
139 — weiss, röthlich angehaucht, halbgefüllt.
144 Graf von Meran, weiss, rosa Hauch halbgefüllt.
142 grandiflora.
144a hians rosa, gelb, oran.
136 incarnata, rs., Mitte blas.
137 jasminoides, milchws. mit gelb.
138 lateritia striata.
147 punicea, dunkelrosa m. ocher grossbl.
148 quadricolor.
146 rosea elegans, rosa m. dunklen Streifen und orange.
141 tricolor, citronengelb mit Dottergelb, röthl. Anflug, grossblumig.
140 variabilis, purpurrosa mit orange.
14? viscocephala, purpur mit helleren Rändern, Oberlippe weiss.

## II. Camellia japonica L. var.

Ueber 500 Sorten dieser allbeliebten Gattung stehen in 3 grösseren Häusern als Standpflanzen im freien Grund, darunter die hervorragendsten Neuheiten mit nicht unbedeutenden Kosten erworben. Nur die neuesten Sorten werden veredelt, sonst alle in wurzelechten Pflanzen abgegeben, die jedoch wegen frühen Blühens so beliebt sind, **dass ich noch nie zu Vorrath kam, um solche mit Knospen anbieten zu können!**

Abbreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — rch. reich-, und gg. gutgefüllt — anmbl. anemonblüthig — kglbl. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — gr. gross — mt. mit — rglm. regelmässig — grbl. grossblumig — h. hoch — gestr. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen. Besonders schöne sind mit †, die schönsten und prachtvollsten von allen: mit * bezeichnet.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen von ½ Fuss, die der zweiten für solche von 1 Fuss und darüber.

| Nr. | Sorte | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abate Bianchi, *B. Lechi.* roth, eine weisse Linie in jedem Blatt, dachziegelförmig | 10 | 20 |
| 2 | † — Branzini, *P. Besson.* (Emilio Brandieri) dichtgefüllt, dachziegelförm. dklcarm. mit bläulicher Bordüre | 10 | 20 |
| 3 | Adelaide, dkl. weinroth dichtgefüllt, regelm. dachziegelförm. | 15 | — |
| 4 | admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl. pomponblüthig | 10 | 20 |
| 5 | *Adrien Lebrun, (Grauthieri) kirschrs. dachziegelförmig | 10 | — |
| 6 | Agnesiae, rosa zglf. Form der imbricata | 10 | — |
| 7 | alba, reinweiss dachziegelförmig | 7 | 10 |
| 367 | — briantata *H. Tetsch.* weiss, dachziegelförmig | 20 | — |
| 8 | — Casoretti, (alba prima) reinweiss mit gelben Schattirungen | 10 | — |
| 9 | — fenestrata, (alba nova plena) reinweiss dachziegelförmig | 5 | 20 |
| 10 | — grandiflora, weiss, kugelblüthig, dichtgefüllt | 8 | 20 |
| 11 | — illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnw. zglf. gg. | 8 | 15 |
| 12 | — Londonensis, (Allnuti alba, candida superba) rw. gedr. kglblth. | 8 | 15 |
| 13 | Alexandre le grand | 10 | 20 |
| 14 | Alexina, *Hugh. Low. & Co.* rothw. carm. gefl. gestr. grbl. rglm. | 8 | 20 |
| 15 | Allnuti superba, dunkelscharlach. regelmässig | 5 | 10 |
| 16 | *Alsina d'Italie, rosa weiss gefleckt und getuscht, dachziegelförmig | 12 | — |
| 17 | althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharlach, anemonblumig | 5 | 10 |
| 18 | *amabilis, *Smith.* (d'Amerique, de New-York) lbhdklrs. inn. hell | 8 | 20 |
| 443 | Amadryon di Cusano, rosettförm. lebh. rsacrmrt. breit w. gstr. mttlgr. | 1 | 10 |
| 416 | Amalia Croff, *Croff.* | 12 | — |
| 20 | Amalthea, lachsfarbig, sehr gross | 10 | — |
| 21 | Amely de Baye | 5 | 10 |

| Nr. | Name | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 22 | *americana *Dunlop*. rs. fast w. carm. gestr. u. punktirt . . . . | 10 | 20 |
| 23 | *anemonaeflora striata, dunkelkirschroth weiss gefleckt . . . . | 10 | — |
| 439 | Annette Franchetti *Miellez*. lilacarmin rein weiss gestreift dunkelrothen Anflug, ausgz. zglf. sehr rch. blüh. u. gross ganz neu | 20 | — |
| 24 | Annibal, dunkelkirschroth kugelblüthig . . . . . . . . | 10 | — |
| 368 | Antonietta Bisi, *B. Lechi*. . . . . . . . . . . . | 15 | — |
| 25 | Apollinea, rosa, reichgefüllt. dachziegelförmig . . . . . . | 10 | — |
| 369 | *Arciduca Ferdinando, kirschroth mit weissem Rand, schattirt . | 30 | — |
| 26 | *Arciduchessa Augusta. *Gaetano di Vizo Corsi* (Puccini) dklweinrt. m. w. Randstr. ins blaue spielenden Rand, dachzglf. schalförm. | 10 | 20 |
| 27 | *Arciduchesse Marie. *van Houtte*. herrl. dklkrschr. vollk. zglf. in d. Mitte eines jeden Blumenbl. mit breiten w. gestreiften Bändern durchzogen . . . . . . . . . . | 15 | — |
| 28 | Archinto, carmoisin schattirt, dachziegelförmig . . . . . . | 8 | — |
| 29 | ardens superba, reinweiss, gutgefüllt . . . . . . . . | 5 | — |
| 414 | Auguste Delfosse, *Defresne*, rosa scharlach mit lichten Rändchen und weissen Streifen, zglf. extra! . . . . . . . . | 20 | 40 |
| 30 | †Augustina superba, rosa oben weiss marmorirt dachziegelförmig | 8 | — |
| 31 | Aulica, *Loddiges*. zartrs. m. w. Rändchen und dunklen Adern . | 15 | — |
| 32 | Ayez, *Casoretti*. rosa grossblumig reichgefüllt . . . . . . | 10 | — |
| 370 | Baraffi . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — |
| 447 | Barchi vera, lebh. krschrs. rein w. gefl. reichbl. mittelgr. . . | 50 | — |
| 34 | Barni d'Italie (non Carswelliana) ponceau weiss bandstrf. dchzglf. | 10 | — |
| 35 | Baronne d'Udekem, *Jacob Makoy*. lachsfrb. m. w. Mittelstr. . . | 8 | 20 |
| 36 | Bazzoni d'Italie, corallroth, unregelmässig gefüllt . . . . . | 8 | 20 |
| 38 | †Beali rosea, *Hugh. Low. & Co*. lachsrosa centifolienartig . . | 10 | — |
| 448 | Beauty of Hornsay, lebh. krmr. w. gefl. u. gerd. s. rglm. u. rchbl. | — | 20 |
| 371 | †Bella della Petrega . . . . . . . . . . . . . | 15 | — |
| 37 | — di Firenze, *Ces. Franchetti*. . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 19 | — — Pistoja . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | — |
| 449 | Belle di Porte d'Era, lebh. krschrt. rw. band. s. rglm. schön. Bau | 40 | — |
| 460 | — Milanesa (Ital.) zrtrs. aussen blssr. m. crmr. Strf. 2 Reih. Blbl., abgerdt., leicht ausger., d. übr. ganzr. u. lanzettf. s. dicht, Centr. rsfrb. ausgez. geb. . . . . . . . . . | 60 | — |
| 39 | †Belliformis *Mariani*. dachziegelförmig, mennigroth . . . . | 15 | 30 |
| 40 | Bellini major, zinnoberroth, rosenförmig, gut gefüllt . . . . | 8 | 20 |
| 41 | Bonneyi, *Smith*. rosacrm. unregelm. gestr. ziegelförm. . . . . | 10 | — |
| 43 | Bérénice, *Mariani*. rosa crm. oft weiss gestreift dchzglf. . . | 10 | — |
| 42 | Bergama, gelbrosa mit weissen Mittelstr. u. w. geränd. Blättern . | 10 | — |
| 44 | Bettegno, carmin mit weiss gestreift, reich gefüllt . . . . . | 10 | — |
| 450 | Bijou di Firenza, lebh. krschrt. gez. d. Centr. blasser, wss. band. s. sch. geb. mittelgross . . . . . . . . . . | 40 | — |
| 47 | †Bittiniana (d'Italie) carmrs. innen feine weisse Streifen, ziegelf. | 15 | — |
| 48 | Blackbourniana, dunkelcarmin, fast anemonblüthig . . . . . | 8 | — |
| 451 | Bonominiana (Sangalli Ital.), einzig im Bau & Colorit, schneew. dicht crm. bnd. u. gestrichelt, grssbl. . . . . . . . | 60 | — |
| 49 | Bostonia, grösstentheils dunkelroth, regelmässig, dachziegelf. . | 10 | — |
| 50 | * Brillante, *Casoretti*; (Briantina) weiss sehr gross ziegelförm. | 10 | — |
| 51 | * Brocki, kirschroth weiss gestreift ziegelförm. . . . . . | 5 | — |
| 52 | Brooklyniana, carminroth innen hell . . . . . . . . . | 10 | — |
| 54 | Bruceana, dunkelkirschroth, päonienförm. . . . . . . . . | 20 | — |
| 55 | Buckliana . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 56 | Buff, fleischfarbig regelm. gefüllt dachziegelförm. . . . . . | 10 | 10 |
| 57 | * de la Reine, *J. G. Varenbergh*; w. Grd. m. lcht. Lackgl. ziegelf. | 10 | 20 |
| 58 | * Camillo Brozzoni, *Cam. Brozzoni*; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie, kirschroth, die anderen weiss . . | 8 | — |
| 59 | * Campo Molendini, *Berlèse*; carmin mit weissen Streifen, sternf. in der Mitte etwas gewirrt . . . . . . . . . | 15 | — |
| 60 | candidissima, schneeweiss dachziegelförm. . . . . . . . . | 5 | 10 |
| 373 | Caragnini . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 452 | Carega superba *Versch.*, zartrs. m. blau gem. s. auffal. rglm. mttlgr. | — | 20 |
| 62 | Carl XII. . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 63 | Carbonari, glühend dunkelcarmin., reiche neue Färbung, voll rund pomponblüthig . . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 64 | * Carolinae, weiss kugelblüth. . . . . . . . . . . . | 7 | 10 |
| 374 | Carolina Linguiana . . . . . . . . . . . . . | 20 | — |
| 65 | Caroline Smith, *Boll.*; shrgr. lebh. rs. mit weissen Mittelstreifen | 8 | — |
| 66 | * Carswelliana (Lord Kur) hllcarm. jede Pet. mit w. Mittelstreifen | 8 | — |
| 417 | — — alba . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 67 | caryophylloides, *Hugh. Low. & Co.*; w. lebhaft mit carmin geflammt und gestreift, vollkommen dachziegelförm. . . . | 10 | — |

| | | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 453 | Casilda, schnew. röthl. angehcht, geg. d. Centr. lebh, rt.. ausgz. grossblum., schönst. Bau. . . . . . . . . . | 50 | — |
| 61 | † Catherine Longhi, dunkelcarmin, grosse Form . . . . . | 8 | — |
| 68 | Cavendishi . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 69 | Celsiana, dunkelkirschroth, grossblättrig, regelm. gefüllt . . . . | 5 | 10 |
| 375 | Centifolia rosea, zartrosa dachziegelförm. . . . . . . . . | 12 | — |
| 376 | Cerito d'Italie, weiss mit rosa gestreift, dachziegelförm. . . . . | 12 | — |
| 70 | * Chandleri, reich dunkelscharlach oft weiss gefleckt . . . . | 10 | — |
| 71 | Charlemont, lebhaft rosa, kugelblüth. . . . . . . . . . | 5 | 15 |
| 72 | Cliveana, tiefrosa fast anemonenblüth. sehr gross . . . . . | 10 | — |
| 73 | Clowesiana (Marochetti, Fanny Elsler) w. mit wenig rs. Streifen . | 8 | — |
| 377 | Clymene . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 74 | Cocki vera (Triomphe de Gand) dklrt. anembl. shr. gr. gutgefüllt . | 10 | — |
| 75 | Coelestine, bläulichrs. ausen zglf. innen kglbth. . . . . . . | 10 | 20 |
| 76 | Colombo, rosa dachziegelf. . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 77 | Colvilli, paeonf. carmin punkt. gestreift sehr gross . . . . . | 5 | 10 |
| 78 | * Commerzienrath Linau, *Geitner*; diese schöne Camellie ist untadelhaft, ihre Farbe ist vom schönsten feurigen Rosa und es ist kein Blättchen, welches ausser den ceriserothen Aederchen den weissen Mittelstreifen nicht durchscheinen liesse. Die sich öffnenden Knospen zeigen rein weisse Spitzen. | 10 | 20 |
| 79 | Commensa, *Makoy*; dunkel carmin gross regelm. . . . . | 10 | — |
| 80 | composita, lebhaft rosa dachziegelförm. . . . . . . . . | 15 | — |
| 81 | Comte Carraccioli d'Italie, rosa grossblum. w. gestr. regelm. voll . | 8 | — |
| 378 | — de Neipperg, rosa weiss gefleckt dachziegelförm. . . . . . | 10 | — |
| 587 | — de Nesselrode L. ros. jedes Blatt mit w. Rand eingef. ganz regelm. imbric. sehr grossbl. von gr. Schönheit sehr selten . . | 90 | — |
| 454 | — de Chambord, lebh. carm. kirschr. im Centr. wenig blassroth gestrft. s. schön geformt und s. gross. . . . . . . | 40 | — |
| 157 | — — Flandre, weiss. breit rs. gefl. z. Basis s. fein gead. u. gez., s. gross. reich und leichtbl. . . . . . . . . | 40 | — |
| 82 | — de Paris, *van Geersdaele* wsrs. mit dklrs. Str. regelm. . . . | 10 | 20 |
| 458 | Comtesse Antoniette Castel, *Barco* (Ital.) krschrt. m. weiss band. und dklrt. gead. grossbl. . . . . . . . . . . . | — | — |
| 455 | — de Hainaut, (Belg.), w. m. zrrts. Hch., dklr schtt, gr. u. schbl. | 60 | — |
| 456 | — of Orkney. (Engl.) rahmweiss mit rosa gestreift. . . . . | — | — |
| 379 | — Carrini, w. m. rs. angehaucht m. rs. gestrft. dchzglf. . . . | 10 | — |
| 83 | * — de Spaur (maculata perfecta Vacichiara, cruciata panachè,) weinrosa schalförm. oben weisse Spitzen . . . . . | 10 | — |
| 45 | — de Castelbarco, dklcarm. gefl. o. m. w. Strhl. zglf. sehr gef. | 10 | — |
| 86 | — de Hartig, brennend roth. mit Streifen, regelm. . . . . . | 10 | — |
| 87 | — Moncenigo . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — |
| 88 | — Ottolini, *Ces. Franchetti* . . . . . . . . . . | 15 | 30 |
| 89 | † concinna, dunkelroth dachziegelförm. regelm. . . . . | 15 | — |
| 90 | conspicua, *Beck*; (Imperatrice, latifolia macrantha) rs. dklrt. gead. mit weissen Rändchen halbvoll. . . . . . . . . | 8 | 20 |
| 459 | Coupe of Beauty, (China) w. m. braun verwachsen, Cent. gelb. bräunl. u. hie und da rosa band., prachtvoll, rglm. . . | 60 | — |
| 91 | * Coquetti, *Tourrès*; feurig scharlach mit weissen Spitzen und Streifen dachziegelförm. . . . . . . . . . . . | 12 | 30 |
| 92 | Crimson Perfection, carminr. ziegelf. sehr schön . . . . . | 10 | — |
| 93 | † cruciata, meist weiss gefleckt . . . . . . . . . . | 15 | 30 |
| 94 | curvatifolia . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 95 | Dahliaeflora, regelm. feurig roth . . . . . . . . . . | 5 | 10 |
| 462 | Danovaro, (Ital.) rwss. rs. gestr. mittelgr. s. rglm. . . . . . | 40 | — |
| 451 | Dante, (Ital.), w., hie und da rothstrf. grssbl. rglm. s. schön . . | 40 | — |
| 96 | † Daniel Webster, *Boll*; carmin fein weiss gestrichelt dachzglf. | 10 | — |
| 97 | Darsii· dunkelroth oft weiss gefleckt geballt kugelblüthig . . | 5 | — |
| 98 | † Daviesii, *Davies & Co.*; granatroth mit Büschen dicht gef. zglf. | 10 | — |
| 99 | Decandollii, lichtrosa leicht gefüllt . . . . . . . . . | 5 | — |
| 382 | Delairii, dunkelrosa dachziegelförm. . . . . . . . . . | 10 | — |
| 101 | delicatissima, rosa mit carmin Streifen, paeonienförm. . . . . | 5 | — |
| 103 | Devriana . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 104 | Diadème de fleurs . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 105 | †Diva Maria, rosa regelm. . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 106 | Divonia d'Italie, blassrosa mit carm. rglm. gestreift dachziegelförm. | 8 | — |
| 108 | * Docteur Horner, *Verschaffelt*; prächtig rosa m. w. Mittelstr. zglf. | 10 | 20 |
| 109 | † Donkelaari, dunkelkirschroth weiss gefleckt fast leer aber schön. | 10 | 20 |
| 111 | Dorina Lechi, feurig carmin rosa weiss gefleckt und gest. regelm. | 20 | — |
| 112 | Dorsetti (Rex Georgius, Parthoniana) schmutzig rosa lederfarb. anemonf. sehr gross. . . . . . . . . . . . . | 5 | 10 |

| | | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 113 | * Duca Serbellino, *B. Lechi*; aurora rs. gr. u. breit wie eine Centif. | 10 | — |
| 114 | Duc de Bretagne, *Drouard* (Dux Armoricanus) rs. weiss gest. gg. herrlich dachziegelförm. . . . . . . . . . | 12 | — |
| 418 | — — Chartres . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 419 | — of Lancaster . . . . . . . . . . . . . . | 20 | — |
| 115 | — de Litta, *Mar.* rs. mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförm. | 10 | — |
| 383 | Duchesse de Berry . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 30 |
| 463 | — of Buccleugh, (Engl.) zrtrs. hie und da wsslinirt, mittelgr wie Cam. myrtif. gebaut . . . . . . . . . . | 20 | — |
| 116 | — d'Orleans (Duc. d'Orl., Reine de Cam., nobilissima nova, Regina, Reine d'Angleterre, Queen Victoria) fleischf. carm. punkt. gestr. ziegelförm. . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 117 | † — of Northumberland, *Lee & Co.* w. rosa gefl. und grbl. dachzglf. | 15 | — |
| 118 | † Dryade (vide variegata) hellrosa mit weissen Mittelstr. zglförm. | 15 | — |
| 119 | eburnea, weiss oft mit rothen Flecken, gross u. kugelbl. gutgef. | — | — |
| 120 | Eclipse, *Press.* (Pressi, Regina Gallicarum) röthl. w. gestr. kglbl. | 8 | — |
| 385 | Editha . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 121 | elata Chandleri, weiss paeonienblüthig. . . . . . . . | 12 | 30 |
| 122 | * elegans, violettroth innen weiss grosse gestrich. Blumen, sehr gr. | 8 | 10 |
| 472 | † Elena Boutourlin, *Sloane*; hochroth, dachziegelf. . . . . . | — | 15 |
| 123 | * Elphinstoni, dunkelkirschroth regelmässig gefüllt . . . . . | 8 | 20 |
| 464 | Emilia Bandiera (Ital.) s. rglm. lebh. rsrth. Centr. weiss. band. mittgr. | — | 20 |
| 465 | — Borsa, lebh. krschrth. rglm. geb. s. gross . . . . . . . | — | 20 |
| 124 | — Campioni, *Abbate Bianchi*; carminroth in bleichroth übergehend mit breiten weissroth geaderten Mittelstreifen . . . | — | 12 |
| 125 | †— Gavazzi d'Italie, rosa gefleckt und gestreift, dachziegelförm. | — | 20 |
| 126 | *— grandiflora, rosa mit wenig weissen Flecken, kugelblüth. . | 5 | 20 |
| 127 | — Taverna, scharlach mit weissem Centrum dachziegf. gutgefüllt. | 10 | 20 |
| 421 | Empereur Alexandre *Sloane* . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 128 | †— de Russie, (Borgia) roth, Mitte weiss gestreift dachziegelf. . | 10 | — |
| 130 | * Enrico Bettoni, *B. Lechi*; crms. m. e. Krz. gewirrt. Bltt. eigenth. Form | 10 | 20 |
| 131 | Estheri, *Smith.*; blassflchf. m. rs. Fl. u. Punkt. kglbl. sehr gr. ggf. | 10 | 20 |
| 132 | excelsa, (Rollissoni) weiss unregelmäss. . . . . . . . . | 10 | — |
| 133 | eximia, corallcarmin ziegelförm. . . . . . . . . . . | 10 | 15 |
| 386 | Fabio Massimo . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 134 | fastuosa, aus Italien, dunkelrosa sehr grossblumig dachziegelförm. | 10 | — |
| 135 | Faustino Lechi, zartrosa weiss getuscht, dunkel oben lichtroth gestreift und gefleckt kugelblüthig. . . . . . . . . | 8 | — |
| 136 | † Feasti, weiss rosa gestreift sehr gross dachziegelförm. . . | 10 | — |
| 137 | felicitas, lebhaft rosa pomponförm. . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 466 | Fiametta Bianchi, zartrosa zahlr. weiss band. s. rglm. mittelgr. . | 50 | — |
| 138 | * fimbriata alba, reinweiss mit gefranzten Blättern . . . . . | 10 | 30 |
| 422 | Fleur pennoni (pivoine?) . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 139 | florida, (anemonaefl. micans, Princeps) kirschsroth doppelt anembl. | 5 | 10 |
| 140 | Floy's Virginia, kirschrosa gut gef. dachziegelförm. sehr grossbl. . | 5 | 15 |
| 387 | Florentina vera, weiss dachziegelförm. . . . . . . . . | 10 | — |
| 467 | Foresta, (Belg.) hllkirschr. brtwss. gestr. grssbl. s. gut Bau, reichbl. | — | 20 |
| 142 | † formosa, *Candl.* (angulans Anglarsi) rs. carm. m. zinnob. gedr. monstr. | 8 | — |
| 143 | — Youngii, roth regelmässige Blüthen . . . . . . . . | 8 | — |
| 144 | Forsteri . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 145 | Francofurtensis (Wellingtoni, dark fulgens), bräunl. carmin. fast. zglf. | 5 | 10 |
| 146 | * Fra Arnoldo da Brescia, *B. Lechi*; grosse Blumen atlasrosafarbig mit weissen rosa marmorirten Bändern . . . . . | 15 | — |
| 147 | Fréderic le grand (Floy, grand Fréd.), rosacarm. sehr grossblumig | 8 | — |
| 148 | † Frezzolini, *Mariani* lebhaft rosa dachziegelförm. . . | 10 | — |
| 149 | * fulgens, zinnober carmin pomponblüthig . . . . . . . | 8 | — |
| 150 | — nova, lebhaft roth, jedes Blatt mit weissen Linien, ziegelförm. | 15 | — |
| 151 | Garibaldi, *B. Lechi*; rosa dunkel geadert, innere Petalen gestreift | 15 | — |
| 152 | *Garveyi (*Garviana*); blass rosa, m. carmin gefleckt und punkt. kugelbl. | 15 | — |
| 478 | General Boccalari, (Ital.) rsroth dklr. gead. centifblau, mttgr. prachtv. | — | 20 |
| 437 | — Drouet, *Lecomte* . . . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 153 | — Lafayette, *Boll.*; rosa mit regelmässig weissen Mittelstr. auf jedem Blatt und umgeschlagenen lichten Rändern . . | 5 | 20 |
| 154 | Ghittana . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 155 | Ghittiniana (?) . . . . . . . . . . . . . . . | 8 | — |
| 469 | Giardino Franchetti, zartr. strk. krischr. gead. kirschr. band. grbl. | — | 2o |
| 470 | Giovachino Rossini (Ital.) lebh. kirschr. Centr. weissgestreift und schatt. leicht und reichblühend. . . . . . . . . | — | 20 |
| 156 | Gloria delle Isole Borromeo, *Rovelli frères*; innen rosa rothgefleckt und weiss gestreift ziegelförm. . . . . . . . . | 10 | — |
| 157 | *— del Verbano, *Rovelli frères*; crmrs. mit w. Mttlstr. rglm. zieglf. | 20 | — |

| Nr. | Sorte | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 158 | gloriosa | 5 | 10 |
| 423 | Gohlia | 10 | — |
| 159 | *Governativa, aus Italien, dunkelscharl. dchzglförm. | 8 | 20 |
| 160 | †Gozzi, aus Italien, zartrosa hell gerändert schön geformt zglf. | 8 | — |
| 161 | Graf Wartemberg | 5 | 10 |
| 162 | grande Duchesse d'Etruria, weiss rosa dklrsagestr. paeonienbl. | 5 | 20 |
| 163 | *grandidissima superba, dklscharl. roth regelm. gef. | 5 | 10 |
| 156 | Grand Sultan, brillant hochscharl. w. s. gr. gemusch. vollk. zglf. | 10 | — |
| 467 | Gretry ? *Defresne.* carm. dchzglförm. | 10 | — |
| 124 | Guillaume | 10 | — |
| 168 | — Tell, *Bolle.* auss. lebh. rs. inn. zrtr. jede Blume mit w. Band | 10 | — |
| 169 | Gussonia | 5 | 15 |
| 170 | †Guthriana, *Hugh. Low. & Co.* dunkelcrm. dchzglförm. | 8 | — |
| 171 | *Halleyi, *Halley.* blutroth mit weissen Mittelstreifen | 15 | — |
| 172 | Hanna Moore, dunkel carmoisin mit breiten weissen Flecken | 10 | — |
| 173 | * Harlequin, *C. Borghi* | 15 | 40 |
| 174 | Helene | 10 | 15 |
| 175 | † Hendersonii, (Lombardii, pictorum rosea) rs. oft m. w. Fl. dzglf | 10 | — |
| 176 | † Henri Favre, lachsroth in der Mitte heller, schalenförmig | 5 | 20 |
| 177 | * heptangularis, licht kirschroth dachziegelförmig | 5 | 10 |
| 178 | * heteropetala rubra, schattirt halb pompon dachziegelförmig | 10 | — |
| 180 | Hosackii. *Floy* | 10 | — |
| 181 | ignescens | 5 | 10 |
| 182 | Il Cygno, (alba insignis) weiss durchscheinend geadert mit gelblichen Mittelstreifen | 10 | — |
| 473 | Il desinganno, (Ital.) lebh. krschr. Centr. wssgestr. grssbl. prachtv. | — | 20 |
| 183 | * Il 22 Marzo, *M.Burdin*; krschrth. w. geränd. u. w. Mttlstr. rosenf. | 10 | — |
| 184 | † imbricata, *Dunlop*; (imbr. tricolor. tric. Yougs) rglm. rs. crm. o. w. Fl. | 5 | — |
| 474 | Imbricata magna, (Ital.) lebh. rosrth. im Centr. breit u. wss. band. d. Masch. fast kreuzbild. s. ggebaut, grssbl. | — | 20 |
| 185 | † Imperatrice de Russie | 10 | — |
| 475 | — Eugenie, (Belg.) zrtrs., Rd. wssl. u. m. krm. fein lin. grbl. | — | 20 |
| 186 | incarnata, (Lady Humesblush, Ruff utescens. Maidenblush, flavescens) geröthet weiss dachziegelförmig | 5 | 10 |
| 476 | Isabella Spinola, rsarth. m. krschrth. nelkart. gstr. Sp. sch. Bau. mgr. | — | 20 |
| 477 | — (Ital.) blssrs. m. wss. nach d. Centr m. gelb. Bind. grbl. | — | 20 |
| 478 | Isolina Corsi, (Ital.) sch. krschr. hie und da wgefl. im Ctr. w. ger. klnbl. | — | 20 |
| 187 | * Innocenza, reinweiss gross dachziegelförm | 10 | — |
| 425 | Innominata | 20 | — |
| 198 | Insubria, aus Italien, (l'Insubria) rs. w. gest. mittlgrs. zglf. gutgef. | 8 | 20 |
| 189 | † Jacksonii, *Verschaffelt*; lebh. dklscharl. m. w. Mttlstr. sch. gew. zglf. | 10 | 20 |
| 188 | Jarba, rosa mit weiss bandirt, grossblum. dachziegelförm. | 20 | — |
| 190 | Jardin d'hiver, *Jardin d'hiver,* dklroth Mitte rosa gross dachziegelf. | 15 | — |
| 391 | Jaune de la Chine, *Fortune;* die erste gelbe | 20 | — |
| 194 | † Juliana, (Calypso, Tweediana superba, Climax, Comte Rambaldi) weiss rosa wenig getsreift | 10 | — |
| 169 | * Jussieui, (Jussiana;) carmin rosa regelmässig | 6 | — |
| 389 | * Justinia, lebhaft rosa ziemlich grossbl. dachziegelförm. | 20 | — |
| 197 | King, (spectabilis maculata, Clusii, Linkii,) weiss zahnfarb. schimmernd. mit rosa Strichen und Punkten | 10 | — |
| 390 | King of the Camellias | 20 | — |
| 198 | Kissi | 5 | 10 |
| 479 | La graciosa, (Ital.) s. bunt, rch. a. Frb. lebh. krschrt. w. band. rosenf. | — | 20 |
| 480 | La speranza, (Ital.) lebh. krschr. wss. band. prachtv. geb. mittelgr. | 60 | — |
| 199 | Lady Eleonora Campbell, hellscharlach leicht gefüllt | 5 | 10 |
| 200 | † — Hill, weiss carmin gefleckt und gestreift kugelblüthig | 10 | — |
| 201 | * Landrethii, Jacksonii ? lieblich rosa regelm. | 12 | — |
| 202 | latifolia macrantha, hellrosa pomponblüthig | 15 | — |
| 204 | * Leeana superba, (cocc. magna, Palmers Beali, Sieboldti,) lachsf. innen rosa oft weiss, aussen dunkelroth | 15 | — |
| 481 | Lavinia Maggi, (Ital.) rw. zierl. dklkrm. gefl. u. schatt, gr. pr. B. rund. Blbl. | 60 | — |
| 482 | Leopoldo, (Ital.) rsrth. einfrb. zieml, grossbl. s. vollk. | — | 20 |
| 483 | Livia Borromeo, (Ital.) zartrs. m. s. brt. mattwss. Bind. u. Streif. grssbl. reich und leichtbl. und regelm. | 30 | — |
| 205 | Lechiana nova, aus Italien, hellweinfarbig dachziegelförmig gr. Bl. | 8 | — |
| 206 | * Leda, aus Italien. weiss scharlach gestreift | 10 | 20 |
| 207 | Leonardo, licht rosa lachsfarbig anemonblüthig | 10 | — |
| 208 | Leopoldine, d'Italie (Princesse Leopoldine) röthlichw. r. gestreift und punctirt, fast regelmässig | 10 | — |
| 210 | Lippoldi | 8 | — |
| 212 | Lord Peel, *Alex. Verschfft.*; hellkirschroth, Mitte mit w. Rand zglf. | 15 | 20 |

| | | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 213 | Lovely rose | 10 | — |
| 214 | † Lowii, *Hugh Low & Co.*; neu lachsrs. m w. Mttlstr. reglm. zglf. | 8 | 20 |
| 484 | Luisa Bossola (Ital.) zrtrs., jed. Bl. m. ws. Bnd. vllk. dchzglf. prchtv. | 45 | — |
| 392 | Lysantha, weiss röthlich und roth gestreift kugelförmig | 20 | — |
| 215 | Mackoyi (Low's Macesto); dunkelroth in rosa schimmernd | 10 | 30 |
| 216 | maculata superba, weiss rosa gestreift kugelblüthig | 15 | — |
| 415 | * Madame Picouline, *Verschaffelt*; dkl. kirschroth flach rosenblüthig extra schön | 25 | — |
| 217 | Madonna, weiss mit carmin gestreift dachziegelförm. | 10 | — |
| 218 | Magdalena, hellroth mit weissen Streifen und Rändern rosenförmig | 10 | 20 |
| 394 | * magnifica rubra, carm. m. w. und hochrt. schatt. Bltt. gekerbt zglf. | 20 | — |
| 219 | magnificent, *C. Borghi* | 10 | 20 |
| 393 | Manasse | 20 | — |
| 221 | Manzoni | 10 | — |
| 485 | Marchesa Costabile, rws. m. einzig lbh. crmrth. Strf. s. leicht & rch. Blume erster Grösse | — | 20 |
| 486 | — Garbaroni, (Ital.) lebh. kirschzinnobrth. regelm. mittelgr. | 40 | — |
| 487 | Margherite Celeoni, (Ital.) | 40 | — |
| 222 | Marchioness of Exeter, *Priaulx*; grossbl. zartrosa ziegelförm. | 8 | 20 |
| 523 | Marguerite Lechi, *B. Lechi* (Victoria magna Maddalina) | 15 | — |
| 125 | * Marianne Trivulgia. *M. Trivulgio*; w. m. carm. gestr. u. gefl. ggf. | 8 | 20 |
| 225 | * Maria Theresia, *C. Maggi* gelblich rs. mit dkl. carm. Punkt und Fl. gewölbt ziegelförmig | 10 | — |
| 438 | Maometto, *Croff.*; braunroth. ziegelförmig | 25 | — |
| 217 | * Mathotiana, *Mathot.*; schönste und grösste regelmässige dachziegelförmige Blume scharlach mit rosa Reflex | 20 | — |
| 440 | — alba, *Miellez*; schneeweisse grosse sehr elegante Blume von der schönsten Dachziegelform, sehr reichblüthig. | 20 | — |
| 228 | Mazeppa *Mariani*, feurig kirschroth, sehr gross, dchzglf. | 20 | — |
| 229 | * Mazuchelli, (Mazarelli, Bijou, de Medeci) *Casoretti* hllcrm. m. w. Strf. dchzglf. | 5 | 20 |
| 230 | Medica, fein carmin scharlach ponponblüthig oft regelmässig | 10 | — |
| 232 | * Meneghini, carmin, regelmässig weiss gestreift | 10 | — |
| 233 | mexicana nova, *C. Borghi* | 15 | — |
| 234 | * miniata. *Hugh Low & Co.*; scharlach mit w. Herz rosa u. dzglf. | 8 | 20 |
| 235 | * minuta, *Hugh Low & Co.* bläulichrosa. oft gestreift dachziegelf. | 10 | — |
| 236 | † Miranda rosea, rosa dachziegelförmig | 10 | — |
| 427 | Mistress Ubaldi | 10 | — |
| 237 | * Monarch, *Halley*; dunkel lachsfarbig. weiss panachirt, kugelblüthig | 10 | — |
| 238 | Monetti, metallglänz. carmin. dkl. Linien fast regelmässig zglf. | 10 | — |
| 239 | * Monteroni vera, gelblich weiss, rosagestreift. dachzglf. sehr gross | 10 | — |
| 240 | * Mrs. Abby Wilder, *Marschall Wilder*; w. selten rosa Strf. regelm. zglf. | — | — |
| 241 | Murayana vera, carmin scharlach dachziegelförmig sehr gross | 10 | — |
| 142 | myrtifolia alba *Rev Herb.* (Circe Schachkönigin, albicans, Princesse Royale) dunkel rosa spitzblättrige Blume, dachzglf. | 8 | — |
| 243 | Napoleon, *Defresne*; carmin dachziegelförmig | 15 | — |
| 428 | — le grand | 15 | — |
| 244 | Nassiniana, hellcarmin mit weissen Streifen, dachziegelförmig | 8 | 20 |
| 429 | Neoboracensis | 8 | — |
| 246 | * Nerone, *Paillet*; hochscharlach ins bläuliche spielende Rändchen | 10 | — |
| 248 | * nitida, *Chandler*; hellscharlach mit weissen Randstreifen dachzgl. | 10 | — |
| 250 | † nymphaefolia, lbh. kirschr. in rosa übergeh. dachziegelförmig | 12 | — |
| 492 | Normanni, (Engl.) zrtrs. Rand blassviol. Catr. wss. mttlgr. prachtv. B. | — | 20 |
| 493 | Onore del monte, (Ital.) lebh. rs. sternf., brt. wss. Strch. u. Bänd. grossbl. reich & leichtblühend | — | 20 |
| 494 | — delle torre, (Ital.) schönst. jed. Blbl. w. band, Ctrm. klbl. dklgef. s. sch. Bau. ausgerundet | — | 20 |
| 251 | ochroleuca, weiss mit gelbem Schimmer, fast zglf. sch. u. gutgef. | 10 | — |
| 252 | Onore de Pippiana, *Ridolfi*; w. mit carmin gestreift dachzglf. | 10 | — |
| 253 | * optima, *Hugh Low & Co.*; lebh. rosam. carm. Strf. gr. ziegelf. | 20 | — |
| 254 | * Orphio, (Orfeo) carmin helle Mitteltsr. regelmässig | 10 | 20 |
| 255 | Oxoniensis, (mutabilis maculata amplipetala), flattrig, zart hellrs. grossblättrig gut gebaut | 10 | — |
| 256 | † Parini, *Casoretti*; w. m. gelb. Schimmer selten roth. Strf. paeonf. | 5 | 10 |
| 257 | Parmentieri grandiflora. *Smith*; rosa ins krschr.. übergeh. rgl. gef. | 5 | 10 |
| 397 | * parvula lebh. rosa inn. zartr. kleinbl. extra zu Bouquets | 30 | — |
| 258 | * Paul und Virginie, *Grüneberg*; weiss rosa | 8 | — |
| 59 | * Pawlikowsky. *Grüneberg*; schön rosa dachziegelförmig | 8 | — |
| 260 | † Pensylvanica (Longstreathii). lebhaft roth mit rosa Sch. und breiten weissen Mittelstreifen dachziegelförmig | 10 | — |
| 261 | Percevalii *Hippert*; dunkelroth unregelmässig | 10 | — |

| Nr. | Sorte | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 262 | * peregrina, weiss. carmin gestreift wie eine Nelke. | 15 | — |
| 263 | * perfecta, *Palmer*; bald hell, bald dklr.w. gest. gg. zglf. | 10 | 20 |
| 264 | Perfection, *Cunningham* | 10 | — |
| 265 | † — *Palmer*; (Palmer's Bealy. Palm. Cavendishii, Palm. Seedling. Theophiliana striatiflora) carmin schön dachziegelförmig. | 10 | — |
| 495 | perfecta variegata, (Ital.) s. sch. bunt. wie varieg. doch bess. geb. | 40 | — |
| 266 | Perpenti d'Italie, rosa w. gefl. zglförm. | — | — |
| 398 | †Piccioli, lebh. rs. zuweilen weiss gefleckt dachzglförm. | 40 | — |
| 267 | picta grandiflora, *Comte Caraccioli*. wssl rs. dklr. u. krschr. gestr. | 10 | — |
| 496 | — *Herb.* (N Am.) wss. rt, bnd. Cent. gelb schtt. grbl. s. rglm. | — | 20 |
| 268 | pictorum coccinea, *Jamma*. dklscharl. zglf. grossbl. | 8 | 20 |
| 269 | †Pio IX., *Milan*. carm. nach d. Mitte rs. u. w. auslauf. sternf. | 8 | — |
| 270 | Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. lin. s. gef. zglf. | 10 | — |
| 399 | *Pitonessa, lebh. rosa kirschrt. zuw. w. gefl. | 30 | — |
| 271 | Pius IX., *Mariani*. dklrs. i. d. Mtt. m. w. Strfch. zglf. etw. spitzblttr. | 15 | — |
| 272 | *platypetala, durchscheinend röthl. weiss, rothgestr. flach paeonf. | 7 | 10 |
| 273 | pomponia, weiss, paeonienblum. grossblättr. | 7 | 10 |
| 430 | Powhataw | 8 | — |
| 276 | *Pratti, *Buis*. hellrosa, jedes Blatt m. w. Mittstr. gr. gg. zglf. | 10 | 20 |
| 277 | Preston's Eclipse, rosa, kugelbl. schön | 5 | 20 |
| 279 | *Prince Albert, *Chandler and Sons*. (Albertus) hllrs. crm. punkt. kglbl, | 10 | — |
| 200 | — of Wales. lebh. carm. weiss, durchsicht. dchzglf. | 20 | — |
| 278 | princeps | 5 | 10 |
| 480 | *Princess Bacchiochi, *J. Boffi*. dklzglrt. m. w. Mttstr. zglf. rglm. | 8 | 20 |
| 281 | *— Charlotte, w. u. ros. ins gelbl. spielende Bl. Bau extra | 15 | — |
| 497 | Princesse Friedrich Wilhelm of Prussia, (China) zrtrsa. nüanc. oft crmrs. gestr. wie Nelken, mittlgr. s. vollk. | 90 | — |
| 431 | Princess Marianne | 10 | — |
| 282 | — Marie, *V. Houtte*. lachsrosa mit weissen Mttstr. | 5 | 15 |
| 283 | — Mathilde, *Spini*. rosa oft weiss gestreift regelm. | 10 | — |
| 432 | — Rapigliosa | 10 | — |
| 284 | *— Royal, *Hugh Low, & Co.* dklrs. aussen zglf. innen gewirrt | 10 | — |
| 285 | Principe di Salerno, *Gullino*. rein weiss, zglf. gr. | 10 | 20 |
| 498 | Principessa Maria Pia, (Ital.) lbh. rs. wss. bnd. u. f. gead. ranunkelf. von den kleinen eine der schönsten | — | 20 |
| 499 | — Rospigliosa (It.) auss. lbh. rs. Mtt. ws., Bas. d. Blbl. lchtrs. s. ndl. Bl. | — | 20 |
| 500 | — Vedoni, (It.) erste 2-3 Reihen rosa, entfernt gestellt und oft wss. bd, die folg. dicht. viel klein. & lanzttfrm. schönst Rosa, alle and. krschbltrth. reich & leichtbl. eine der hervorragendsten | — | 20 |
| 471 | *Prinzessin von Preussen, *A. Topf*. (Virgine Calubini, Virgine di Colle Beato) Blm. v. reinst. w. inn. m. gelb. Stern, deren Petalen in sieben spiralförmigen Parthien geordnet sind | 25 | 60 |
| 288 | Pronayana | 8 | — |
| 289 | †pulchella, hochrosa kuglblüth. gutgef. | 10 | — |
| 290 | punctata (Gray's invincible, Imperialis splendida) rs. gstr. punct. paeonf. | 5 | — |
| 291 | Queen of Dänemark, *Hugh Low. & Co.* leucht. krschrt. rw. gestr. spärl. zart rosa mit weisser Bordüre allervollendetste ! ! ! | 30 | — |
| 292 | — — England, zrtrs. rglm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf. | 10 | — |
| 293 | †— — — *Fiedler*, (Queen of great Britain) rosa, jedes Blatt mit weissen Mittelstr. dchzglförm. | 5 | 20 |
| 294 | *— Victoria, *Priestley*. dunkelroth mit weissen Mittelstr. | 8 | — |
| 401 | Radeschio | 10 | — |
| 295 | *radiata, (Marchese Ridolphi) rosa mit dunklen Adern. zglförm. | 10 | — |
| 296 | *Rappalino aus Italien, lbh. rsacrm. in jed. Bl. w. Mittelstr. zglf. | 20 | — |
| 297 | Ravesiana, (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmer's striped Waratah, Palm. carnea) dkl. corllr. monstr. anmblt. grssbl. | 5 | — |
| 402 | Re d'Italia, lbh. dklrs. mit w. gestr. dchzglf. | 10 | — |
| 298 | Reevesiana, (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyndersii rosaefl.) dpp. anmbl. hellschrl. dklrs. zglf. halbgef. gr. Blüthen | 5 | — |
| 501 | Regularis imbricata, (Belg.) lebh. krschrt. geg. d. Centr. f. w. gestr. mittelgr. sehr regelm. | 40 | — |
| 299 | Reine des fleurs, *Donkelaer*. dklcrmrth. oft mit w. band. | 10 | — |
| 403 | — des Vierges, *Boll*. zartrs. gelblich ranunkelblüth. | 10 | — |
| 423 | — Louise, *E. De Fresne*. | 10 | — |
| 404 | Richardsonii | 10 | — |
| 300 | *Ristorii, aus Italien. dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Strf. | 20 | — |
| 301 | Robertsoni. leuchtend dunkelschrl. regelm. u. gross | 10 | — |
| 502 | Roi des blanc, (Belg.) reinwss. grbl. s. g. Bau | — | 20 |
| 302 | — Leopold, *E. De Fresne*. | 15 | 20 |
| 303 | Rollissoniana, rosa | 10 | — |
| 304 | Romaniensis, *Mariani*, w. m. glbl. Schtt. u. rt. Strf. u. Fl. zglf. grbl. | 10 | 20 |

| | | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 503 | Rosamunda. (Ital.) schönst wss. u. regelm. geb. Srt. | 60 | — |
| 306 | rosea plena, rosaroth regelm. gbt. gutgef. | 5 | 10 |
| 307 | Rose de la Chine | 15 | — |
| 308 | †Rothschildiana, *Hugh Low. & Co.* gr. gg. fleischf. mit w. Str.dchzglf. | 15 | — |
| 309 | rubescens, *Hugh Low & Co.* lachsroth w. linirt, rund Bltt. rglm. | 10 | — |
| 310 | rubra plena, dunkelroth, regelm. gefüllt | 5 | 10 |
| 405 | rutilans | 10 | — |
| 311 | *Sacconi, (Ital.) (color di lacca), blassrosa mit brt. Strf. dchzglf. | 8 | 20 |
| 312 | * nova, (Alfida, Alcina, Angustina superba, Normanni, Jacco primo, Rosa nova), rosa dachziegelförm. | 15 | — |
| 313 | Samailoff, blutroth, braun geadert, mit weissen Mittelstreifen | 10 | — |
| 406 | * Sahra Trost, lebhaft rosa gefleckt, innen gelblich | 30 | — |
| 315 | * sericea striata, schönrosa mit regelmässig w. Mittelstr. dachzglf. | 10 | — |
| 316 | * Serra, ganz blassrosa dunkel gestreift und punktirt kugelbl. | 10 | — |
| 317 | Sherwoodii, *Sherwood.*; lbh. kirschroth weiss gestreift ziegelf. | 15 | — |
| 318 | Soulangiana plenissima, d'Italie, carmin rosa regelmäss. | 15 | — |
| 434 | Sovereign, *Low.* | 15 | — |
| 320 | spiralis nova, Ital.; carmin scharlach mit weissen Streifen dachzglf. | 10 | — |
| 321 | splendens | 8 | 15 |
| 322 | Spofforthiana vera, weiss fein carmin gestreift | 15 | — |
| 323 | squamosa, carmin mit kleinen Schattirungen oft weiss eingefasst | 8 | 20 |
| 324 | Strombio, aus Italien, weinroth, grossblumig, gut gefüllt | 8 | — |
| 325 | Suglio, (Sorvii), scharl. ins rosa, ziegelf. einen Stern bildend. | 10 | — |
| 326 | sulcata, (Bele Irène,) w. gr. Bl. mit weissen Mittelstreifen ziegelf. | 8 | 15 |
| 327 | Sweetii, zartrosa roth punktirt und gestreift kugelblüthig | 10 | — |
| 328 | † symmetrica, rosa ziegelförm., Musterblume | 10 | — |
| 504 | Teutonia amabilis, (Blg.) crmrs. ws. eingf. viol. schtt. mittgr. ausg. B. | — | 20 |
| 329 | — *Grüneberg*; (Victoria und Albert) oft rosa, oft weiss. oft gestreift an derselben Pflanze. dachziegelform. | 10 | 20 |
| 330 | Theresa Marchesa d'Ambra, auss. rosa inn. dunkelrs. oft gead. zglf. | 20 | — |
| 331 | Theresiana | 20 | — |
| 332 | Thomasinii, (Thomasii d'Italie), weinrs. oft weiss gefleckt dachzglf. | 15 | — |
| 333 | Thompson superba, zinnober carmin Rand, dicht pomponblüth. | 15 | — |
| 334 | † Torinelli, (d'Italie), prächtig rosa Bau einer Centifolie | 15 | — |
| 335 | * Traversi plenissima, (mut. Traversi), rosacarm. weissl. geränd. gebänd. dachziegef. | 8 | 20 |
| 336 | tricolor, Grand weiss, breit carmin gefleckt halbgefüllt. | 5 | — |
| 505 | Triomfo di Lombardo, (Ital.) dunkelkirschroth, s. gross, dachziegelf. | 2 | — |
| 435 | Triomphe de la ville de Ciani | 10 | — |
| 338 | * — de Milan, weiss lebhaft roth gestreift gross | 10 | — |
| 337 | * triumphans, (triumphans de Gand), sehr gr. h. brillantroth rs. kglbl. | 10 | 15 |
| 339 | Tsubacki | 5 | 15 |
| 408 | Uhland, weiss, zuweilen rosa gefleckt innen gelblich | 30 | — |
| 340 | Vandesiana carnea, dunkellachsfarbig sehr regelmässig dachzglf. | 8 | 15 |
| 341 | — superba, hochkirschroth brennend regelmässig gefüllt. | 5 | 10 |
| 342 | Van Houttei | 8 | — |
| 343 | variegata plena, lichtrosa mit weissem Fleck leicht gefüllt. | 10 | — |
| 344 | — superba | 10 | — |
| 345 | † Venera, lebhaft carmin oft weisse Streifen dachziegelförm. | 10 | — |
| 346 | venosa, (Theresiana, Pompon gris., paeoniflora aurea), weisslich rosafarbig mit rothen Adern durchzogen | 5 | 20 |
| 409 | Venturi *Lechi* | 10 | — |
| 347 | Verger, zartrosa dachziegelförm. Mitte gewirrt | 15 | — |
| 348 | †Verschaffeltiana, *Alex. Verschaffelt*; lbh. rosa mit weissen Mittelstreifen regelmäss. sch. ziegelförm. | 15 | — |
| 349 | Vexillo di flora, rosa dachziegelförm. sehr gross | — | 5 |
| 410 | — Lombardo, lebhaft rosa grossblum. dachziegelförmig | 5 | 20 |
| 506 | Victor Hacquin, (Belg,) lebh. kirschroth grossb. vollk. dachziegelförm. | 40 | — |
| 350 | * Victoria Antwerpensis, mlchw. m. dklrth. leicht gestr. fast zglf. | 8 | 20 |
| 351 | — Magnesii, rosa mit breiten weissen Mittelstreifen, dachziegelf. | 7 | 20 |
| 507 | — Pisani (It.) lebh. rs. m. crm. gem. br. wssbnd. vllk. regelm. pracht. | 40 | — |
| 352 | villageoise, röthlichweiss, mit roth punktirt | 10 | 20 |
| 354 | Visiani, d'Italie, feuerroth | 15 | — |
| 411 | † vittata, lebhaft rosa weiss bandirt, extra Bau | 10 | — |
| 355 | † Waadii, a. Amerika, milchweiss fast dachziegelf. | 10 | 20 |
| 356 | * Wallichii, rosa mit weiss gefleckt, kugelblüthig | 15 | — |
| 412 | Wappnitii, rahmweiss mit rosa gestr. regelmäss. | 20 | — |
| 357 | Waratah, dunkelrosa regelmäss. | 5 | 10 |
| 358 | Welbanki, milchweiss unregelmäsig geformt, grossblumig | 7 | 10 |
| 359 | Weymourii, weiss röthlichem Anflug. anemonblüthig grossbl. | 5 | 10 |
| 360 | Wilbrohami, hell rosa, fast paeonienförmig kugelblüthig gutgefüllt | 6 | 10 |

| | | Ngr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 361 | Wilderi (Marschall Wilder), herrlich zartrosa regelmäss. ziegelförm. | 10 | 20 |
| 416 | † William IV. glänzend dunkelroth, schön dachziegelförmig . | 20 | — |
| 362 | † Woodsii, schön rosa sehr gross gutgefüllt . . . . . . . | 7 | 20 |
| 363 | * Youngs seed, schön weiss, sehr grosblumig, regelmäss. dachziegelf. | 8 | 15 |
| 364 | * Zephyr (il Zeffiro), sehr schön carmin dachziegelförmig . . | 10 | — |
| 365 | Camellia reticulata *Lindl.* rosafarbig halbgefüllt grossblumig . . | 10 | — |
| 366 | — Sasanqua *Thbg.* (maliflora *Hrt.*) rosa gg. kleinbl. paeonförm. . | 8 | 20 |

# III. Chrysanthemum indicum Thbg. var.

Starke Pflanzen à 3 Ngr.

1 alveoliflorum *Lebois.*
2 Aramis *Lebois.*
82 Ascania *Lebois.*
4 Attala *Lebois.*
5 Augustinus.
6 Advocat Tardif *Ferrand*
78 Ida *Lebois*
9 Colibri *Ferr.*
10 Comte de Chambord *Ferr.*
11 Daglide.
12 Dame blanche *Lebois.*
13 Dèjanire.
14 Etoile du matin *Ferr.*
15 Française.
77 Capitain Thubay *B.*
18 Jason *Lebois.*
19 Julie Langlade.
20 La Laponne *Bonam.*
22 Lartey.
23 Le Nain Bebè *Bonn.*
24 Louis Chaix *Ferr.*
25 Madame Chauviére.
80 Mme. Andry *Lebois.*
67 Mme. Charles Leroy *Lebois.*
27 — Julie de Lory *Lebois.*
29 M. A. Pascal *Ferr.*
30 M. J. Philopal *Ferr.*
31 multiflora
32 Nelly.
39 Protèe *Lebois.*
40 Regulus.
41 Rose d'amour
42 Rosine *Ferr.*
45 Sidonie *Bonn.*
47 Triomphe de Bordeaux.
48 Vacite *Lebois.*
49 Zephir *Lebois.*

## Frühblühende Zwerg- oder Pompon-Chrysanthemum, à 5 Ngr.

63 Antoinette *Adam.*
51 Athensony.
3 Baronne de Baulat *Bon.* rosa mit lila.
7 — Henry d'Avisard *Bon.* lila, purpur mit gelben Punkten.
8 Bouquet de Renoncules *Bon.* weiss.
52 Danais.
17 Delphine *Pelée.* rosa, lila Pompon.
16 Donna Albar Gonzales *Bon.*
26 Eugenie Laujolet *Bon.* gelb, kugelf.
28 Fanfaluche, lila.
33 Favorite *Pelée* weiss, inn. schwflgelb.
64 Guilleri *Leb.*
55 Iris.
21 La Liliputienne.
34 Mme. deFallguerolles, rosa lila.
45 — de Fleurian *Bon.* gross weiss.
65 — de Guémin *Bon.*
36 — de Montale *Bonn.*
85 — de Lavalliere *Bonn.* milchweiss.
44 — Domage *Bon.* weiss.
38 — Ernestine Bernedo *Bon.* kanel mit roth gezeichnet.
45 — Fould Pelé, rosa, Mitt. goldf.
50 — Josephine Granié *Bon.* Pompon gelb mit roth.
59 Mme. Leo d'Ounous *Bon.* weiss mit roth.
43 — Marie d'Ounous weiss mit blassr.
53 — Vives, granatroth.
66 Mlle. Zélie Decain *Leb.*
67 Manetta *Leb.*
60 Marie Rendatler *Sal.*
68 Marquis d'Alfara.
54 Marquise de Molleville.
69 Meteore *Pertures.*
70 Mira *Leb.*
71 Pandore *Bon.*
37 Pompon d'or.
57 Pégase.
56 Précurieuse.
62 Vierge enfentine *Lebois* rein weiss.
61 Virgo Maria *Salom.* grossblum.

## Zwerge der Zwerge genannt, à Stück 5 Ngr.

72 Comtesse Ventura *Leb.* lila mit weiss nüancirt und gelb punktirt.
73 Crecelle *Leb.* kastanienbraun m. goldgelben Tupfen.
74 Grazieusette *Bon.* dunkelcarmoisin braun sehr vollkommen.
75 Zoé Feille *Leb.* rosaviolett.

## Neueste grossblumige à Stück 7 Ngr. 5 Pf.

89 Arabella, grossbl.
93 Rice Rosazza *Bart.* purpur & feuerfarb. dachziegelförm. kugelbl. grossbl.
90 Laure *Leb.* zimmt mit gelb. Grund. kugelig. mittelgross.
91 Maréchal Niel, *Bart.* carm. Mitte goldgelb, dachziegelförmig grossbl.
88 Nenni Da *Leb.* rosa lilla, Grund weiss, kugelig, dachziegelförm. Zwerg.
92 Procida.
94 Risette *Pert.* schwefelgelb, s. gef. dachzglförm. mittelgross.

# IV. Coniferæ.

Seit vielen Jahren schon lenkt man wieder alle Aufmerksamkeit auf diese immergrünen Gehölze, so dass ich keine Opfer scheute, diese schöne Sammlung immer mehr zu vervollständigen.

Die mit *f* bezeichneten halten im Freien aus; die mit *g* verlangen Schutz im Winter; wo nichts steht, gehören sie für's Kalthaus.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Abies Appolinis (Pin. *Fk.*) 1jähr. | — | 10 |
| — cephalonica *Loud.* 1 & 2j. | — | 10-20 |
| — coerulescens vera . . . | — | 20 |
| — brevifolia vera . . | 1 | 20 |
| — Brunoniana *Lindl.* (Tsuga) | — | 18 |
| — Menziesii *Loud.* . . . | — | 15 |
| — Peloponesiaca 1jähr. . | — | 10 |
| In den verschiedensten Gartenschriften als sehr schön beschrieben. | | |
| Actinostrobus pyramidalis *Miq.* (Callitris *Sweet.*) . . | 1 | — |
| Araucaria Biddwillii *Hook.* . | 1 | — |
| — brasiliensis *Rich.* . . | 3 | — |
| — Cunninghamii *R. Br.* (stark) | 20 | — |
| — imbricata *R. & P.* Samenpfl. 1 Fuss 2 Zoll hoch . . | 2 | — |
| Fr. Biota aurea (Thuja orientalis var. Sieboldii) . . *f* | — | 12 |
| Fr. — nepalensis *Endl.* (Thuja *Lodd.*) . . . | — | 10 |
| — oriental.-australis *Hort.* . | — | 12 |
| — — expansa *Endl.* . . . | — | 12 |
| — — microcarpa . . . | — | 10 |
| — — nana . . . . . | — | 20 |
| — — tartarica *Pind.* . *f* | — | 10 |
| Callitris quadrivalvis *Vent.* (Thuja articulata) . . . . | — | 20 |
| — rhomboidalis *R. B.* . | — | 20 |
| — australis (Thuja) . . | — | 12 |
| Cedrus africana *Hort.* (argentea & elegans *Hort.*) stark . *f* | 1 | — |
| — Libanensis *Loud.* (Pinus Cedrus *L.*) . . . *g* | 1 | — |
| Fr. — Deodara *Roxb.* . . | 1 | — |
| Cephalotaxus acuminata *Lindl.* | — | 25 |
| Fr. — adpressa *Hort.* . . | — | 15 |
| — drupacea *S. & Zucc.* . | — | 25 |
| — Fortunei *mas. Ldl.* . | — | 20 |
| — umbraculifera *Simb.* (Taxus Dovastonii *Hort.*) . . *f* | — | 20 |
| — pedunculata *S. & J.* (Podocarp. Harringtonii *Hort.*) | 1 | — |
| Chamaecyparis ericoides *Endl.* | | |
| — glauca *Zucc. & Bince.* . | 1 | — |
| — nutkaënsis *Spiel.* (Thujopsis borealis *Hort.*) . . . . | — | 10 |
| — sphaeroidea *Spch.* (Cupress. thyoides *L.* Thuja sphaer. *Rich.*) . . . | — | 3 |
| — — nana (Cupressus nana *Hort*) . | — | 5 |
| Beide einjährig. | | |
| Cryptomeria araucarioides . | 1 | — |
| Fr. — japonica *Don.* *g* . . | 1/3 1 | — |
| — — var. nana . . . . | — | 20 |
| — Lobbii *H. Angl.* . . . | 1/2 2 | — |
| Cunninghamia chinensis *R. Br.* (Pinus lanceolata *Lamb.*) | 1/3 1 | — |
| Cupressus africana *Mill.* . | — | 20 |
| — Bregeoni *Hort.* . . . | — | 20 |
| — capensis *Hort* . . . | — | 20 |
| — Drummondii *Hort.* . . | — | 25 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Cupressus expansa (tetragona) | — | 10 |
| — funebris *Endl.* . . | 1/6-2 | — |
| — glauca *Lam.* (lusitanica Tournef.) . . . . | — | 10 |
| — — pendula (sinensis glauca) . . . . . | — | 15 |
| — glandulosa . . . . | — | 20 |
| — Goveniana *Hrt.* . . . | — | 20 |
| — himalayensis . . . | — | 12 |
| — japonica *L. fil.* . . | 1 | — |
| — Knightii *Hort.* (elegans) . | — | 10 |
| — Lambertiana *Hort.* . | — | 10 |
| — Lindleyi *W.* (C. Lambertii *Hort.* macroc. *Hartweg*) | — | 12 |
| — Mac-Nabiana Murr. . | — | 15 |
| — majestica *Lamb.* . . | — | 25 |
| — Reinwardtii . . . . | — | 15 |
| Dacrydium cupressinum *Sol.* Sprossen z. Bierbereitung in Neu-Seeland. . . | — | 25 |
| — Franklini *Hoock. fl.* (huonense Cun.) . . | — | 20 |
| — fuscum *Baum. Cat.* . | 1 | — |
| — Mayi *H. Anglor.* . . | — | 15 |
| Dammara alba *Rumph.* . . | 3 | — |
| — Bidwilli . . . . . | 3 | — |
| — orientalis *Don.* . . . | 3 | — |
| Ephedra altissima *Desf.* . | 15 | — |
| Fr. — distachya *L.* . . . | — | 15 |
| Fr. — fragilis *Desf.* (distachya *Rowe*) . . . . | — | 15 |
| Fr. Fitzroya patagonica *Hook.* | 1/3-1 | — |
| Frenella Fontanesii *Mirb.* (Callitris quadrivalvis *Vent.* 1j. | — | 10 |
| — Hügelii *Hort.* stark . | 1 | 15 |
| — macrostachya 1jähr. . | — | 15 |
| — triquetra *Spach.* . . | 1 | — |
| Glyptostrobus heterophylla *End.* (Taxod. sinense *Pind.*) . | — | 25 |
| Fr. Juniperus communis *L. f.* | — | 5-10 |
| Fr. — — *L.* hispanica . | — | 12 |
| Fr. — — pyramidalis . | — | 15 |
| Fr. — daurica *Pall.* . . . | — | 10 |
| Fr. — — B. cracovica *Lod.* | — | 10 |
| Fr. — echinoformis *Hrt.* (Oxycedrus *L.*) . . . . | — | 02 |
| — flagelliformis *Hort.* (cernua *Roxb.*) . . . . | — | 15 |
| — excelsa *Bib.* (Cedrus occidentali - foetidissima *Tourn.*) . . . . *f.* | 1/3-1 | — |
| — — var. nana . . . | 1 | — |
| — chinensis *L.* (nepalensis *Hort.*) . . . . | 1 | — |
| — gigantea *Roezl.* 1jähr. Smpfl. . . . . . | — | 10 |
| Fr. — Gossainthanea *Hort.* . | — | 12 |
| — interrupta *Wendl.* . . | — | 12 |
| — macrocarpa *Sibth.* (J Wittmannii *Hort.*) . . . | — | 15 |
| Marshalliana 1-jähr. . | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Juniperus mexicana *Schlchd.* (Deppeana *Steud.*) . , | — | 20 |
| Fr.— prostrata *Mchx.* (repens *Nutt.*) . . . . . | — | 15 |
| — — glauca. , . . . | — | 10 |
| — quaternata *Miq.* nova spec. (Cupressus funebris *Hort.*) | 1 | — |
| — religiosa *Hort.* (excelsa nana *Endl.*) . . . . . | | 20 |
| Fr.Sabina *L.* (Sabine cupressifolia *Ait.*) . . . . . | *f*— | 5-7½ |
| — Schollii *Hort.* . . . . | — | 15 |
| — Struthiana *Hort.* . . | 1 | — |
| — sphaerica . . . . . | — | 10 |
| Fr.— virginiana *L.* 3jähr. . | — | 3-20 |
| Libocedrus chilensis *Endl.* . | — | 20 |
| — decurrens *Torr.* (Thuja *Hook.*) | — | 20 |
| — excelsa *Hort.* (Th. Bonjard Cupressus americana *Traud.*) | — | 25 |
| — Meldensis . . . | 1 | — |
| Phyllocladus rhomboidalis *Rich.* | 1 | — |
| — trichomanoides *Don.* . | — | 20 |
| Fr.Pinus Abies *L.* 3jähr. (Picea du Roi. Abies excelsa *Lam.* Picea vulgaris *Link.*) . | — | 3 |
| — acutissima 1jähr. . | — | 10 |
| — ascariniana . . . | — | 15 |
| — Apollinis *Aut.* 2jähr. . | — | 15 |
| Fr.— balsamea *L.* (Abies) . | — | 10 |
| Fr.— canadensis *L.* (2jähr.) | — | 5 |
| — Cembra (1jähr.) . . | — | 10 |
| Samen sehr wohlschmeckend. | | |
| — cephalonica *Steud.* (Abies) 2-jährige Samenpflanzen | — | 20 |
| Fr.— clanbrasiliana *Lodd.* . | — | 20 |
| — cilicica (2jähr.) . . | — | 10 |
| Fr.— excelsa *Wall.* . . | — | 20 |
| — — pygmaea . . . | — | 20 |
| — Hartwegii *Lindl.* (2jähr.) | 2 | — |
| — inflexa *Hort.* (2jähr.) . | — | 20 |
| — insignis *Dougl.* . . | 1 | — |
| Fr.— Larix *L.* (europaea *D.C.*) | — | 5-10 |
| — leiophylla *Schiede & Deppe* | — | 10 |
| — maritima *Mill.* (1jähr.) . | — | 5 |
| Fr.— nigra *Ait.* (Picea) . | — | 10 |
| — Nordmanniana *Stev.* (Abies) | — | 20 |
| — oocarpa *Schiede* (Ocote *Loud.*) | 1 | — |
| Fr. — Pallasiana *Lamb.* (2jähr.) | — | 5 |
| Fr. — Picea *D. Don.* (2jähr.) | — | 5 |
| Fr. — Pichta *Fisch.* (Abies sibirica *Lindl.* 2jähr.) . | — | 10 |
| Fr. — Pindrow Royle (Taxus Lambertiana *Wall.*) . | — | 10 |
| — Pinea *L.* . . . . *f.* | — | 10 |
| Fr. — Pinsapo *Bois.* (Abies) 2jähr. Samenpfl. . . | — | 15 |
| Fr. — Pumilio *Haenke.* (echinata *Hrt.* montana *Baum.* Mughus *Scopol.* non *Jacq.*) 1—2jähr. . . | — | 5 |
| Fr. — rubra *Lamb.* . . | — | 5 |
| Fr. — Smithiana *Wall.* (Abies Morinda *Hort.*) . . | — | 10 |
| Fr. —Strobus *L.* (2jähr.) . . | — | 2 |
| Fr. — Sylvestris *L.* (Pinaster.) 2jähr. . . . . . | — | 2 |
| — tenuissima (1jähr.) . . | — | 10 |
| Fr. — Webbiana *Wall.* (Abies) | 1 | — |

Die nachstehenden Pinus sind eine durch Roezl in Mexico's höchsten Gebirgen gesammelte Collection. Bei der allgemeinen Aufmerksamkeit, welche man jetzt den Coniferen und ganz besonders diesen neuen Einführungen zuwendet, habe die bedeutenden Opfer nicht gescheut, mich in Besitz des vollständigen Sortiments zu setzen; alle diese Sämlinge werden in schon verpflanzten durchwinterten Exemplaren abgegeben. Um deren Ankauf zu erleichtern, sind dieselben auch unter die En-gros-Preise mit aufgenommen, und wolle man bei grösserem Bedarf dort nachschlagen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Pinus (Abies) hirtella *Roezl* . | — | 15 |
| — — religiosa *Lindl.* . . . | — | 20 |
| — Amexaensis *Roezl* . . | 1 | 15 |
| — angulata *Rzl.* . . . | 1 | — |
| — Antoiniana *Rzl.* . . | 1 | — |
| — apulcensis *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Boothiana *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Carrieri *Rzl.* . . . | 1 | — |
| — Chalmaensis . . . | — | 20 |
| — Comonfortii *Rzl.* . . | — | 15 |
| — corrugata *Rzl.* . . | 1 | 10 |
| — Decandolleana *Rzl.* | — | 20 |
| — dependens *Rzl.* . . | 1 | 10 |
| — Ehrenbergii *Endl.* . . | 1 | — |
| — Endlicherii longifolia *Rzl.* | 2 | — |
| — elegans *Rzl.* . . . | 1 | 10 |
| — fertilis *Rzl.* . . . | — | 15 |
| — filifolia *Lindl.* . . . | 1 | 10 |
| — frondosa *Rzl.* . . . | 1 | — |
| — gigantea *Rzl.* . . . | 1 | 10 |
| — Geitneri *Rzl.* . . . | 2 | 10 |
| — grandis *Rzl.* . . . | 1 | 10 |
| — Grenvillae *Rzl.* . . | 1 | 15 |
| — Haageana *Rzl.* . . | 1 | 10 |
| — Hendersoni *Rzl.* . | 1 | — |
| — horizontalis *Rzl.* . . | 2 | — |
| — Huisquilucensis *Rzl.* . | — | 25 |
| — heteromorpha *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Hoseriana *Rzl.* . . | 2 | — |
| — inflexa *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — interposita *Rzl.* . . | — | 15 |
| — Iztacihuatlii *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Iostii *Rzl.* . . . | 2 | — |
| — Kettleri *Rzl.* . . . | 2 | — |
| — Llaveana *Otto.* . . | — | 10 |
| — Leroyi *Rzl.* . . . . | — | 20 |
| — Lindleyi *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — macrophylla *Lindl.* . | 2 | — |
| — magnifica *Rzl.* . . | 2 | 15 |
| — monstrosa *Rzl.* . . | 2 | — |
| — Monte Allegri *Rzl.* . | 1 | — |
| — Mülleriana *Rzl.* . . | 1 | 10 |
| — Nec plus ultra *Rzl.* . | 1 | — |
| — Nesselrodiana *Rzl.* . | 1 | — |
| — Ocampii *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Paxtoni *Rzl.* . . | 1 | 10 |
| — patula *Schied. e. Dpp.* . | — | 25 |
| — prasina *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — Regeli *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — resinosa *Rzl.* . . . | 1 | — |
| — Rinzii *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — rubescens *Rzl.* . . | 1 | — |
| — Russeliana *Rzl.* . . | 1 | 15 |
| — Rohani *Rzl.* . . . | 1 | 15 |
| — rudis *Endl.* . . . | 1 | — |
| — robusta *Rzl.* . . . | — | 15 |
| — scoparia *Rzl.* . . | 1 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Pinus Soulangeana *Rzl.* | 1 | — |
| — — varietas *Rzl.* | 1 | — |
| — San Rafaeliana | 1 | — |
| — Standishii *Rzl.* | 1 | — |
| — subpatula *Rzl.* | 1 | — |
| — suffruticosa *Rzl.* | 1 | 25 |
| — Teocote *Deppe & Schm.* | 1 | — |
| — Thelemanni *Rzl.* | 1 | 15 |
| — Thibaudiana *Rzl.* | — | 15 |
| — Tomacocaensis *Rzl.* | 1 | 10 |
| — Trompoliana *Rzl.* | 1 | 15 |
| — Troubetzkoyana *Rzl.* | 2 | — |
| — tumida *Rzl.* | 3 | — |
| — Vallida *Rzl.* | — | 15 |
| — Van Geerti (Unthumber landiana *Rzl.*) | 1 | 10 |
| — Verschaffeltii *Rzl.* | — | 25 |
| — Villmoriniana *Rzl.* | 1 | — |
| — verucosa *Rzl.* | 1 | — |
| — Zamoraensis *Rzl.* | 1 | 15 |
| Podocarpus acicularis *Hort.* | 1 | — |
| — andina | 1 | — |
| — antartica | 1 | — |
| — Biddwillii *Hoinb.* | 1 | — |
| — canaliculata *Hort. Bogn.* | 2 | — |
| — chilensis *Hort* | 1 | — |
| — chinensis *Walt.* | 10 | — |
| — Corayana *Sieb.* (P. Koraiana) | — | 20 |
| — ferruginea *Din.* | — | 15 |
| — lanceolata | — | 10 |
| — latifolia *Wall.* | 1 | — |
| — longifolia var. Mackii *Sieb.* (Mackoyi *Hort.*) | 2 | — |
| — macrophylla *Don.* | | |
| — (longifolia *Hort.*) | — | 20 |
| — neriifolia *R. Br.* (macrophylla *Wall.*) | 1 | — |
| — nucifer *P.* (Taxus nucifera *Kaempf.*) | — | 20 |
| — pungens *Hort.* (Totara) | — | 10 |
| — Purdieana? | 1 | — |
| — spicata *R.Br.* (Dacrydium *May. Cunn.*) | — | 15 |
| — spinulosa *R.Br.* (P. pungens *Cally.*) | — | 25 |
| — Thunbergiana *Hook.* (latifolia) | 1 | — |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Podocarpus zamiaefolius *Rich.* | 1 | — |
| Retinospora squarrosa *Sieb. & Zuc.* (Chamaecyp. *Endl.*) | — | 25 |
| Saxe-Gothaea conspicua | $\frac{1}{8}$-1 | — |
| — excelsa | — | 18 |
| — gracilis | — | 20 |
| Fr. Taxodium distichum *L.* | — | 7 |
| — excelsum *Hort.* | — | 20 |
| — sempervirens *Lmb.* | — | 20 |
| Taxus baccata *L. v.* elegantissimo varieg. | 2 | — |
| Fr. — — *L.* 2jähr. | — | 5 |
| Fr. — canadensis *W.* | — | 10 |
| — — imperialis | — | 5 |
| — — erecta pyramidalis *Hrt.* | — | 8 |
| — — monstrosa | — | 8 |
| — — recurvata | — | 8 |
| Fr. — — fol. var. *Hort.* *f.* | — | 20 |
| — — var. ericoides | 1 | — |
| — — — fastigiata *Lindl.* (T. hybernica *Hook.* pyramidalis *Hort.*) | — | 10 |
| — Dovastonii (umbraculifera) | — | 10 |
| — Sieboldi | — | 10 |
| Thuja compacta *Hort.* | — | 10 |
| — excelsa *Benj.* (Cupressus americana *Trautv.*) | — | 20 |
| Fr. — fol. arg. var. | — | 10 |
| — L'Haveana | — | 10 |
| Fr. — occidentalis *L.* *f.* | $\frac{1}{2}$-4 | — |
| Fr. — plicata *Don.* (Warreana *H.*) | — | 10 |
| — — japonica | — | 10 |
| — Wallichii | — | 10 |
| Tsuga Lindleyana *Rzl.* 1jähr. | 1 | 15 |
| Fr. Wellingtonia gigantea *Ldl.* (Sequoia gigantea *Endl.*) Samenpflanzen | 2-4 | — |
| Widdringtonia juniperoides *Endl.* (Pachylepis *Brogn.* Cupr. thujoides *Hrt.*) | — | 20 |
| — Wallichii *Endl.* (Taxodium Horsfalliae *Hort.*) | — | 25 |

# V. Fuchsia.

Species à 5 Ngr.

1 corymbiflora *R. Br.*
89 Domyniana.
2 fulgens *Morr. Less.*
98 reflexa.
5 serratifolia *R. P.*
7 splendens *Zucc.*

Hybriden à 3 Ngr.
Kelch und Corolle roth und rosa.

39 admirable,
41 Albina.
42 Ambroise.
44 Atkinsonii.
46 Auguste Kares.
47 Beauty of Chelmsford.
49 — of Devonshire.
50 Bride.
10 Cassandra.
54 Duchesse of Lancaster.
57 Elisabeth.
58 Emilie Miellez.
60 Faire Rosamunde.
62 flavescens,
4 fulgens Hartmanni.
63 Gay lad.
19 General Changarnier.
69 Graf zur Lippe.
25 magnifica.
27 Mlle. Cardoville.
26 Miss Frey.
31 Nonpareil,
81 Perfection.
82 Pius IX.
33 Princesse Alice.
35 Rosa Gerlach.
36 serratifolia multiflora.
91 Tom.
92 Van Dyck.
94 Vauban.

mit weissem Kelch und Sepalen.

16 Duchesse of Montpens.

20 General Oudinot.
21 globosa alba grandiflora.
67 — perfecta.
23 Kossuth.
28 Minerva superba.
29 Napoleon.
87 Sir J. Paxton.
37 Venus victrix.

## mit violetter Corolle.

43 Aspasia.
13 delicata.
59 Emperor.
66 Globe perfection.
72 inaccessible.
77 Mazeppa extra.
99 microphylla.
83 Prémice.
86 Scarletina reflexa.
93 variegata superba (foliis varieg.)
95 Verrio.
96 Victor Hugo.
140 Koskiusko.

## mit weisser Corolle à 5 Ngr.

103 Miss Story.
100 Queen Victoria.
104 Snowtrop.

## Neue à 5 Ngr.

40 Agnes pl.
118 Albert Smith. *Banks.*
111 Alma *Dender.*
126 Artiste. *Lalasse.*
154 bellidiflora pl. *Dubus.*
127 Beranger.
119 Catharina Hayes *B.*
130 Cedo-nulli *Pond.*
131 Charl. Gambault *Den.*
120 Coeur de Lion *B.*
156 Commandeur *Borcher.*
129 Crinoline *S. & N.*
157 coronata fl. pl. *Dubus.*
133 Daniel Lambert *Lee.*
134 Diamant *Hook.*
6 Esmeralda *Millez.*
121 Etoile du Nord *B.*
61 Fantôme pl.
115 Figaro.
136 flavescens superba *Miellez.*
137 F. W. Devalié
158 Globosa plenissima *Coene.*
159 gloire de Russelheim *Koch.*
117 Grand Sultan mit violetter Corolle.
160 Gustav Adolph pl.
161 Hendersoni pl.
139 Imperialis pl. *Demous.*
141 Lamartine *Lemoine.*
18 leucantha *Wright.*
176 Lina v. Mainz *Mardner.*
122 Little Bo-Peep. *B.*
162 Mme. Koch *K.*
142 Marchioness *Smith.*
163 Mss. Bayii *Ponds.*
85 Mrs. Jules Bazille *Chv.*
173 Miss Simpson.
164 monstrosa plenisiss.
165 multiplex pl.
166 Novelty pl.
108 Omer Pascha *Banks.*
106 Paul et Virginie.
167 Paxton.
143 Präsident J. Baumann, *Bernis.*
144 — Magdeburg, *Koch.*
110 Prince Albert *Banks.*
3 Princessin v. Preussen, *Dent.*
45 pyramidalis multiflora *Dent.*
11 Queen of Hannover *Banks.*
107 Rafaëlo, gestreift.
145 ranunculiflora fl. pl. *Smith.*
146 reflexa pl. *Lem.*
31 refulgens *Gaynes.*
113 revoluta.
147 Roi des blanc *Dubys.*
168 Rosalba *Coene,*
169 Royale Victoire *Ponds.*
148 Saturnalis *Krtsch.*
174 Silverswan.
171 Sir Joseph Paxton.
149 Star of the night *Banks.*
150 Streifling von Rüsselheim.
123 Souvenir de Chiswik. *Banks.*
124 The Fair Oriana *B.*
175 Thyrsus albus.
125 Tristram Shandy *B.*
112 Urania *Dend.*
114 Venus de Medici.
109 violaeflora plena
151 Vulcain *Banks.*
152 W. Mueller.

## Neuere à $7^1/_2$ Ngr.

Diese Collection enthält das Neueste deutscher und französischer Züchtung; ein grosser Theil derselben sind die jetzt so sehr gesuchten gefüllten mit gef. oder ff. pl. bezeichnet.

180 Auguste Renoult R. gef.
194 August Gewaert gef.
195 Comte de Medicis Spada, *Lemoine.* gef.
196 Cruciata fl. pl. *Dubus.*
198 Deutsch. Meister *Koch.*
197 Dianthifl. pl. *Demouv.*
211 Diogène *Corw.* gef.
194 Doct. Wollbrück *Meet.*
190 Don Quixote *L'Huill.*
177 Drovallius.
199 Duc de Brabant *Cornel.* gefüllt.
2'2 — de Norfolk *C.* gef.
200 — de Trevise *C.* gef.
214 Edm. Tantes *Corn.* gf.
188 Géant de bataille. *Durue.*
201 Général Dammau *Corn.*
184 Gloire de ville d'Abray. *Durue.*
185 la comète *Schneegans.*
187 la fée du Rhin *Schnees.*
203 Leonardo da Vinci *Lém.* gef.
202 Leopold I. *C.* gef.
189 Meldensis fl. pl.
204 Miracle *Desm.* gef.
182 monstrosa pl. *Lem.*
205 Pierre le grand *Corn.* gef.
213 Prince de Thurn et Taxis gef.
179 Princesse Eugenie.
178 — of Prussia *Daniel.*
209 Prinzessin Friedrich Wilhelm *Dender* gef.
210 Prinz Ghyka *Corn.* gef.
181 Schöne Meklenburgerin
206 Sir Collin Campbell *Wehler* gef.
207 Sire de Crequi *Corn.* gef.
193 striata elegantissima *Bern.*
186 — pl. *Bern.*
208 Superint. Schmidt gef.
192 Vercingetorix *Lem.*
183 Washington *Lem.*

## Neueste.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| 216 Abd-ul-Medjid *Boas.* | — | 10 |
| 217 Adèle Olin *Corneliss,* Coroll. gross & lang, carm. & dklbl. Sepal. scharl. m. gr. Spitzen Corolle breit, dunkelpurpur mit blau schattirt, gefüllt | — | 10 |
| 218 Cheiranthiflora pl. *Duby.* | — | 7 |
| 255 Colibri *Lem.* Bl. mttgr. Cor. kgl. purp. 1, amaranthrt, übg. | — | 10 |
| 219 Conqueror *Rollis.* | 20 | — |
| 253 Crown juwel *Banks.* | — | 8 |
| 220 Delphine Parent *Cornel.* Cor. s. br. viol. bl. m. hllrt. Schim. Kelch & d. zurückgeb. Sepal. dklermrth., gef. | — | 10 |
| 260 Eclat *Sm.* | — | 8 |
| 222 Elegant *Roll.* | — | 10 |
| 221 Elegantissima *Sm.* Sep. brt. zurückgeb. u. scharlachr. Cor. violettp. rd. & br. $1^1/_2$" Durchm. | — | 10 |

| Nr. | Sorte | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 245 | Fascination *Sm.* . . . | — | 8 |
| 223 | Favonia *Wh.* . . . . | — | 10 |
| 225 | Garibaldi *Cr.* Sep. sch. zur. geb. brill. carmr. Coroll. gef. schwrzbl. gefüllt . . | — | 10 |
| 215 | General Drauf . . . | — | 8 |
| 224 | Gentil Bernard *Desm.* Bl. gr. Sep. rws. sch. zrckgeb. Cr. rsa. | — | 10 |
| 240 | Gloire de Neisse . . . | — | 8 |
| 259 | Golden Plower *Sm.* . | — | 8 |
| 226 | Henry Olin *Cornel.* Bl. gr. Cor. rws. s. lang m. wen. rth. Ad. Sep. carm. u. zrckgebog. | — | 15 |
| 227 | Humboldt *Y.* . . . . | — | 10 |
| 241 | Joseph Baudry gef. . | — | 10 |
| 228 | Lacordaire *Dub.* rchbl. Cor. Kelch & die schön zurückgeb. Sep. prächtig amarroth. . | — | 10 |
| 102 | Lady of the lake, wss. Cor. | — | 7 |
| 252 | La Crinoline *Lée.* Cor. br. & carmviol. Sep. glänz. carmrth. und zurückgelegt . . | — | 10 |
| 248 | le prophète *Bks.* . . . | — | 8 |
| 231 | Leviathan *Roll.* prächt. Cor. dklprp. s. gr. u. b. Sep. car. brt. u. völl. zurückgeb. | — | 10 |
| 229 | Lord of the Isles *Wh.* gef. | — | 20 |
| 242 | — Clyde *W. & S.* . | — | 10 |
| 246 | — — *Youell.* . . . | — | 8 |
| 256 | Magenta *Lem.* Cor. blauviol. Sep. crm. u. wagr. zurücksteh. gef. . . . . | — | 10 |
| 232 | Maréchal Mac Mahon *C. K.* u. d. zrckgb. Sep. leucht. crm. scharl. Cor. s. voll. u. veilchenblau gef. . . | — | 10 |
| 232 | Mme. Cornelissen *C.* Bl. gr. Cor. rws. s. lang. m. wen. rth. Ad. Sep. crmr. u. zurückg. gef. . . . . | — | 10 |
| 233 | Marquis of Bath. *Wh.* gef. | — | 10 |
| 234 | Marvellous *Roll.* gef. v. d. schönst. ge. Var. Sep. feur. carm. Cor. schwzviol. . | — | 10 |
| 250 | Magic flute *Bks.* . . . | — | 8 |
| 244 | Malakoff . . . . . | — | 15 |
| 235 | Mr. le Comte *L'Huill.* . | — | 10 |
| 058 | Norma *Duby.* . . . . | — | 8 |
| 240 | Prinz Eduard *Erb.* gef. | — | 10 |
| 238 | Prince of Orange *Banks.* | — | 20 |
| 236 | Pyrethriflora pl. *Desm.* Cor. viol. Kelch. und Sep. hellorange. Neues Color. gef. | — | 10 |
| 239 | Schiller *Banks.* . . . | — | 10 |
| 237 | Solferino *Sm.* . . . . | — | 10 |
| 254 | Souvenir de Montebello | — | 10 |
| 243 | Star fl. pl. *Stowe* . . | — | 7 |
| 249 | Therpsichore *Lem.* Cor. br. u. lillars. Sep. zurückgeb. u. carminr. . . . . . | — | 12 |
| 247 | Victoire de Marignan *S. & N.* mittelgr. Kelch und Sep. hortensienrth. mit gr. Spitz. Cor. violettroth. . . . | — | 10 |
| 251 | Wiltshire Lass. . . . | — | 8 |

# VI. Georginen.

Nach Farben eingetheilt.

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — was sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen I. Grades und kosten mit Ausnahme der Nummern 273—278 à Stück 5 Ngr.

## Neueste Sickmann'sche Züchtung.

Derselbe Züchter, welcher uns die unübertreffliche „Deutsche Sonne" bot, übergiebt wieder 5 seiner neuesten und wie er sagt gelungensten Züchtungen dem Handel. — Vom Beginn des Mai, offerire kräftige Stecklinge, die sicher noch im Sommer blühen werden, à 3 Thlr. alle Sorten zusammen für 12 Thlr.

274 Deutscher Grossmeister *Sickm.* brill. kpfrscharl. gr. Prachtbl. 5 Fuss.
275. Teutonia *Sickm.* zart blassisabellenrosa, später dunkel werdend und hierauf lilarosa, gross und reichbl. 5 Fuss.
276 Kleiner Hermann *Sickm.* blasskrschr. m. w. Spitz. s. rchbl. echt. Lilipt. 4 Fss.
277 Wacht am Rhein *Sickm.* schwarzbr. Grund in dklfeuercarmoisin übergehend, m. leucht. hellviolet carm. nach aussen lillablauem, oft fast weiss gesäumten Rande. Unstreitig die prachtvollste aller bis jetzt erz. Georg. 4 Fuss.
278 striata germanica *Sickm.* carminviolett, rosa & carmoisin, sowie grünlich canariengelb und blasspaille gegenseitig gestreift, bandirt und gespritzt. Die bunteste bei neuester schönster Rosenform. 4 Fuss.

### Rein weiss.

62 alba eximia.
268 Antagonist *Braggs.* rein weiss.
2 Kant *D.* übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
8 Prinzessin Alexandrina *Bretschn.* schneeweiss.
4 Ulrike Gräfin v. Klebelsberg *Deegen.* rein weiss, sehr schön.

## Weiss und bandirt.

5 Amalie Winter *D.* mit purpur übertuscht.
169 Falk *D.* weiss mit violetten Rändern und Spitzen.
171 Fräulein Demidoff *Deegen,* milchw. mit rosa Anhauch, Rosenform, Prachtbl.
213 Gärtnerbraut *S.* Grund weiss, rosa mit sammtig dklcarm. Spitzen, prächtig.
14 Madame v. Geert *Sickm.*, mit dunkel lila rosa.
16 Meyerbeer *D.* blass hautfarben.
17 Miss Vysi *Turner,* weiss mit violettblauen Spitzen.
18 Monseigneur Picy, mit rosa Schein.
120 Picotée *Bateur,* weiss mit lila purpur violett punkt.
76 Princesse Alice, milchweiss mit gelbem Schein.
121 Psyche *Voisinon.* weiss mit rosa.
22 Staar *Bragge,* milchweiss mit rosapurpur geflammt.
43 Thecla Steinbart *S.* milchweiss mit violett Spitzen und weissen Saum.

## Gelb.

24 Cleopatra *Attwell.* rein schwefelgelb.
51 Duchesse of St. Alban, hellcitrongelb.
39 Eldorado, *Salter,* zeisiggelb extra schön.
26 Ferdinand I. *D.* leuchtend citrongelb.
70 Johannes v. Müller, *Deeg.*, brillant ochergelb extra.
27 Klopstock, *D.*, prachtvoll citrongelb extra.
28 Königin vom Elsterthal, *S.* köstlich schwefelgelb,
9 Louis Napoleon, *Br.*, prächtig citronengelb.
29 Première de Voisenon, dunkel isabellfarbig.

## Gelb mit bunter Färbung.

3 Alzire *Grenier,* dklgelb. m. bräunlichroth auch zuweilen w. Spitz. grossbl.
84 Anacreon. *Dubras,* goldgelb mit rothen Spitzen,
65 Anna Schemel, *S.* strohgelb mit carmin Rand.
87 Brillante v. Elsterthal, *S.* glz. goldg. m. schrl. u. ponp. schtt. gtscht. s. bunt.
33 Bunter Arras. *S.* blassgelb. m. hell u. dunkel carm. Rand und Spitz.
35 Charlemange, *Def.* goldfarbig mit bräunlich scharlach.
103 Comtesse Marie v. Ziethen. *B.* goldocher, m. amarrth. gefl. u. gelb. Saum.
36 Deutsche Blondine, *R.* blassschwefelgelb nach aussen atlasweiss,
179 Deutsche Glorie, gelb mit weissen Spitzen.
37 Deutscher Phidias, *S.* blassgelb m. blutroth, rosa u. scharlach.
38 Erbgrossherzog v. Oldenburg, *Brtschn.* brill. schwflglb. bisw. m. rth. Knospe.
112 Eulert. *Deegen,* schwefelgelb und weisse Spitzen.
113 Elise Miellez *Deeg,* leuchtend citrongelb mit weissen Spitzen constant schön.
40 General Sir Robert Sale *Smith.* blassgelb mit purpurnen Spitzen.
122 Goldfasan *S.* dunkelgelb mit fein carmoisin getuscht gut.
134 Hahnemann *Deeg.* prächtig goldgelb mit rothen Adern und carm, Spitzen,
13 Hufeland *D.* ocher mit scharlachrothen Spitzen prächtig.
180 Jean Paul *D.* blassgelb mit schön carmoisinrothen Rändern.
45 Liebliche vom Elsterthal *D.* hellschwefelgelb m. weissen Spitzen.
46 Luna *Devoty,* canariengelb mit weissen Spitzen.
47 Madame de Puiseguir *Lenorme.* dottergelb mit violetten Spitzen.
48 Musaeus *D.* prächtig goldgelb mit rothgeflammten Spitzen.
51 Phytagoras *Santin,* goldfarbig mit carmoisin geflammt.
53 Schelling *D.* bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.
182 Stern von Meidling. schwefelgelb mit dunkeln Knospen.

## Braune, und braun mit Abzeichnungen.

181 Adonis, dunkel chomois mit braun und weissen Spitzen.
54 Asmodeus *Davies,* braunviolett.
55 Bathonica *Drummond,* dunkelbraun violett.
183 Bauduin* bräunlich blutroth.
114 Bischof Ademar von Boy *Reichard,* dunkelsammetschwarzbraun.
56 Deutsche Kunst *S.* goldbr. mit lila carm. prachtv. gez. und Färb.
57 — Marmorrose. prächt. dklamar. a. schwzbr. Gd. m. crm. marm. u. gefl.
58 Deutscher Ordensstern *S.* amarbrn. m. glzd. w. Sp. Prachtbl. u. gz. const.
145 Die Mulattin *Deeg.* braunschwarz gut.
60 General Faucher *Rose.* röthlich rostfarben mit achat Rändern.
59 Heinrich v. Gagern *Mardn.* dklbraun mit weissen Spitzen schön,
61 Hauptmann Schmidt, schwarzbraun mit purpurcarmin.
218 Klein *D.* schwarzbraun.
66 L'Africain *Bachelier,* schwarzmahagonibraun schön.

64 Obergärtner Stelling *D.* schwarzbraun mit purpur Rand.
67 Rival Phidias *Batteur*, braunroth mit goldgelb gestreift.
68 Roi de Pontes *Batteur*, schwarzbraun mit weissen Spitzen.
186 Sussex Hèro *Mitsch.* sammetartig schwarz mit carmoisin Rand.
69 Toussaint. Louverture *Fauvels.* fast schwarz extra.
245 Wunder v. Köstriz, ldrfrb. Gr. m. h. u. dk. krschbr. pfirsrs. bnd. gstr. gspr. slt. Frb.

## Blut- und granathroth.

71 Beständige von Köstritz *D.* blutroth mit reinweissen Spitzen.
187 Etendard cramoisi *Salter*, blutroth mit carmoisin Schein.
73 Eugen Heerdegen *S.* zinnober mit carm. und gelb gespitzt.
72 Fräulein *Mönch*, purpurlila.
77 Non plus ultra *Gayne*, hellbluthroth mit weissen Strichen.
78 Pfarrfrau von Gablenz *Kretschmar*, blutroth mit Mittelstreifen und Spitzen.

## Purpur- und carmoisinrothe.

75 Auguste Bretschneider *Br.* violett carmoisin m. weissen Spitzen schön.
70 A. Keilholz, dunkei carmoisin.
80 Artevelde *Paris*, purpur carmoisin mit kirschroth und weissen Spitzen.
81 Alexander v. Humboldt *Pracht.* dunkel purp. violett m. veilchenbl. Schn. pracht.
82 Beewing *Drummond*. carmoisin.
85 Edle von Meidling *Dewoty* amarantpurpur. grosse Prachtblume.
86 Forget me not *Girling*, dunkelcarmin mit rein weissen Spitzen.
87 Freund Winter *S.* schwarz kirschroth purp. mit violett gez. u. gefleckt.
76 Herder *Deegen*, dunkelbraunpurpur mit lichtpurpur Spitzen.
243 Hoffnungsstern leuchtend dunkel carmoisin,
99 Langer Peter von Itzehoe, dunkel mordorè carmoisin, prächtig.
188 Maximilian Nisson, carmoisin mit hellen Streifen.
210 Neuer Planet, blassscharlach carmoisin mit goldgelb. Rand vielbl.
91 Parthenope *Rinz*, rothviolet carmoisin, prächtig.
5 Proteus *Deeg.* purpur mit weiss. Herz und weiss, Strichen s. schön.
140 Ritter von Morosoff *S.* dklcarmoisin mit gelb. Saum und rothen Streifen.
93 Triumph v. Köstritz *S.* carm. auf dunkelgrau orange mit goldfarb. Spitzen.
94 Schiller *D.* schön violett mit reichen weissen Spitzen, Prachtblume.
95 Wunder von Tattendorf *Girand*, carmin mit lichten Rand.
172 Zollrath Brescius *Br.* schönstes carmoisinrosa, Prachtblume.
277 Wacht am Rhein *Sickm.* schwarzbr. Grund in dklfeuercarmoisin übergehend. m. leucht. hellviolett carm. nach Aussen lilablauem, oft fast weiss gesäumtem Rande. Unstreitig die prachtvollste aller bis jetzt erz. Georg. 4 Fuss

## Violett-veilchenblau und lila.

173 Albrecht Thaer, *D.*, köstlich violett gross und schön,
175 Arminius, *S.*, prächtig hellpurpurviolett extra.
192 Bourbonrose, zart lila mit carmin,
99 Deutsche Perle, köstlich silberlila mit weissem Rand, Prachtblume.
100 Edle vom Elsterthal, *S.*, prächtig lila mit weissen Spitzen.
194 Friedrich von Schiller, *D.*, violett mit rein weissen Spitzen.
101 Fürst von Thurn und Taxis, *S.*, prächtig rein lila.
102 Geheimnissvolle, *S.*, dkl. amar. viol. m. krschr. u. schwbr. Strf. u. Strich. inter. Färb.
185 Haydn, *D.*, blasslila mit dkl. Rändern, sehr schön.
195 Hagedorn, *Funkes*, schön lila Prachtblume.
104 Hofgärtner Bettzig, *S.*, prächtig dunkel lila.
108 Magnificent, *Keynes*, violett mit rosa.
189 Metalloides, *Rinz*, hellstahlblau mit dunkler Rückseite.
109 Oeillet Pentagruel, violettrosa mit carmoisin bordirt und gestreift.
110 Pauline Voldauer, *Dewoty*, schön veilchenblau.
190 Queen of Beauty, *Drum.*, schön veilchenblau.
191 Reussenstern, *S.*, dklpurpur violett mit weissen Spitzen, schön.
278 striata germanica, *Sickm.*, carminviolett, rosa & carmoisin, sowie grünlich canariengelb und blasspaille gegenseitig gestreift, bandirt und gespritzt. Die bunteste bei neuester und schönster Rosenform. 4 Fuss.

## Aurora-, orange-, lachs-, ziegel- und isabellfarbig.

197 Belisario, chamois. mit rother Rückseite.
205 Baron v. Stillfried, *S.*, hellorange, scharlach prächtig.
203 Columbine, *Miellez*, orange mit rein weissen Spitzen.
115 Deutscher Feuerstern, *S.*, leuchtend hellzinnober.
119 Die Leuchtende, feurig orangescharlach.

198 Duc of Wellington, *Drummond.* brill. orange. extra schön.
207 Fidelio, *S.*, amarant mit blassgelb. Spitze und Rand schön.
123 Gestreifte v. Elsterthal, *S.*, dunkelnanquinorange m. scharl. band. u. gestr.
124 Incomparabilis, *Smith*, grau ocher mit blaulila Rückseite.
106 Josephine Flamand, goldorange mit rothen Rändern.
125 Lady Paxton, *Turville*, bernsteinorange mit weissen Spitzen.
226 Liebesblick, *S.*, goldig isabellf. m. dklcarmoisin. Spitze extra.
126 Louis van Houtte, *D.*, hell nanquin mit incarnat.
200 Marie Wenk, feurig lachsroth. prachtvoll.
211 Maximilian Nisson, *S.*, isabellenfarbig mit rosa Spitze gut.
127 Mignon, *Paris*, aurora mit orange, Prachtblume.
128 Morgenröthe, *S.*. cochenille in lachsrosa übergehend.
201 Pfarrer Winghofer, *S.* dunkelrostfarb. u. lachsroth mit blasspeille Spitzen.
130 Triomph de Meaux, *Quetier*, orange mit lachsroth.
202 Uhland, *D.*, ocher mit schwach rosa geflammten Spitzen.
216 Uranus, *Salt.*, orange dunkler schattirt gut.
131 Zschokke, *D.*, grauroth mit weissen Mittelstreifen und Spitzen.

## Mennigroth und scharlach.

274 Deutscher Grossmeister, *Sickm.*, brill. kpfrscharl. gr. Prachtbl. 5 Fuss.
204 Deutsches Feuer, *Sickm.*, glänzend scharlach prachtvoll.
135 Diaconus Martini, carmoisinscharlach.
136 Freund Carl Oosterschild, scharlachzinnober.
137 Glanz vom Elsterthal, *S.*, leuchtend scharlachzinnober, Prachtblume.
138 Glühende Kohle, *S.*, lebhaft scharlach in orange übergehend.
139 Grossfürst Michael Nicolajewitsch, *S.*, dunkelcochenillen scharlach, Prachtbl.
141 Leuchtende von Köstritz, *S.*, hell scharlach abwechselnd gelblich weiss. Sp.
142 Leuchtkugel von Köstritz, *S.*, leuchtend scharlach prächtig.
221 Molière, *de Resignier*, scharlach mit weissen Spitzen, schön.
145 Prunk v. Elsterthal, *R.*, zinnoberroth mit wss. Spitzen schön.
269 Pastor Kretschmann, eisenroth und blassroth Bienenzellenbau.
146 Perle v. Daadem, *Berling*, prächtig scharlachzinnober,

## Carmin-, rosa- und pfirsichroth.

147 Arabella, blassrosa mit violetten Spitzen.
224 Aeneas, *Dewoty*, bräunlich scharlach extra schön.
227 Amorette, *S.* carmin auf orange Grund mit rothen Streifen sehr schön.
148 Basquine, *Poulet*, brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
83 Claudius, *D.*, bleirosa mit dunkelrosa geflammt und weissem Saum.
229 Deutsche Dame, *S.*, dunkellilarosa, Prachtblume.
230 — Würde, S., dunkelcochen. in hllcrm. übergeh. m. w. Spitz. Prachtbl.
231 Friedrich Adolph Heinzelmann, *S.*, prächtig rosa lila m. w. Spitz. schön.
88 Freund Kirchner, *S.*, lchsrs. a. hllglb. Grd. m. hll.- u. dklcrm. gestr. u. band. ext.
152 Favorite, *Batteur*, centifolienrosa mit silbernem Schein.
153 Freiherr v. Biedenfeld, schönst. crmrs. auf cochen. Gr. dopp. gef. Prachtbl.
155 Fürstin Lieven, *S.*. zart pfirsichroth lila mit rosa Spitzen prachtvoll.
156 Heinrich Behrens, *S.*, prachtvoll carmin mit cochenille.
121 Karschim, *D.*, rosa mit dunkler Spitze.
225 Kleine Rosenbraut, *S.*, blassrosa und dunkl. Rand.
160 Majorenne, *Mardner*, rosa im Herz weiss.
161 Marchionesse of Cornwallis, zart rs. m. weiss.
232 Mme. Thomann, *Miellez*, blassrosa mit carm. Spitzen.
162 Mstr. Clay, dunkel carmin mit weissen Spitzen.
129 Pfarrer Kronenberger, *S.*, rosa chamois.
275 Teutonia, *S.*, zart blassisabellenrosa, später dunkel werdend und hierauf lilarosa, gross und reichblühend. 5 Fuss,
233 Ruhm v. Elsterthal, *S.*, carmin violett mit weissen Spitzen, extra Muster.
247 Silberkönigin, *K.* lila mit silberweiss.

## Liliputen, à 10 Ngr.

42 Amarantrös'chen, amarantroth.
7 Citronvogel, *S.*, feurig rein citrongelb.
251 Colibri, dklisabellfarb. mit brünet, purp. crm. Spitz. glb. Sm. brnl. Rücks.
250 Damenschmuck, blassrosa mit carmin gespitzt.
41 Deutsches Zauberrös'chen, *S.*, dklpfirsichr. u. hellviolett m. schwarzbr. band.
263 Eugenie, blassrosa mit weiss. Spitzen sehr blumreich.
150 Feenschmuck, *D.*, silberlila mit weissen Spitzen.
212 Kleine Citronenzelle, *S.*, prächtig citronengelb.
276 Kleiner Hermann, *S*, blasskirschr, m. w. Spitz. s. rchbl, echt Liliput. 4 Fuss.

3 Kleiner Philipp, dunkelpurpurviolett,
272 Liebesblick, *S.*, goldig, isab. m. dkl. carm. Spitzen.
270 Liliputmohr, *S.*, schön dkl. amarantschwarzbraun vielbl.
167 Pfirsichrös'chen, *S.*, dunkelpfirsichroth.
127 Treurös'chen, *St.*, zart rosa mit dunkeln Spitzen.

Neue, à 10 Ngr.

267 Bravo.
258 Buckingham.
71 Carl Hederich.
57 Director Ziegler.
255 Fanferluche.
266 Feuergarbe.
274 Georg Heidenreich.
256 Galatée.
261 La candeur.
265 — Ristori.
262 Paquitta.
259 Polychinel.

# VII. Pelargonien.

## Englische grossblumige à 5 Ngr.

1 Adèle *Foster*.
3 Apollo.
26 augustissimum.
17 — fastuosum.
58 Berne *Trimmer*.
82 Clarissa *Garth*.
10 Eliza superba *Foster*.
75 Floridum.
46 Fräul. Bachmann.
24 Lady Nikesdale.
26 Masterpice *Gaines*.
71 Oberon *Hodjes*.
30 Orange perfection *Gain*.
72 Paterot.
33 Pride of Surrey.
34 Princesse Royale.
35 pungens.
74 Rameau *H. Par.*
36 Rosette *Foster*.
76 Talisman *Demag*.
39 Van Ambourgh. *Wils*.
40 Victoria *Grah*.
79 Vulcain *Foster*.

## Odier's 5fleckige, à 15 Ngr.

80 Aurelia Duval.
81 Auguste Miellez.
82 Colonel.
83 Excelsior.
84 Eugene Scribe.
85 Gèant de Batailles.
6 Guillaume Severeigne.
87 La belle Alliance.
88 La Vestale.
89 Lord Raglan.
90 Mad. Lemichez.
91 — Place.
92 Moricaud.
93 Napoleon III.
94 General Cavaignac.
95 Pescatorei.
96 Perugino.
97 Triomphe de la Tour,
98 Vesper.

## Neueste Odier's 5fleckige, à 20 Ngr.

99 Alphée *Henry Dumay*, zt. rs., leucht. crm. gead., die 5 Pet. stk. schw. gefl. sehr schön.
100 Apollon *H. D.*, lachsfarb., das gr. Centrum wss., die 5 Pet. fast zckgeschl. m. gr. schw. Flecken.
101 Assur *Chauvière*, Bl. gr. lila, die ob. Pet. schw. m. prpcrm. gefl,, die unt, leicht schw. u. crm. gefl.
102 Comte de Comer. *Bongier Chauv.*, Bl. s. gr., die ob. Pet. leucht. crm., m. schw. Fleck., die unt. kschrth. m. kastanbr. Fleck.
103 Diamant *Miellez.*, rs. orang. m. frth. u. rein wss. gem., 5 schw. Flck. prcht
104 Eduard Henderson *M.* carmois. m. dkl. kastanienbr., schwarz. Fl.
105 Excelsior *Turner.*, rs. die ob. Pet. kastanienbr., die unt. prpr. gefl.
106 Général Auger *Lemoine.*, crm. m. wss. Cent., die 5 Pet. schwbr. gefl.
107 Impératrice Eugenie *Duval.*, rein weiss, die Petalen sind dunkelviolett gefl.
108 Inkermann *Duval.*, die ob. Pet. sind dkl. kastanbr., die unt. crm. u. schw. gefl.
109 Ieanne d'Arc. *M.*, weiss mit rosa, 5 dunkelcarmine Flecken.
110 Iung-Bahadoor *Turn.*, die ob. Pet. schwzl. prpr., d; unt. brau. m. schw. Fleck.
111 Linné *Roug.*, rosa, viol. gead., die 5 Pet. sind schwarzbr. gefl.
112 Mad. Humann *Robine.*, kschrth., die 5 Pet. sammt, dklbr. gefl. sehr schön.
113 Marie Joly *Lemoine*, Bl. s. gss., wellenf. flschf. mit 5 schwarz. Fleck.
114 Marguerite Clara *Roug Ch.*, Bl. s. gr., rs. lachsf, d. 5 Pet. kastbr. gefl. pcht.
115 M. de la Galliserie *Malet*, pr. orgf. die 5 Pet. sind schwarzbr. gefl. s. schön.
116 M Ivan. Schlumberger *Lem.* dklrs. m. crm. 5 sammtig schwarze Fl.
117 M. P. Mascrati *Lem.*, rs., m. 5 gross! schw. Flecken, sch. Form, prächt.
118 Norma *Carp.*, blasslila m. 5 Flecken, Grundfb. rein weiss, sehr schön.
119 Paul Veronée *M.*, d. ob. Pet. schwarz m. rs. Fl. d, unt. lila m. dklcrm. gefl.
120 Prince Ierôme *Duval.*, die ob. Pet, schw. und crm., die unt. dklkischroth. mit schwarzen Flecken.
121 Suffren *Mal.*, die ob. Pet. schw. u. crm., die unt, dklkschrth. m. schw. Fleck.
122 Victor Serru, *Chauv.* leucht. rosa, die 5 Petalen sind dunkelbr. gefl.

### Zonale Varietäten, à 5 Ngr.

181 Amé! d'Albancourt *Bah.*
182 Boule de feu.
183 — — neige *Malet.*
176 Charles Domage.
177 Cheiri chek.
51 Firebal.
184 Gloire de Plantier *B.*
62 Goliath.
63 Miss Arndt.
187. Mr. Louis Chaix *Ferr.*
54 Queen Victoria.
55 superbum *Fostef.*
188 Vesta *Krtzr.*
56 zonale fol. varieg.

### Neuere, à 10 Ngr.

252 Anna *Hock.*
254 Comtesse d'Autigné *Paulin.*
255 — de Chambord *R.*
256 Emile Carré *C.*
257 Etendart de Solferino.
189 Etoile Polaire *Lem.*
258 feu follet *Desm.*
225 Feuerkugel *D. Hock.*
245 Fürst Ernst *Walter.*
259 Gloire de Lyon *Liab.*
226 Guldfurts Beauty *Henr.*
227 Guttenberg *Hock.*
193 Henriette *Leb.*
228 Jungfrau *Hock.*
260 Le zouave *Lem.*
261 Little David *Henders.*
190 Louise Ettlinger *S.*
263 Magenta *Chard.*
230 Margarethe Hock, *H.*
264 Marqu. de St. Venaut *Lh.*
229 Max Leichtlin *S.*
262 Mlle. Marie Henry *R.*
265 Mr. Ch. Buquet *Mart.*
244 Pauline.

### Neue und neueste zonale buntblättrige, à 5 Ngr.

232 Alma.
233 Attraction *Gaynes.*
235 Bridol Bouqet.
239 Goldenchain.
241 Mr. Lennow.
253 Silverqueen.

### Pelargonien-Species.

| | Ngr. |
|---|---|
| alchemilloides *Ait.* . | 7 |
| graveolens *L'Herit.* (terebinthac. *Cav.*) | 5 |
| malvaefolium *Jcq.* . | 5 |
| odoratissimum *Ait.* | 5 |

## Neueste Scarlet-Pelargonien (Zonale) von 1861.

Franz Hock. *Wilhelm Betz.* Befrucht. v. Countess of Bective m. Goliath. Neue Färb., echt salmrth. gr. runde Bl. mit weiss. Auge, blaugr. Laub mit sch. dkl. Zone, in gross. Dold. s. dkb. blüh.

Joseph Wolf. *W. B.* Sehr schöne rd. rsfleischfarb. Bl. mit hell. Mitte, raschwachs. u. in gross. Dld. reichl. blüh.

Moguntia. *W. B.* Neue Färb., molkenkirschroth m. weiss. Auge, gr. Dld., hellgr. Laub mit lederf. Zone, Wuchs wie Feu de Malakoff, unstreitig der am unermüdl. blüh. bis jetzt mir bek. Scarlet, dab. s. drh., eine wh. Mktpfl.

Jacob Becker. *W. B.* Kreuz. v. Goliath m. Feu de Malakoff, dklorange m. w. Auge, etwas hell. als die ausgez. kglrd. geb. Dolde des Jupiter (Hock) in s. gr. Dld. reichl. blüh.

Georg Wolf. *W. B.* Säml. v. Charles Sternau & Paquitta blüh. ds. Art gss. Blumen und Dold. m. bläul. Schein, hält Sonne, wie Reg. gut aus ist wie Tresor des massifs. zu Gruppen sehr zu empfehlen.

Jacob Schmelz. *W. B.* Ziegelf., feur. als Flor, s. gr. gz. rd. Mustbl. m. w. Auge, geschloss. s. gr. Dld. m. hellgr. Laub u. leberfarb. Zone, u. wie die vorherg. Art d. feur. Färb. wegen zu Gruppen besond. pass.

Joseph Mardner. *W. B.* Färb. wie No. 2, blaugr. Laub mit s. dkl. Zone, Blstgl. kz. Wuchs beinahe Zwergform, ist diese anspr. Art der Belaub. u. dem fleiss. Blüh. weg. zur Topfkult. recht pass.

Chamaeleon, *W. B.* Säml. v. Charles Sternau, m. welchem ders. d. Wchs. u. die Belaub. gem. hat, in gröss. Dold. u. schärf. Roth d. ebenf. gröss. Bl. Diese Sorte bes. d. Eigenthüml., dass d. grüne Lb. sich v. Ende Aug. an m. gelb. Fl. u. sonst. marm. Zeichn. wie Farfugium grande, bdkt. um dies. Anf. Mai wied. z. verl. sei solche i. fr. Lde. od. Topf gzog., welche Erscheinung der Züchter diesen Herbst z. 3. Mal beobachtete.

Gretchen Fell, *W. B.* Stammt v. Rose de Bagatelle. Die Färb. hält d. Mitte v. Beauté de Franc & Beauté de Parterre, d. ob. 2 Blbl. m. stark. Kreidew. reine Zwergf. auf kurz. Stiel. in geschloss. Dold. wil'. blüh., ist dies besond. unt. Glas reizende Pflänzchen „ein recht lieb Ding".

Gabriel Vogler *W. B.* Zwergart & Färb. des bek. Tom Thumb, Lb. dasselbe. ebenf. s. reichbl., aber d. Vorzg. geg. d. Stammart besitz., in gr. geschloss, Dold. m. wss. Aug. zu bl., eine s. empfehlwth. Marktpflanze.

Conrad Janz, *W. B.* Als Abkömml. v. Feu de Malakoff zeich. sich diese Spielart durch reine Zwergf. s.w. aussgewöhnl. gr. Bl. m. wss. Auge aus und besitzt den nämlichen Character wie Lucien Tisserand.

Joseph Boland, *W. B.* Kreuzung v. Pasquitta mit Goliath kommt die Lilaagath-Färb. d. Säml. Ernst Wolfgang (Hock) sehr nahe, jed. ist die Dolde geschlossener u. d. mehr zwergart. s. rglm. Wchs. mit den zahlreich. Blüthendolden reizend; eine sehr gute Marktpflanze.

Diese vom Züchter selbst beschriebenen Sämlinge, besitzen die beliebte halb-

hohe und Zwergform mit schönen Zonen, u. wenn auch nur zwei neue Färbungen dabei vorkommen, so haben sie neben den bis jetzt bekannten neueren, ihre besonderen Vorzüge, so dass wir bei deren längst anerkannter vielseitiger Verwendbarkeit d. Sc Pelarg. nicht genug darauf aufmerksam machen können.

Alle 12 Sorten 4 Thlr., 6 Sorten 2 Thlr. 15 Ngr., à Sorte 15 Ngr.

# VIII. Petunien.

à $7^1/_2$ Ngr.

3 Azora *Sickmann*, lila, blau Rückseite, rosa gefüllt.
40 Baronin von Verna
6 Commerzienrath Lucius *Vill.* purpur viol. mit weiss gestreift, s. gross,
36 Comte Alfred de Limminge
7 Curiosa
39 Frauenlob
12 General Havelock *Vil.* blasslila gr.
14 imperialis alb. pl. const. gef, blüh.
38 Justin Koch
41 Karlsruher Streifling *Sonnt*, zuweilen rosa carmin, reizend weiss gestr, u. bandirt, ziemlich constant. prächtige Varietät für Beete und Gruppen, sowie Topfcultur; eine der allerneuesten Züchtungen.
19 Madame Miellez, *Rend.* lebhaft amaranthroth, Schlund schwarz, violett sehr gross.
23 Murillo *Sickmann*, lila purpur, sehr gross.
26 Polydor *Schmidt.* gefüllt, kleinblum. schön.
29 Red great banner, grossblumig.
87 Reizende von Rüsselheim,
31 Schmuck des Umthals *Sickm.* violett lila, schattirt, gefüllt
35 Schüles Triumph.
34 Victor de Pruines.

# IX. Rhododendron.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 61 | arboreum *Sm.* argenteum coccineum . . . | — | 15 |
| 1 | — belle Leopoldine . | — | 15 |
| 2 | — Burggravianum . . | — | 15 |
| 63 | — Cunninghami . . | — | 15 |
| 64 | — foetidum . . . | — | 15 |
| 4 | glabrum . . . | — | 15 |
| 5 | — grandidissimum . . | — | 15 |
| 65 | — jubatum . . . | — | 15 |
| 66 | — Knights Seedling . | — | 15 |
| 67 | — magnificum . . . | — | 15 |
| 6 | — magniflorum . . | — | 15 |
| 70 | — Princeps . . . | — | 15 |
| 69 | — punctatum superbum . | — | 15 |
| 72 | — Rollisonii . . . | — | 15 |
| 84 | — Roi des pourpres . | — | 20 |
| 73 | — Smithii novum . . | — | 15 |
| 71 | — Smithii speciosum . | — | 15 |
| 75 | — Smiths Seedling . | — | 15 |
| 7 | — speciosum *Smith.* . | — | 15 |
| 83 | — splendidum . . . | — | 15 |
| 77 | — verum . . . | — | 15 |
| 8 | — Waeberi *H. Dresd.* . | — | 15 |
| 9 | — Wilmoutii . . . | — | 15 |
| 10 | — Wiltonii . . . | — | 15 |
| 82 | altaclarense *Lindl.* . | — | 20 |
| 17 | Cartonianum . . | — | 15 |
| 78 | Catawbiense *Mchx.* . | — | 15 |
| 11 | Duc de Brabant *v. Htte.* | 1-2 | — |
| 12 | étendart de Flandre | 1-2 | — |
| 13 | fastuosum fl. pl. *v. Htte.* | $^1/_3$1 | — |

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 79 | caucasicum . . . | — | 15 |
| 14 | cinnamomeum *Lindl.* . | $^1/_2$1 | — |
| 15 | Gibsoni *Hortul.* . . | — | 10-20 |
| 85 | campanulat *D. Don.* (Alexandrinum *Versch.*) . . | — | 20 |
| 86 | catawbiense *Mx.* (Empereur de Marocco) . . | — | 20 |
| 92 | Chamaecistus *L.* . . . | 1 | — |
| 87 | cinnamomeum *Wall.* Hammerlini . . . . . | 1 | — |
| 89 | — Comte de Rochetuille | — | 20 |
| 88 | — Mme. Wilders . . | 1 | 20 |
| 90 | ferugineum *L.* roseum | — | 10 |
| 21 | hybr. (v. Azalea) Norbitonense . . . | 1 | — |
| 22 | — (— —) Yellowish . | 1 | — |
| 23 | javanicum *Bennet* (Vireya *Bl.*) | 1 | — |
| 24 | nepalense . . . | — | 15 |
| 25 | ponticum *L.* . . . | $^1/_8$2 | — |
| 80 | — eximium album . . | — | 15 |
| 81 | — fol. variegatis . . | — | 15 |
| 52 | — Lowii . . . . . | — | 15 |
| 26 | — Vervaeneanum fl. pl. *Vervaene* . . . | $^1/_3$-1 | — |
| 93 | Prinz Radali . . . | — | 20 |
| 27 | Rollissoni . . . . | — | 15 |
| 28 | zeylanicum . . . | — | 15 |

Gelbblühende.

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 94 | aureum triumphans . | — | 20 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| 95 glaucum flavum | 1 | — |
| 96 light white & yellow | 1 | — |
| 99 Aucklandiae *W. Hook.* | 3 | — |
| 102 camelliaeflorum *J. D. Hook.* | 3 | — |
| 100 Campbelliae *J. D. Hook.* | 3 | — |
| 103 leucanthum | 2 | — |
| 101 Maddeni *Hook. f.* | 3 | — |
| 97 nilagiricum *Zenk.* | 1 | — |
| 98 robustum *Hook.* | 1 | — |

## Rhodod. Sikkim-Himalaya.

| | Thlr. |
|---|---|
| 29 aeruginosum *Hook fil.* | 1 |
| 30 Alpine Red. | $1^1/_2$ |
| 31 — Shrubby | 2 |
| 32 aromaticum *Hook. fil.* | $1^1/_3$ |
| 33 barbatum *Wall.* | 1 |
| 34 calyculatum *Hook. fil.* | 1 |
| 35 campylocarpum *Hook. fil.* | 1 |
| 36 ciliatum *Hook. fil.* (lilacinum) | $^1/_2$ |
| 37 cinnabarinum *Hook fil.* | 1 |
| 38 cordatum *Hook. fil.* | 2 |
| 39 Dalhousiae *Hook. fil.* | 1 |
| 40 Edgworthii *Hook. fil.* | 1 |
| 41 Falconerii *Hook. fil.* | 3 |
| 42 fulgens *Hook. fil.* | 1 |
| 43 glaucum *Hook. fil.* | $^2/_3$ |
| 104 Hookeri *Nutt.* | 1 |
| 44 lancifolium *Hook. fil.* | 1 |
| 45 niveum *Hook. fil.* | 1 |
| 47 Thompsonii *Hook. fil.* | 1 |
| 48 Wallichii *Hook. fil.* | 1 |
| 49 Wightii *Hook. fil.* | $1^1/_2$ |
| 50 spec. very fine scarlet. | 1 |

## Neueste Einführungen. Rhodod. von Assam & Bhotan.

Sie zeichnen sich schon durch Eleganz der Blätter vorzüglich aus.

| | Thlr. |
|---|---|
| 51 Boothii *Nutt.* | 3 |
| 53 calophyllum *Nutt.* | 2 |
| 54 eximium *Nutt.* | 2 |
| 55 Jenkinsii *Nutt.* | 3 |
| 56 Kendrickii *Nutt.* | 2 |
| 57 Leysii *Nutt.* | 2 |
| 58 longifolium *Nutt.* | 2 |
| 59 Nuttali *Booth.* | 3 |
| 60 Windsori *Nutt.* | 2 |

# X. Rosen.

## Ayrshira (arvensis, capreolata).

| | Ngr. |
|---|---|
| 384 Banksiaeflora | 10 |
| 601 Dundée Rambler | 10 |
| 1 plena | 5 |
| 392 Queen of the Prairies | 10 |

## R. Banksia.

| | |
|---|---|
| 11 Browniana | 10 |
| 5 Diadem | 8 |
| 6 épineuse de la Chine | 10 |
| 8 Fortunei | 10 |
| 22 grandiflora | 8 |
| 2 lutea plena | 5 |
| 10 Oudin | 10 |
| 12 speciosissima | 10 |

## Borbonica (Bourbons).

| | Ngr. |
|---|---|
| 602 Baron Gronella, *Guil. p.* violtrs. gr. vll. kglf. kräft. Wuchs | 25 |
| 668 Catharine Guillot | 20 |
| 669 Cardinal Fesch | 10 |
| 603 Decandolle, leucht. prprrth. gr. vll. s. sch. gelb. s. kräft. Wuchs | 10 |
| 661 Deuil de la Duchesse d'Orleans *Pradel.* | 12 |
| 670 — de Sir Robert Peel | 10 |
| 662 Docteur Bart *B.* | 12 |
| 633 — Berthes | 15 |
| 671 — Hardouin | 10 |
| 13 Duc d'Isly | 10 |
| 604 Duchesse de Thuringe, *Guillot.* wss. m. lila angeh. mttgr. voll in gross. Dold. blüh. | 10 |
| 672 Du petit Thouars | 10 |
| 638 Général Blanchard, *Portem.* lebh. rs. mttgr. gef. sch. krft. wachs. | 10 |
| 605 Hermosa, hchrs. mttgr. kglf. s. r. bl. | 6 |
| 25 humilis minor | 8 |
| 606 JulieFontenelle, *Portemer.* viol. carm. s. gef. schlfg. Veilchgd. | 6 |
| 351 Lewson Gower | 10 |
| 15 Madame Soldini | 6 |
| 607 Mme. Helfenbein, *Guillot.* r osalila grss. voll Centifolf. | 8 |
| 673 — Nerard | 10 |
| 674 Misstr. Bossanquet. | 10 |
| 675 Mons. Jard | 15 |
| 608 — Schmitt, *Schmitt,* rosa m. carm. schft. Rücks. silbwss. grs. voll. schlf. kräft. wachs. extraschön | 8 |
| 645 Mlle. Elise Reynaud | 15 |
| 609 Paxton, *Lafay.* feur. rsa. mttlgr. voll s. kräft. wachs. büsch lblth. | 10 |
| 17 Princesse de Croy | 3 |
| 23 Reine des Isles de Bourbon, fleischf. mittgr. vll. schal. förm. s. schön kugelförmig. | 10 |
| 212 Souvenir de Malmaison | 10 |
| 676 — de L'exportation de Londres | 10 |

## R. bracteata.

| | |
|---|---|
| 3 Maria Leonida | 4 |

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 9 | Louis Napoleon | 5 |
| | Centifolia major, ordinaire ou ancienne | 6 |
| | — minor | 6 |

### Centifolia muscosa remontants.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 624 | Ad. Brogniard | 20 |
| 666 | Alfred de Dumas | 20 |
| 354 | Ferrugineuse de Luxembourg | 10 |
| 355 | Hermann Kegel. | 10 |
| 244 | Jeny Lind(Reine des Mousseuses) | 20 |
| 323 | Mad. Salet (remontirt) | 20 |
| 647 | ma pontue | 20 |
| 340 | Nuits de Young. | 20 |
| 446 | Oscar Leclere (remontirt) | 20 |
| 356 | Pompon mousseux | 10 |
| 377 | Quatre saisons | 20 |
| 381 | unique de provence | 10 |
| 357 | Zoë | 10 |

### Damascena.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 610 | Joasine Hannet | 15 |
| 16 | * rubicunda | 10 |

### R. Lawrenciana.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 18 | kermesina | 3 |
| 19 | plena | 3 |
| 613 | la miniature, dklrs. kl. gef. niedr. | 5 |
| 612 | multiflora, rosa, kl. ge. niedr. | 5 |
| 20 | Ruhm der Lawrencia | 3 |
| 21 | varietas nana | 3 |

### R. lutea.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 577 | bicolor | 15 |
| 577 | Williams double | 15 |
| 4 | jaune de Perse | 10 |

### R. microphylla.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 13 | de Luxembourg | 3 |
| 24 | purpurea de Luxembourg | 8 |

### R. multiflora.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 25 | bicolor | 6 |
| 26 | noisettina | 6 |
| 27 | purpurea | 5 |

### R. Noissetina.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 28 | à grandes fleurs violettes | 3 |
| 308 | Aimé Vibert | 10 |
| 29 | à odeur très suave | 3 |
| 30 | Adelaide d'Orleans | 3 |
| 31 | Aimé Heine | 3 |
| 32 | amabilis | 3 |
| 33 | Azetta | 4 |
| 34 | Bougainville | 3 |
| 658 | Bouquet de Marie | 10 |
| 35 | Carbonari | 3 |
| 36 | Camellia purpurea | 10 |
| 37 | changeante | 5 |
| 38 | Charles X. | 6 |
| 39 | Chaurinaus superbe | 6 |
| 40 | Cherari | 5 |
| 41 | Circe | 3 |
| 342 | communis plena | 3 |
| 677 | Cromatella | 10 |
| 43 | d'Anjou | 3 |
| 44 | Desprez | 3 |
| 45 | Duc de Broglie | 6 |
| 46 | Duchesse de Champagne | 3 |
| 47 | Fellenberg | 6 |
| 48 | Isabelle d'Orleans | 3 |
| 49 | Isle de Bourbon | 3 |
| 678 | Jacques Amyot | 8 |
| 50 | La cherie | 6 |
| 51 | Lafayette | 5 |
| 52 | Lée | 6 |
| 53 | Marianne | 5 |
| 54 | media | 4 |
| 55 | mignonne | 6 |
| 56 | nymphe Echo | 3 |
| 679 | Oplurie | 10 |
| 57 | Puseau | 4 |
| 58 | Roi des cramaoisies | 3 |
| 59 | rosea | 5 |
| 60 | Smiths yellow | 10 |
| 611 | Solfatare, gelb m. dkl. Centr. s. gr. voll. schalf. kräftig | 10 |
| 63 | Thelaine | 3 |
| 64 | Theodor Körner | 6 |
| 65 | Victorieuse | 5 |

### R. perpetuelles et Portlands.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 234 | Armide | 12 |
| 235 | Belle americaine | 12 |
| 236 | Blanche Vibert *Vibert.* | 12 |
| 239 | du Roi striée | 8 |
| 241 | Julie de Krüdner *Laffey.* | 12 |
| 249 | Madame Trudeau *Boll.* | 12 |
| 502 | Melanie | 10 |
| 255 | Prince de Galles | 10 |

### R. pimpinellifolia.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 10 | lutea plena | 10 |

### R. Remontantes.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 680 | Abd-el Kader | 10 |
| 681 | Ad. Bassange | 15 |
| 262 | *Aimé Vibert | 10 |
| 452 | Alphonse Karr | 10 |
| 626 | Altesse imperiale | 20 |
| 682 | Anna de Diesbach | 15 |
| 515 | * — Hoffmann | 10 |
| 627 | Ardoisée de Lyon *Damas.* glzdr. m. zglf. Centr. gr. s. voll. | 25 |
| 263 | Auguste Mie Laffay | 10 |
| 475 | Augustine Guinosseau | 10 |
| 264 | — Mouchelet | 10 |
| 512 | Bar. de Heckern de Wassenair | 10 |
| 266 | — Halley de Claparêde *Port.* | 10 |
| 473 | — de Tornori | 10 |
| 267 | — Prevost | 10 |
| 683 | Bauhus | 15 |
| 507 | Beranger | 10 |
| 505 | Blanche Lafitte | 10 |
| 520 | * — Bouleau | 10 |
| 459 | * — Portnier | 10 |
| 573 | Bouquet de fleurs | 10 |
| 265 | * — de roses | 10 |
| 266 | *Brennus | 10 |
| 364 | Callardeau | 10 |
| 363 | *Capitain Reynaud | 10 |
| 600 | Casimir de Lavigne | 20 |
| 272 | Charles Boissier | 10 |
| 630 | Cimabue | 20 |
| 280 | *Comte de Montalivet | 10 |

| Nr. | Name | Ngr. |
|---|---|---|
| 500 | Comte de Bathyany | 10 |
| 282 | * Coupe de Hèbe | 20 |
| 631 | de la Motte | 10 |
| 465 | Delphine de Chambaron | 10 |
| 522 | * Docteur Reynaud | 15 |
| 684 | — Ad. Eisl | 20 |
| 932 | — Bretonneaux | 10 |
| 468 | — Marx | 10 |
| 574 | Duc d'Osiana | 15 |
| 494 | Duchesse d'Orleans | 15 |
| 288 | * Emilia Galotti | 15 |
| 685 | Etoile de Marie | 15 |
| 634 | Eugéne Allary | 20 |
| 491 | Felicitè de Parmontier | 15 |
| 416 | — Rigeau. | 15 |
| 635 | François | 20 |
| 686 | — de Arago | 20 |
| 296 | Gèant des batailles | 15 |
| 570 | General Changarnier | 10 |
| 587 | — Washington | 15 |
| 479 | * — Jaqueminot | 10 |
| 378 | Genie de Chateaubriand | 15 |
| 474 | George d'Ambroise | 15 |
| 508 | Glorie de Parthenay | 10 |
| 571 | guerbe de roses | 10 |
| 487 | Hector de Jaqueminot. | 15 |
| 637 | Impératrice Eugenie *Beluz* zrtsilbwss. rosa gr. gef. becherf. | 10 |
| 513 | * Jeanne d'Arc. | 10 |
| 565 | * Jacques Amiot. | 15 |
| 307 | — Lafitte | 10 |
| 208 | * Joseph Gourdon | 15 |
| 309 | * Josephine de Hohenzollern | 15 |
| 664 | — Vernet | 20 |
| 310 | * Königin Maria von Sachsen. | 15 |
| 646 | L'Abbé Feytel | 20 |
| 639 | La Comète *Lartay* S. gr. voll. lech. rosa hellviol. nüanc. kräft. Wuchs | 12 |
| 561 | * Laura Ramand | 15 |
| 494 | la reine | 15 |
| 539 | * la ville de St. Remy | 15 |
| 506 | l'élegante | 15 |
| 461 | le lion de combats | 15 |
| 498 | Lewson Gower | 15 |
| 60 | L,enfant futur des Francais *Soup. & Nott.* | 15 |
| 462 | — du mont Carmel. | 10 |
| 311 | * Lord John Russel. | 15 |
| 688 | Lord Palmerston | 15 |
| 453 | — Raglan | 15 |
| 689 | Louis Gullino | 15 |
| 528 | * Louise Odier | 15 |
| 513 | Louis Philipp | 15 |
| 455 | Lucie de Barante de Montaza | 15 |
| 542 | Marie Bruny | 20 |
| 548 | Mathilde de Monteville | 20 |
| 468 | Mme. Aline de Lavantella | 15 |
| 690 | — Furdato | 20 |
| 347 | — Champbell d' Isly | 15 |
| 457 | — de Trotter | 15 |
| 450 | — Domage. | 15 |
| 502 | — Duchet. | 15 |
| 480 | — Fleury. | 15 |
| 318 | * — Lamoricière *Port.* | 15 |
| 515 | * — Marguerite de Lavonanche | 10 |
| 641 | Mme. Octavie Depayre | 20 |
| 469 | — Rendatler. | 10 |
| 644 | — Rigeul de Latour | 20 |
| 382 | Rivers | 10 |
| 456 | Seigneur | 10 |
| 488 | Theodor Martel | 25 |
| 382 | Teudeau | 10 |
| 657 | Turtado | 20 |
| 454 | Wilfried | 15 |
| 646 | Mlle. Betty Haymann | 20 |
| 538 | — Godard | 15 |
| 504 | Maréchal Gaspard de la Vallière | 15 |
| 514 | Marie de Bourgogne | 15 |
| 466 | Marquis of Southerland | 15 |
| 493 | — de Balbiano | 15 |
| 540 | * Mathurin Regnier. | 15 |
| 312 | * Melpomene | 10 |
| 572 | Mistresse Elliot | 10 |
| 313 | * Mogul | 15 |
| 643 | Mr. de Montigny *Paillet.* crm. gr. gef. flach geb. kräftig. | 15 |
| 497 | Need of yong's | 15 |
| 372 | * Noémy | 15 |
| 650 | Oriflamme de St. Louis *Baudry* s. gr. voll. leucht, carmroth. | 15 |
| 534 | Palais de Cristal | 15 |
| 314 | * Paul Joseph | 15 |
| 651 | Philodamie Crozy dklrs, gr. u. vll· | 15 |
| 665 | Princesse Olympia | 20 |
| 328 | Prinz Albert | 15 |
| 315 | * — v. Preussen. | 15 |
| 463 | Queen Victoria | 25 |
| 510 | Raphaël | 15 |
| 484 | * Reine des fleurs | 15 |
| 652 | Reine de la Citté | 20 |
| 481 | — des Vierges | 10 |
| 660 | — des violettes | 20 |
| 331 | — Mathilde | 15 |
| 460 | Rubens | 15 |
| 316 | *Salvator Rosas | 15 |
| 451 | Scipion | 10 |
| 407 | Sidonie Vibert | 15 |
| 653 | Sophie Königin v. Holland | 20 |
| 509 | Souvenir de la Reine d'Angleterre | 15 |
| 511 | — — — — de Belgique | 15 |
| 471 | — du petit Corporal | 15 |
| 337 | Tasso | 15 |
| 672 | Tour de Malakoff | 15 |
| 105 | — — — — *Cloon & Oray.* | 10 |
| 575 | Trianon Sydonie | 10 |
| 501 | *Triomphe de Bath | 15 |
| 376 | — de Paris | 15 |
| 317 | *.— de Valenciennes | 15 |
| 576 | triumphans | 10 |
| 663 | Vainqueur de Solferino | 20 |
| 485 | Venusta | 15 |
| 319 | *Vicomte d'Alincourt | 10 |
| 341 | William Griffith *Portemer* | 15 |
| 842 | — Jesse | 15 |
| 579 | Zenobie | 15 |

## R. semperflorens (bengalensis).

| Nr. | Name | Ngr. |
|---|---|---|
| 66 | Admiral de Rigny | 5 |
| 67 | Alfonsonia | 3 |
| 68 | Archiduc Charles | 6 |
| 70 | belle de Monza | 3 |
| 69 | — des Dames | 3 |
| 71 | — Isidore. | 5 |
| 72 | Bernard de Montholon | 5 |
| 73 | Bischonia | 6 |
| 74 | Bison d'Angers | 3 |
| 75 | Bouquet à fleur rouge | 4 |
| 76 | Calvertia purpurea | 3 |

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 79 | camellia alba | 5 |
| 80 | camelliaeflora nova | 8 |
| 81 | César Cardet | 6 |
| 83 | comble de gloire | 4 |
| 84 | Comptoniana | 3 |
| 192 | Comtesse de Lantage | |
| 3 | cortice striato | 6 |
| 85 | Cupido | 6 |
| 86 | Darius | 3 |
| 87 | Deton | 4 |
| 391 | Diademe de fleurs | 10 |
| 88 | Duc de Berry | 3 |
| 89 | Duchesse de Parma | 6 |
| 90 | — de Kent | 5 |
| 693 | Eugenie Hardy | 10 |
| 92 | Fabrier | 3 |
| 93 | Fackirii | 6 |
| 344 | Fanny | |
| 94 | Fénélon de Luxembourg | 5 |
| 95 | fulgens | 3 |
| 96 | glorie d'Auteuil | 3 |
| 97 | — de Daniel | 4 |
| 98 | — — Guerin | 4 |
| 190 | grande Hercule | 4 |
| 101 | — vallée | 3 |
| 355 | Hudsonica plena | 10 |
| 103 | la croix | 3 |
| 103 | la superbe | 6 |
| 82 | l'hermite de Soigne | 3 |
| 104 | lychnidiflora | 3 |
| 106 | Miranda | 5 |
| 76 | Mme. Malezan | |
| 107 | Mstr. Bosanquet | 6 |
| 108 | Molinieri | 3 |
| 110 | Osiris | 4 |
| 111 | paeoniaeflora | 6 |
| 112 | Paluvienne | 3 |
| 113 | Penelope Luxembourg | 6 |
| 544 | Perle de Panache | 12 |
| 114 | Prinz Wilhelm | 6 |
| 115 | purpurea | 4 |
| 116 | ranunculoides purpurea | 5 |
| 118 | tenella | 6 |
| 99 | Thetis | 10 |
| 219 | tres double | 6 |
| 120 | Turenes | 6 |
| 121 | victoire d'Aumy | 3 |

## Rosa Thea.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 614 | Adam, lebh. lachsrs, s. grss. voll. kugelf. s. schön | 8 |
| 124, | Aegina | 6 |
| 127 | alba | 5 |
| 695 | Amabilis | 15 |
| 128 | Ami Frémont | 10 |
| 122 | à odeur de muscate | 3 |
| 130 | Archiduchesse Therèse Isabelle | 5 |
| 615 | Auguste Vacher, *Lacharme*, gelb kpfrorglb. schtt. mttgr. gef. schlf. | 8 |
| 132 | belle Archinto | 3 |
| 387 | — Chinoise | 10 |
| 134 | — Helene | 3 |
| 135 | — Levallière | 3 |
| 137 | Besnier | 3 |
| 138 | Bigottine | 6 |
| 140 | Bourbon | 6 |
| 144 | Catharina II. | 5 |
| 145 | Catharina Maria | 5 |
| 147 | Chrysocome | 6 |
| 118 | coccinea de Cola | 6 |
| 616 | Comte de Paris, *Du Lessenb.* flschf. m. rs. schtt. s. gr. vll. schalf. krft. wachs. vorz. schön | 8 |
| 150 | Corinna I. | 5 |
| 617 | Desirée, flschf. wssl. mttgr. kglf. | 8 |
| 154 | Devoniensis | 6 |
| 159 | Duc de Grammont | 5 |
| 160 | Duchesse de Lavallière | 6 |
| 659 | Enfant de Lyon, *Aroux & Crozy* | 12 |
| 166 | Gamma | 6 |
| 167 | Globosa | 3 |
| 467 | Gloire de Dijon | 10 |
| 170 | glorieuse | 4 |
| 171 | Gombault | 5 |
| 173 | Governativa | 5 |
| 174 | gracilis | 5 |
| 177 | grande Monarche | 6 |
| 175 | Haddington | 5 |
| 697 | Homere | 15 |
| 180 | Isabella Grey | 10-20 |
| 181 | la desirée | 3 |
| 183 | la croix | 6 |
| 184 | lactea grandiflora | 3 |
| 186 | Lavallière | 3 |
| 187 | Lavienne Darcule | 6 |
| 188 | lilacina | 4 |
| 192 | Louet | 5 |
| 622 | Louise de Savoye *Ducher*, schwglb. gr. s. gef. kugelbl. | 8 |
| 658 | Lyonaise | 12 |
| 196 | Marquise de Foucauld | 12 |
| 193 | Melanie Willermoz | 6 |
| 194 | Milbille | 5 |
| 198 | Mme. Bravy, gelbl. & flschfw. gr. voll, krft. W. s. edl. gr. geb. | 8 |
| 619 | — de Vatry (Modeste Guerin) dklros. gr. s. gef. | 8 |
| 196 | Narcisse Bourbon | 6 |
| 620 | Niphitos, wss. m. gelb. Centr. s. gr. voll. kglf. kräft. | 8 |
| 198 | Nubienne | 7 |
| 199 | Nymphe Egérie | 8 |
| 699 | Princesse Adelaide | 12 |
| 200 | — de Joinville | 6 |
| 203 | Regina Victoria | 3 |
| 206 | Royal Leopold | 4 |
| 700 | Safrano | 12 |
| 621 | Souvenir d'un ami | 12 |
| 214 | Strombia | 4 |
| 218 | Thonia | 6 |
| 213 | Triumphans | 4 |
| 222 | Valentine | 5 |
| 224 | Venusta | 6 |
| 225 | Vesuv | 6 |
| 227 | Vicomtesse Decazes | 6 |
| 226 | victoire modeste | 5 |
| 228 | virginale | 5 |
| 229 | Virginie | 5 |
| 230 | Wiener Thea | 6 |

## Uneingereihte.

| | | Ngr. |
|---|---|---|
| 7 | hybrida Maltonensis | 5 |

Folgende Neuheiten deutscher Züchtung werden von Anfang März 1862 abgegeben:

### Rosa hybrida bifera (Remontant-Rosen).

Frau Doctor Heinze, *Goeschke.* Blume hell fleischfarb., Centr. weiss m. silb. Nüancen, gr. gefllt., vllk. Form, kräft. W. bl. dankb. 5 Thlr.

### Rosa Borbonica (Bourbon-Rosen).

Gruss an Leipzig, *Goeschke.* Blume carmrs. im Verblühen heller, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, sehr reichblühend . 4 Thlr.
Triumph von Coethen, *Goeschke.* Blume gross, gefüllt, kugelförmig, feurig dunkelpurpur, violett nüancirt, blüht sehr dankbar in Büscheln, Holz kräftig, sehr effectvoll . . . . 4 Thlr.
Alle drei Varietäten zusammen . . . . . . . . . . . 12 Thlr.

## XI. Verbenen.

Durchwinterte Pflanzen à Stück $2^1/_2$ Ngr., à Dutzend 25 Ngr.

1 Abdalah.
3 alba variegata maculata.
2 Anatole
7 Alexander Ernst.
116 Atraction *Edmond.*
112 Augustine *Denis*
9 Barkeri
117 Bar. de Gravier *Denis.*
5 Boudoir de Venus.
11 Boule de feu.
18 Brillant de Vaise,
145 Christ. Siegling.
33 curiosa
35 Deutscher Ruhm.
20 elegans.
41 Flora.
60 General Bosquet.
61 Gloire francaise,
64 Grand Sultan.
17 J. C. Schmidt *Kr.*
30 Ingrami
142 Le lion des combats.
36 Madam Briolett
70 — Cambacéres.
19 — Fabry.
71 — Neubert.
21 — Ramberg *Kr.*
76 Maonettii *Rossi* (Kaiserin Elisabeth),
8 Maria Baumbach.
23 Mars *Kr.*
44 Minerva
79 Mr. Alhalin.
144 Mss. Ottilie
83 — Woodroff.
29 Napoleon.
68 Prima Donna.
53 scabra.
88 Schamyl.
56 St. Margaretha *Barker.*
61 Surprice.
108 Sr. Fr. Paxton *Edm.*
109 Ulysse *Charlet.*
110 Voltaire, *Dufoy.*

Neue à 5 Ngr.

137 Comete *L. Duf.* kirschroth, innen lebhaft carmin.
121 Comte de Morny, *L. Duflot.* Grosse runde scharlach Bl. mit grauem Auge.
122 Comtesse de Morny, *L. Duflot.* Grosse runde schneeweisse Blume mit rosa Centrum weissem Auge.
138 Eucharis, *Dan.* grssbl. purp. sammt. viol. mit weissem Centrum.
132 Evéque de Nancy, sehr grossbl. leh. rosa m. grünl. Centrum.
127 Faust. *Duf.* grbl. feur. rosa Centr. scharlach.
124 Feenschmuck *Krätschmar.*
140 Fille de France. N. lebh. fleischr. innen lebh. rosa.
151 Frederic Bratschi. *W.* sehr grssbl. scharlachpurpur Centr milchw.
134 Imperatrice Eugenie. *Lab.* rein weiss nach innen carmin.
139 Jsoline. *N.* hellroth mit gelb. Augenrändern mit purpur. Ring.
125 Joseph Sonntag, *Krätschm.*
142 la Pompadour, *P.* kirschroth mit gelb. Centrum
130 I,Univers, *Barb.* carm. mit sammet granatroth-
129 Mme. Cherpin, *D.* grssbl. viol. Bronze gestr. rothes Centrum.
123 — Miellez, *L. Duflot.* grosse runde schneew. Bl. von lebh. sch. rs. u. dkl. Centrum mit grünlichg. Auge.
135 — Rendatler *Lab.* atlasweiss Centr. lilaviolett.
133 Palmyre, *N.* blutr. mit gelb. Auge.
136 Phoebus, feurigsch., innen weiss, dkl. umsäumt

Neuere von Sonntag à Stück 5 Ngr.

146 Amalie sehr gr. perlweiss mit 5 rosavioletten Flecken. Auge grün-
147 Beatrice. s. gr. milchw., Auge lilarosa. gut gebaut.

148 Elisabeth Königin von England, sehr gross feurigdunkelroth. Auge weiss mit purpur Ring.
149 Elisabeth Königin von Spanien, gross lebh. lilarosa. feurig mit carmin gefl. Auge weiss mit purpur Ring.
150 Gräfin Lavagna, s. gr. crmlila. m. crmschrl. marmorirt, Auge lilarosa.
151 Gustel v. Blasewitz, gr. Bl. pfirsbl. m. carm. Flm., and. rslila. m. feur. Scharl. gesternt, s. schön.
152 Hedwig, s. gross, dklbräunlich blutroth, Auge grau m. w. Ring, gut geformt.
153 Jungfrau v. Orleans, gross, rein veilchenblau, Auge gr. w. Centr. Prachtbl.
154 Lady Macbeth, gross, bräunlichroth, zur Mitte dunkler, Auge gelblich weiss.
155 — Milford, gr. röthl. viol. m. feur. scharlach Flm., Auge gr. w. m. schw. Rg.
156 Laura, ungew. gr. röthl. w. m. crm. geflmt. Auge gr. gelbl., Centr. dunkler.
157 Louise Millerin, extragr. porcellwss., Centr. gelb m. Crm. reiz. umfl., edle F.
158 Maria Stuart, s. gr., kupfrigrosa m. schön blutrosa Stern, Auge grau, köstl.
159 Phaedra, gr., glzd. amarviol. m. feur. prpr. Flm. i. d. M. jed. Pet., Auge gr. glbl.
160 Prinzessin Eboli, mittlgr. feur. schrl. zinnbr., s. rchbl. Prkbl. f. Einf. u. Grupp.
161 Schiller. s. gr. dklindigo geg. d. Mitte blau, Auge grau, edelste d. blau. Verb.
167 Thecla, gr. Bl., mattrosa, Mitte zglrt. u. blutrt. überspielend, Auge grau.

## à 10 Ngr.

168 Admiration *Nivert.*
169 Alba odorata *Sonntag.*
170 Amelia Chavanis *G.*
171 Belle Gabriele *Sm.*
172 Comus *Laloy.*
173 Evéque de Bordeaux *L.*
174 Favorite *D.*
175 Le Sphinx *H.*
176 Louise Machet *M.*
177 Mme. Bugnet *G.*
178 Mme. Collier *Denis.*
179 — Dufois *Milliez.*
180 — N. Barba *W.*
181 — Schüle *S.*
182 Manasse *Denis.*
183 Proserpina *Nivert.*
184 Seize ans. *Laloy.*
185 Soeur Marie *Nivert.*
186 Vierge Marie *Nivert.*
187 Weik *Denis.*

# Freilandpflanzen.

## Stauden.

Dankbareres, als die Stauden, kann es nicht geben! Die Kosten deren Anschaffung sind gering; auf engem Raum lässt sich ein Flor für's ganze Jahr beschaffen (zumal, wenn wie hier, deren Blüthenzeit angegeben), und endlich ist deren Cultur das Einfachste, was es giebt und sie zur allgemeinen Beliebtheit emporhob, mich aber veranlasste, eine möglichst reiche Sammlung zusammenzustellen.

Die Frühlingsstauden versenden sich am besten im Herbst, sowie die Herbstzeit im Allgemeinen, mit Ausschluss der Herbstblüher, die geeignetste Zeit zur Staudenversendung ist; da die Mehrzahl der besseren Arten in Töpfen vorräthig sind, so ist jedoch deren Versandt auch im Frühjahr ohne Nachtheil möglich.

Die gegen Winterfrost zu schützenden sind mit * bezeichnet, die dagegen mit K. bezeichneten besser im Kalthause oder luftigen Keller zu durchwintern.

Die mit R. bezeichneten sind Rasenpflanzen, entweder durch gigantischen Wuchs, prachtvolle Blattformen oder weitleuchtende Blumen hervorstechend.

F. bedeutet Frühlingsblüher, die nicht später als bis Ende Mai blühen.
S. Sommerblüher von Ende Mai bis gegen Ende September blühende.
H. Herbstblüher, die bis zum beginnenden Frost, auch noch später blühen.
E. zu Einfassungen verwendbare und daher nur niedrige Pflanzen.
W. Rank- oder Schlingpflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acaena ovalifolia *B. & P.* | — | 8 |
| Acanthus carduifolius *Thbg.* | — | 10 |
| *R — longifolius *Hrt.* | — | 8 |
| — lusitanicus | — | 8 |
| — mollis *L.* | — | 5 |
| — niger *L.* | — | 6 |
| Acanthus spinosissimus *Pers.* Gewiss der schönste! | — | 10 |
| — spinosus *L.* Die Schönheit ihrer Blätter bewirkte, dass die Griechen diese Form zur Decoration der Capitäle verwandten. | — | 6 |

Thlr. Ngr.
Achillea Ageratum *L.* . . — 5
S — Eupatorium *M.B.* (filipendula *Lam.*) . . . . — 3
S — Millefolia fl. roseo . — 3
— — fl. rubro . . — 3
A S— moschata *Wulf.* . . . — 6
S — sambucifolia *Desf.* (Pyrethrum macrophyllum *W.*) — 5
— vallesiaca *Sut.* . . — 6
Achyrophorus maculatus *Schott.* — 5
Aconitum Anthora *L.* . . . — 10
S — brachycarpum *Hort.* . — 10
— californicum . . . . — 10
S — dissectum *Tausch.* . — 5
S — Lycoctonum *L.* . . . — 2
— — var. septentrionale *Mill.* — 5
— montanum . . . . — 6
— — ochroleucum *W.* . — 5
— Napellus *L.* . . . . . — 2
— — B. multifid. *Koch.* . — 5
— orientale *Mill.* . . . — 3
— paniculatum *Lam.* . — 5
— pyramidale *Mill.* . — 7
— pyrenaicum *L.* . . . — 4
— Sprengelii *Rchb.* . . . — 6
— Stoerkianum *Rchb.* . — 4
— — v. bicolor . . . — 5
— tauricum *Wulf.* . . . — 3
— venustum *Rchb.* (multifid. *Koch.* var. callibotryon) — 8
— volubile *Moench.* . . . — 5
Sämmtlich officinell, lieben Schatten, sind schön und reichblühend.

S Actaea brachypetala *D. C.* — 5
— podocarpa *D. C.* . . . — 8
— pterosperma *Turtsch.* . — 8
— racemosa *L.* . . . . — 5
— rubra *W.* . . . . — 5
— spicata *L.* fr. rubro . — 5
Actinomeris alternifolius *D. C.* (squarrosa *Nutt.*) . . — 5
H — oppositifolia *Fres.* . — 3
— squarrosa *Nutt.* . . . — 3
S Actinospora dahurica *Turtsch.* — 10
— taurica . . . . . . — 10
Adenophora communis *Fisch.* — 5
— denticulata *Ledeb.* . — 5
— elegans *Hort.* . . . — 5
— Gmelini *Fisch.* . . . — 8
S *— Lamarkii *Fisch.* . . . — 6
S *— latifolia *Fisch.* . . . — 5
— liliifolia *Ledeb.* . . . — 5
— stylosa *Fisch.* . . . — 6
— tricuspidata *D. C.* . . — 8
Sehr zierliche Glockenblumen.

A S † Adenostyles albifrons *Rchb.* (Cacalia *L.*) . . . . — 6
W S Adlumia cirrhosa *D. C.* (Corydalis fungosa *Vent.* Fumaria *Ait.*) . . . . . . — 5
Eine der prächtigsten Rankpflanzen.

F Adonis vernalis *L.* officinell — 5
S Agrostemma coronaria *L.* (Lychnis *L.*) . . . . — 2
— hybrid. *H. Wernig.* . . — 5
A S Alchemilla alpina *L.* . — 4
Fr. Alfredia cernua *Cass.* (Silybum *Voil. G.*) riesige Distel — 10

Thlr. Ngr
S Allium azureum *Fisch.* . — 8
S *— fragrans *Vent.* . . . — 5
— hymenorrhizon *Ledeb.* — 5
S — Moly *L.* . . . . . — 2
F*— narcissiflorum . . — 10
S*— odorum *L.* . . . . — 5
S — Scorodoprasum *L.* . — 10
S — sphaerocephalum *L.* . — 2
F*— subhirsutum *Mill.* (niveum *Roth.*) . . . . — 4
S — Victorialis *L.* . . . — 4
Allermannsharnisch; officinell.

S*Althaea armeniaca *Tenore.* — 6
S — cannabina *L.* . . . — 3
S — ficifolia *Cav.* . . . — 4
F E Alyssum altaicum *L.* . — 3
A S E — edentulum *W. & K.* — 4
— gemonense *Wulf.* (medium *Hort.* petraeum *Ard.*) — 3
S Amsonia latifolia *Mx.* . — 5
S — salicifolia . . . . — 3
*Anchusa tinctoria *L.* . . — 6
Anemone acanthifolia . — 5
— albana *S ev.* (obsoleta *Sims.*) — 5
— Halleri *All.* . . . . — 5
F E — Hepatica coerulea. simplex *L.* (Hepatica triloba *Chaix.* nobilis *Volckm. Schreb.*) — 2
— — — plena . . . — 5
— — alba simplex . . — 6
— — rubra plena . . — 3
— — — simplex . . — 3
— alpina . . . . . — 6
F* — coronaria *L.* . . . — 5
— — fl. pl . . . . . — 3
Diverse Farben, im Herbst zu pflanzen, sehr schön.

F — hortensis *L.* . . . — 6
H — japonica *Zucc. & Sieb.* — 3
— — hybrida . . . . — 6
S — multifida *Poir.* . . . — 5
S — narcissiflora *L.* (2j. Smpfl.) — 5
FE— nemorosa *L.* rubra pl. — 3
S — pensylvanica *L.* . . . — 5
S — pinnatifida . . . . — 10
S — sibirica *L.* . . . . — 4
S — sylvestris L. . . . — 3
FA— transylvanica *Henf.* . — 10
FA— trifoliata *L.* . . . — 3
S — virginiana *L.* . . . — 4
H— vitifolia *Luchan.* . . . — 8
R Andropogon furcatus *Mühlb.* — 10
Prächtiges Gras.
R Angelica atropurpurea . — 10
R S *Anisodus luridus *D. C.* — 10
S Anthemis nigrescens *W.* (caucasicum *Hornem.*) . . — 5
S Anthericum Liliastrum *L.* (Paradisia *Bert.* Czackia *Andr.* Hemerocallis *L.* sp.) . — 6
S — ramosum *L.* . . . . — 10
S W Apios tuberosa *Pursh.* (Glycine Apios *L.*) . . . — 5
Eine der schönsten Rankpflanzen; Knollen als Stellvertreter der Kartoffeln empfohlen.

S Apocynum androsaemifolium *L.* Fliegenfänger . . — 10
— canabinum *L.* . . . — 6
S — venetum *L.* . . . . — 4

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S Aquilegia alpina L. | — | 8 |
| — — B. grandiflora Pall. | — | 10 |
| — amoena Hort. | — | 5 |
| — atropurpurea W. En. | — | 5 |
| S — canadensis L. | — | 5 |
| — formosa | — | 6 |
| — fragrans | — | 5 |
| — Gebleri Fisch. Baumgart. | — | 5 |
| — grandiflora Fisch. | — | 3 |
| — jucunda F. & M. (macroceras) | — | 8 |
| — leptoceras F. & M. | — | 8 |
| — lutea Hort. | — | 8 |
| — nigricans | — | 5 |
| A — pyrenaica D. C. | — | 5 |
| — sibirica Lam. | — | 3 |
| — Skinneri Hook. | — | 4 |
| — viridiflora Pall. | — | 6 |
| — vulgaris L. div. Var. | — | 3 |
| — Wittmanni | — | 3 |

Man sammelt sie wieder mit vieler Vorliebe, da sie in den verschiedensten Farben nüanciren.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| A S Arabis coerulea Haenk. | — | 10 |
| F S — Halleri L. | — | 4 |
| A F — rosea D. C. | — | 6 |
| R*Aralia cachemirica | — | 5 |
| SR — macrophylla Flor. | — | 10 |
| — nudicaulis Linné. | — | 5 |
| — racemosa L. | — | 5 |
| Archangelica atropurpurea | — | 5 |
| S A Arenaria balearica L. | — | 8 |
| S A — caespitosa | — | 5 |

Sehr zarte Alpenpflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S — cucubaloides Sm. (Eremogene onc. Spr.) | — | 5 |
| — grandiflora All. | — | 8 |
| — graminifolia | — | 8 |
| — laricifolia | — | 8 |
| S*Argyrolobium Linnéanum Wlp. (Cajanus argent. Spr. Cytisus argent. L.) | — | 8 |
| E S F A Armeria alpina W. (Statice Hopp.) | — | 3 |
| — angustifolia W. | — | 3 |
| S* — cephalotes L. (latifolia W. formosa Hort.) | — | 5 |
| — dianthifolia Boiss. | — | 5 |
| — elongata Koch. (Statice Hoffm.) | — | 2 |
| — Halleri Wall. | — | 5 |
| — humilis Lk. Boiss. & Reut. | — | 5 |
| S* — latifolia W. (Statice Pseudo Armeria Murr. Jacq.) | — | 8 |
| — longiaristata leucocephala | — | 5 |
| S* — mauritanica Wall. | — | 6 |
| — plantaginea W. (Stat. Al.) | — | 4 |
| — purpurea Koch. (St. Koch.) | — | 3 |
| S* — Welwitschii | — | 10 |

Zur Fabrikation unverwelklicher Bouquets unentbehrlich.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Artemisia Abrotanum L. | — | 5 |
| — Absinthium L. | — | 8 |
| F — camphorata Vill. | — | 4 |
| R Arundo Donax | — | 15 |
| F Asarum grandiflorum Lodd. | — | 10 |

Officinell, kleinblüthig.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — japonicum (Heterotropa asaroides Morr. & Dc.) | — | 20 |
| S Asclepias amoena | — | 5 |
| — carnea | — | 10 |
| S — exaltata Lk. | — | 5 |
| — incarnata L. | — | 5 |
| RS* — princeps Bartl. | — | 8 |

Die schönste und imposanteste.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S — purpurascens L. | — | 5 |
| S — tinctoria Roxb. | — | 5 |

Indigopflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — syriaca L. | — | 5 |
| S Asparagus glycycarpos Knth. | | 3 |

Wurzeln essbar.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| W — verticillaris L | — | 10 |
| S Asperula odorata L. | — | 2 |

Waldmeister officinell.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S Asphodelus albus W. (ramosus B L.) | — | 10 |
| S — luteus L. fl. pl. | — | 10 |
| S — tauricus Pall. | — | 7 |
| S Aster aestivus Ait. | — | 3 |
| FE — alpinus L. | — | 3 |
| — amygdalinum Lam. | — | 5 |
| H — asper N. ab Es. | — | 2 |
| S — bicolor Hort. | — | 5 |
| S — cyaneus Hffm. | — | 3 |
| — diffusus Ait. | — | 3 |
| — eccapus | — | 5 |
| H — ericoides L. | — | 3 |
| — Fortunei | — | 5 |
| H — fragilis W. | — | 2 |
| — glabellus N. E. | — | 5 |
| H — laevigatus W. | — | 5 |
| — linifolius | — | 5 |
| — maximus | — | 5 |
| — multiflorus Ait. | — | 2 |
| S — nanus Hort. | — | 4 |
| H — Novae angliae L. | — | 2 |
| — — — L. A. agrestis N. E. spurius W. | — | 5 |
| — — — roseus | — | 2 |

Die beiden schönsten und grössten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — novi Belgii L. N. E. B. | | |
| — floribundus W. | — | 5 |
| H — parviflorus N. ab Es. | — | 3 |
| H — pendulus Ait. (horizontalis Dsf.) | — | 10 |

Eine der schönsten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| H — pinifolius | — | 5 |
| — puniceus | — | 5 |
| H — spectabilis Bnge. | — | 2 |
| — sulcatus | — | 5 |
| H — tenuifolius L. | — | 3 |
| H — versicolor W. (mutabilis L.) | — | 3 |
| W*Astilbe decandra D. Don. | — | 10 |
| W — rivularis Hamilt. | — | 15 |
| S Astragalus alopecuroides L. | — | 10 |
| RS — galegifolius L. | — | 6 |
| S — leucophaeus L. | — | 5 |
| S — maximus W. | — | 10 |
| S — pilosus L. | — | 5 |
| St. — purpureus Lam. | — | 5 |
| — vimineus Pall. | — | 10 |
| A S Astrantia Biebersteinii F. & M. | — | 7 |
| F — Epipactis L. (Hacquetia D.C. Dondia Spr.) | — | 3 |
| — helleborifolia M. B. | — | 6 |
| — intermedia M. B. | — | 10 |
| S&H — major L. | — | 2 |
| — minor L. | — | 5 |

Thlr. Ngr.

F&EAubrietia deltoides *D. C.* — 3
— erubescens *Grieses.* . — 2
E — spathulata . . . — 4
Baptisia australis *R. Br.* (Podalyria *Vent.*) . . . . — 4
— exaltata *Swt.* . . — 6
— leucaphaea *Nutt.* . — 5
— minor *Lehm.* . . — 4
— pallida . . . . — 6
FBellevallia romana *L.* . — 3
FBarnardia scilloides *Lind.* — 10

Eine allerliebste weisse, blaugestreifte, schon im April blühende Scilla.

Bellis alba minor . . . . — 5
— — prolifera sehr gross — 10
— carnea . . . . — 5
— — rosea marginata — 5
— fistulosa purpurpurea minor 5
— — rosea albo cincta — 5
— — rubra . . . . — 5
— — — major . . — 10
— — — maxima . — 10
FS — fol. variegatis . . — 5
— intus rosea maxima . — 5
— ligulata alba minor . — 5
— rosea . . . . . — 5
— — apice rubro . , — 5
— — major . . . — 10
— — minor . . . . — 5
— roseo cincta . . — 5
FE — perennis *L.* Elisa . — 2
— — flower of the day — 1
— — Guppy . . . . — 2
— — Prince Albert . — 4
— — Queen Victoria . — 2
Allerliebste Einfassungspflanze.

SBetonica grandiflora *N.* (Stachys *Benth.*) . . . . — 3
— orientalis *L* . . . — 2
SBiotia macrophylla *D. C.* . — 2
RSBocconia cordata *W.* (Macleaya *R. Br.*) . . . . — 10
RHBoltonia asteroides *L'Her.* — 5
RH — glastifolia *L'Her.* . — 5
Wird sehr hoch.

SBromus giganteus *L.* . . . 3
— orientalis . . . — 5
FBulbocodium vernum *L.* . — 4
FBupleurum falcatum *L.* (scorzonerifol. *W.*) . . — 5
RSCacalia atriplicifolia *L.* . — 5
SS — gigantea *Jacq.* . . — 5
— reniformis *W.* . . — 5
H — suaveolens *L.* . . — 5
Calamintha alpina *Lam.* . — 5
— Nepeta *Clairv.* (rotundifolia *Hort.*, obliqua *Hort.*) — 5
S Calimeris incisa *D. C.* (Aster *Fisch.*) . . . . . — 2
SCalliopsis Atkinsonii *Dgl. Hk.* — 3
FCaltha palustris *L.* fl. pl. . — 5
SCallistegia dahurica *Fisch.* var. incarnata . . . , *r* — 3
SW — pubescens *Ldl.* fl. pl. — 2

Eine reich und gross blühende, wohlriechende Winde.

SCampanula alliariaefolia *W.* — 3
S — altaica *A. D. C.* . — 3
— carpathica alba . — 3

Thlr. Ngr.

FEACampanula carpathica *Jcq.* — 2
— collina *M. B.* . . — 5
— coronata . . . . — 3
— crenata *Lk.* (ucrania *Bess.* rapunculoides *L.* var cren.) — 5
— cretica . . . . — 3
— fragilis *Cyril.* (cochlearifolia *Vahl.* crassifol. *N. E.*) — 5
S* — garganica *Ten.* . . — 5
S — grandis *Fisch.* . . — 3
S — gummifera *W.* . . — 4
S — lactiflora *M. B.* . — 3
S — lamiifolia *Lam.* . — 3
S — lingulata *W. K.* . — 5
S — linifolia *Lam.* . . — 2
S — macrantha *Hornem.* (latifolia *L.*) . . . . — 3
S* — multiflora *W. & K.* . — 6
S — nitens *Meyer.* . . — 3
S — nobilis *Lindl.* . . — 3
S — persicifolia *L.* fl. albo — 2
S — — fl. coeruleo . — 2
F — petiolata *A. D.* . — 8
* — primulaefolia *Brct.* . — 6
S — pusilla *Haenke.* coeruleo — 4
S — — fl. albo . . . — 4
S — rotundifolia *L.* var. alba — 3
S — sarmatica *Ker.* . — 5
St. — Saxifraga *M. B.* . — 5
— speciosa *Pourr.* (longifolia *Lapeyr.*) . . . . . — 8
— urticifolia bicolor pl. (Trachelium *L.*) . . . — 8
— uranica . . . . — 5
F*Carex Grayana *Dwey.* . — 6
SR — maxima *Scop.* . . — 3
Carlina acaulis *L.* (subacaulis *D.C.*) —
RSCassia marylandica *L.* . — 6
SHCatananche coerulea *L.* Immortelle . . . . . — 3
— — B. bicolor . . — 3
Centaurea adonidifolia *Rchb.* — —
S — atropurpurea *W.* . . . — 4
— calocephala *W.* . . — 8
S — — *W.* var. flava . . — 4
S — dealbata *W. M. B.* . — 3
S — glastifolia *L.* . . . — 4
S — macrocephala *W.* . — 8
— ochroleuca *W.* (leucantha *Ait.*) 5
S — rupestris *L.* . . . . — 4
— splendens . . . . — 3
S — stereophylla *Bess.* . — 3
SCentranthus ruber *D. C.* (Valeriana *L.*) Sibir. Salat — 5
SACephalaria alpina *Schrd.* — 4
S — centauroides *R. & S.* — 3
ESACerastium hirsutum *Ten.* — 5
SEA — repens *M. B.* . . — 3
SE — tomentosum *L.* . — 8
Die ganze Pflanze silberweiss.

Ceratochloa exaltata . . — 8
SAChaerophyllum Villarsii *Koch.* — 6
SCheiranthus Marschallianus (Erysimum?) . . . . . — 5
Aendert die Farbe; s. wohlriechend.

Chelone americana . . — —
S — barbata *Cal.* alba (Pentst.) — 5
H — glabra *L.* . . . . — 5
— intermedia . . . — 6
— Lyoni *Pursh.* (major *Ker.*) — 6

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| SChelone mexicana . . . | — | 6 |
| H — obliqua *L.* . . . . | — | 3 |
| SR— Toxii *M. B.* . . . | — | 5 |
| AChrysanthemum corymbosum (Pyrethrum *W.*) . . | — | 3 |
| — serotinum . . . . | — | 3 |
| SAChrysosplenium oppositifolium | — | 3 |
| SChrysostemma Tripteris *Less.* | — | 5 |
| SCimicifuga foetida *L.* . | — | 4 |
| S — Serpentaria *Pursh.* . | — | 10 |
| SCircaea alpina *L.* . . . | — | 5 |
| SRCirsium bulbosum *D. C.* | — | 3 |
| — canum *M. B.* . . . | — | 3 |
| SR— eriophorum *Scop.* . | — | 5 |
| SClematis angustifolia *Jcq.* klein | — | 2 |
| — cylindrica *Sims.* . . . | — | 5 |
| — erecta *L.* . . . . | — | 3 |
| — — hybrida . . . . | — | 5 |
| — Gebleriana *V. Htte. Cat.* | — | 5 |
| — glauca *W.* . . . . | — | 8 |
| — Hendersonii . . . | — | 8 |
| — jubata . . . . | — | 10 |
| — lasiantha *Fisch* . . | — | 10 |
| S — ochroleuca *Ait.* . . | — | 3 |
| — orientalis *L.* . . . | — | 8 |
| — Pallasii *L.* . . . . | — | 4 |
| — parviflora *D. C.* (campaniflora *Lodd.* revoluta *H. Par.*) | | 5 |
| — revoluta *L.* . . . . | — | 5 |
| — saxatilis . . . . | — | 5 |
| S — stricta *Wendcr.* . . . | — | 3 |
| H — subulosa *Tureg.* (mongolica) | | 8 |
| — verticillata? *L.* . . . | — | 5 |
| SW— Viorna *L.* . . . . | — | 5 |
| SCodonopsis lurida *Wall.* . r | — | 4 |
| H Colchicum Agrippinae . | — | 8 |
| H — autumnale *H.* Herbstzeitlose . . . . | — | 7 |
| — — album pl. . . . | — | 4 |
| — — plenum . . . | — | 5 |
| — — — violaceum . | — | 5 |
| H — autumnale *L.* (Bumbrosum *Bot. Reg.*) . . . | — | 9 |
| — bizanthinum *Gawl.* . | — | 4 |
| RF — gigantea (Polygonatum) | — | 10 |
| — patens *Schz.* . . . | — | 4 |
| *H* — polyanthum *Ker.* . | — | 10 |
| — speciosum *Ten.* . | — | 15 |
| — umbrosum . . . . | — | 10 |
| — variegatum *L.* . . | — | 5 |
| FConvallaria bracteata *Thom.* | — | 3 |
| — japonica . . . . | — | 5 |
| — latifolia *L.* . . . . | — | 3 |
| F — majalis *L.* . . . . | — | 2 |
| — — fl. albo pleno . | — | 6 |
| — — fl. rubra *L.* . . | — | 8 |
| — — fol. variegatis . | — | 6 |
| F — multiflora . . . . | — | 8 |
| F — Polygonatum *L.* . . . | — | 3 |
| — — fl. pl. . . . . | — | 3 |
| — verticillata *L.* . . . | — | 5 |
| SConvolvulus Cantabrica *L.* r | — | 10 |
| Coreopsis auriculata *L.* . | — | 3 |
| — — *L.* v. Warnieri . | — | 5 |
| Blüht fast fortwährend. | | |
| S — cardaminifolia *Engelm.* var. gracilis . . . . . | — | 2 |
| S — lanceolata *L.* . . . | — | 2 |
| S — verticillata *L.* . . . | — | 3 |
| FECorydalis cava *Schw. & Koert.* | — | 2 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| FCorydalis fabacea *Prs.* (Fumaria *Retz.*) | | 3 |
| — lutea *D. C.* . . . . | — | 5 |
| — nobilis *P.* . . . . | — | 3 |
| Cotyledon orbiculata *L.* . | — | 5 |
| RSCrambe aspera *M. B.* . | — | 10 |
| RS — cordifolia *Desf.* (glabrata) | — | 10 |
| Eine der imposantesten Rasenpflanzen. | | |
| — grandiflora *Stev.* . . | — | 15 |
| — orientalis *L.* . . . | — | 8 |
| RSCrepis sibirica *L.* . . | — | 4 |
| HCrocus iridiflorus *Guss.* . | — | 15 |
| H — sativus *L.* Saffran . | — | 5 |
| FE — vernus *All.* div. Farb. 12 St. | | 2-3 |
| Crithmum maritimum *L.* . | — | 5 |
| FSCrucianella stylosa *Wall.* | — | 3 |
| WSCuccubalus bacciferus *L.* (Silene *F.*) . . . . | — | 2 |
| RVCucumis perennis . . Perennirender Kürbis. | — | 15 |
| SCynanchum acutum *L.* . | — | 8 |
| S — florescens . . . . | — | 5 |
| S — fuscatum *Lk.* . . . | — | 3 |
| — japonicum *Lk.* . . . | — | 8 |
| S — nigrum *P.* (Asclepias *L.*) | — | 3 |
| — purpureum *R. & S.* . | — | 6 |
| — Vincetoxicum *L.* offic. | — | 2 |
| SCynoglossum furcatum *Wall.* | — | 2 |
| Cyperus badius *Desf.* (thermalis *Dum.*) Wassergras . | — | 6 |
| Cypripedium Calceolus *L.* . | — | 10 |
| WDactylicapnos thalictrifolia *Wall.* | | 10 |
| RSDatisca cannabina *L.* . | — | 5-10 |
| Eine der imposantesten und viel empfohlenen Pflanzen. | | |
| SDecumaria barbata *L.* . | — | 6 |
| SDelphinium atroviolaceum *H.* | — | 4 |
| S — azureum *Mx.* . . . | — | 2 |
| — — *Mx.* fl. pl. . . . | — | $7\frac{1}{2}$ |
| — — pictum . . . | — | 9 |
| SB— Barlowii *H.* . . . | — | 4 |
| — bruneo-maculatum . | — | 5 |
| S — cheilanthum *Fisch.* . | — | 2 |
| — elatum *L.* (palmatifid. *D.C.*) | — | 10 |
| S — elegans *D. C.* . . . | — | 10 |
| — flexuosum . . . . | — | 8 |
| S — formosum *H.* . . . | — | 6 |
| S — hyacinthiflorum *Hort.* | — | 10 |
| — intermedium alpinum | — | 10 |
| S — Iverianum albo pl. . | — | 15 |
| — — fl. coer. pl. . . | — | 15 |
| — micans *Hort.* . . | — | 5 |
| — phoeniceum *Hrt.* . | — | 6 |
| — pictum *W.* . . . | — | 3 |
| — puniceum *L.* . . . | — | 6 |
| — Requieni *D.C.* . . . | — | 5 |
| — Salvatori *Hort.* . . | — | 6 |
| — tricorne *Mchx.* . . . | — | 6 |
| — triste *Fisch.* bräunlich | — | 8 |
| FDentaria digitata *Lam.* . | — | 4 |
| — polyphylla *Goud.* . | — | 5 |
| SDesmodium canadense *D. C.* (Hedysarum) . . | — | 3 |
| — marilandicum *D. C.* . | — | 4 |
| SADianthus atrorubens *All.* | — | 3 |
| — barbatus *&* fl. pl. gemischt | — | 2 |
| A — caesius *Sm.* . . . | — | 2 |
| A — capitatus *D. C.* . . | — | 3 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| SDianthus caryophyllus L. v. Calendarum 2 versch. Farb. | — | 5 |
| — corymbiflorus . . | — | 3 |
| A — cruentus *Grieseb.* . | — | 3 |
| A — plumarius *L.* . . . | — | 2 |
| A. — Seguierii *All.* . . . | — | 3 |
| — sinensis *L* v. Hedwigii | — | 2 |
| — — giganteus . . . | — | 2 |
| — — imperialis . . . | — | 2 |
| — — — pleno . . . | — | 2 |
| — — alba — . . . | — | 2 |
| — — laciniatus . . . | — | 6 |
| — superbus *L.* . . . | — | 4 |
| — versicolor *Fisch.* . | — | 3 |
| Dielytra formosa *D. C.* . | — | 3 |
| RS — spectabilis *D. C.* (Dicentra *Bernh.* Corydalis *Prsh.*) | — | 3-5 |
| SDictamnus angustifolius *Swt.* | — | 8 |
| — caucasicus . . . . | — | 8 |
| — Fraxinella *P.* ruber, | — | 10 |
| — giganteus *Hort.* . . . | — | 30 |

Duften köstlich, sowohl die Blätter wie die rispenständigen grossen Blumen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Digitalis bicornata *Hort.* . | — | 5 |
| S — lanata *Ehbg.* . . . | — | 5 |
| — leucocaephala . . . | — | 6 |
| — nevadensis *Briss.* . | — | 5 |
| — purpurea *L.* . . . | — | 2 |

Rother Fingerhut.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — Sceptrum *L.* (Isoplexis *Ldl.*) | | 20 |
| — Thapsi *L.* . . . | — | 5 |
| S — tomentosa *Lk.* . . . | — | 3 |
| Sr Dioscorea villosa *D.* var. glabra *K.* . . . . | — | 10 |
| FDiphylleia cymosa *Mk.* . | — | 6 |
| RDipsacus laciniatus *L.* . | — | 3 |
| FDoronicum macrophyllum *Fisch.* | | 2 |
| F — orientale *Ait.* . . . | — | 2 |
| F — Pardalianches *L.* . | — | 3 |
| F — scorpioides *W.* . | — | 2 |
| Dorycenium herbaceum *Vill.* (intermedium *Ledeb*, sabaudum *Rchb.*) . . . . . | — | 5 |
| FDraba aizoides *L.* . . . | — | 6 |
| — aurea *Vahl.* . . . | — | 6 |
| F — Gmelini *Ad.* . . . | — | 6 |
| F — repens *M B.* . . . | — | 5 |
| AS — rupestris *M.B.* (hirta *Lm.*) | — | 6 |
| S Dracocephalum argunense *Fisch.* | | 10 |

Prächtig.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S — Huvrii *Hort.* . . . | — | 10 |
| — Ludovicianum *Hort.* | — | 3 |
| — pumilum . . . | — | 10 |
| AS — Ruyschiana *L.* . | — | 3 |
| — virginianum *L.* . . . | — | 3 |
| — — roseum . . . | — | 3 |
| SDrosera rotundifolia *L.* . | — | 8 |

Eine der interessantesten und zierlichsten Pflanzen, dem Fliegenfänger ähnlich, liebt wie diese sehr feucht und kühl gehalten zu werden.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| SDrypis spinosa *L.* . . . | — | 5 |
| Echinacea purpurea *Mönch.* | — | 6 |
| — serotina *D. Don.* . | — | 6 |
| RSEchinops cornigerus *D. C.* | — | 5 |
| RS — exaltatus *Schrd.* . | — | 5 |
| S — niveus *Wall.* . . . | — | 3 |
| RS — ruthenicus *Rchb.* (banaticus *H.*) | | 5 |
| RS — sphaerocephalus *L.* . | — | 3 |
| Echinops viscosus *M. B.* . | — | 3 |
| RElymus Caput Medusae *L.* (crinitus *M. B.*) . . | — | 5 |
| — daurteus *M. B.* . . | — | 3 |
| — desertorum . . | — | 10 |
| — giganteus *Vahl.* (? mexicanus *Cav.* macrostachys *Hyl.*) | — | 5 |
| — glaucifolius *Mühlbg.* | — | — |
| — sibiricus *L.* . . . | — | 3 |
| SEpilobium Doponaei *Vill.* | — | 5 |
| S — sericeum *Benth.* . | — | 4 |

Beide sehr zierlich, blühen bis zum Frost.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| FEEpimedium alpinum *L.* | — | 3 |
| — — colchicum *H. Belg.* | — | 6 |
| — — diphyllum *Lodd* (Aceranthus) . . . . . | | 4 |
| — — latifolium . . | — | — |
| — — macranthum *Lindl.* (grandiflorum *Sieb.*) . . . . | | 5 |
| — — Musschianum *Morr. & D.C.* | | 4 |
| — — pinnatum *Fischer* . . | | 6 |
| — — purpureum . . . | | 6 |
| — — rubrum *Hort. Belg.* . | | 8 |
| — — sinense . . . . | | 10 |
| — — versicolor *Hort.* . . | | 10 |
| — — violaceum *Morr. & D.C.* | | 6 |
| — — — atroviolaceum . | | 10 |

Sämmtlich sehr zierlich und dankbare, in sehr verschiedenen Farben blühende Pflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| F Eranthis hyemalis *Sal.* (Helleborus *L.*) . . . . | — | 5 |
| S Eremogene graminifolia *Fenzl.* | — | 6 |
| — longifolia *Fenzl.* . . | — | 6 |
| S Eremostachys laciniata *Bunge* (Phlomis *L.*) | | |

Mit Recht in den Gartenzeitungen empfohlen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| S Eremurus spectabilis *M.B.* (Asphodelus altaicus *Pall.*) | — | 4 |
| AS Erigeron alpinus *L.* . | — | 5 |
| S — glabellum *Nutt.* . | — | 2 |
| S — grandiflorum *Hook.* . | — | 3 |
| — speciosus *D.C.* . . | — | 3 |
| F Erinus alpinus *L.* . . . | — | 5 |
| S * Erodium caryifolium *Boiss* | — | 15 |
| * — Manescavii, *Coss.* . | — | 30 |
| A — pelargoniflorum *Boiss* . | — | 20 |
| AS Eryginum alpinum *L.* . | — | 6 |
| S — asperifolium *Delar.* . | — | 8 |
| S — foeditum *Fiseh.* . | — | 3 |
| RS — giganteum *M.B.* (asperrimum *Delarb.* glauc. *W.*) | — | 8 |
| S — Bourgati *Gouan* (amethistimum *Lam.*) . . . . | — | 6 |
| S — planum *L.* Immortelle | — | 3 |
| F Erythronium dens canis *L.* album | | 3 |
| — — purpureum . . . | — | 3 |
| — — roseum . . . . | — | 3 |
| — — violaceum . . | — | 3 |
| H Eupatorium altissimum *L.* | — | 3 |
| — aromaticum *L.* . . | — | 5 |
| H — coccineum . . | — | 3 |
| — syriacum *L.* . . . | — | 5 |
| F Euphorbia Esula *L.* . . | — | 10 |
| F — palustris *L.* . . . | — | 8 |
| Furybia angophylla *Labill* (Sporgotrichum *N. E.*) . . . | — | — |
| Falcaria Bivini *Llost.* . | — | 10 |

Thlr. Ngr.

Ferula Ferulago *L.* (nodiflora *Jacq.*) . . . . — 15
— foenicula . . . . — 10
RS — communis *L.* . . . — 10
Eine der schönsten Blattformen.
S — neapolitana *Ten.* . — 15
R — tingitana *Helm.* (F. Ferulago *L.*) 30
S Festuca arundinacea *Soul.* — 5
A — aurata *Gaud.* . . — 5
A — flavescens *Ball.* . . — 5
S Fragaria indica *Andr.* (Duchesnia) 3

Sehr zierliche Erdbeere, beständig mit hübschen Früchten bedeckt, kann als Ampelpflanze und an Spalieren, sowie zum Bedecken von Felsen benutzt werden.

F Fritillaria imperialis *L.* . — 4
F — latifolia *W.* . . . — 8
F — lutea *M. B.* . . . . — 8
— Meleagris *L.* . . . — 4
F — messanensis *Raf.* . . — 8
F — pallidiflora *Schrenk.* . — 8
F — tenella *M. L.* . . . — 10
Sämmtliche fünf, einjährige Zwiebeln.
R Francoa appendiculata *Cav.* — 10
S Funkia alba *Hort.* (subcordata Spr.) 3
E — albo marginata *Hook.* . — 6
— cucullata *Hort* fol. var. — 4
— grandiflora *v. Houtte.* . — 5
— lancifolia *Spr.* fol. var. (japonica *Hort.*) . . . . — 3
— ovata *Spr.* . . . . — 3
— Sieboldtii *Bot. Mag.* . — 5
Sämmtliche, schöne dankbarblühende Pflanzen.

S Galatella cana *Nees* . . — 3
S — leptophylla *Fisch.* . . — 10
H — punctata *W. & K.* . — 2
H — hyssopifolia *Nees.* (Aster *L.*) — 3
H — trinervis *Desf.* (rigida *Cas.*) — 3
FE Galanthus nivalis *L.* . — 1
— — fl. pl. . . . . — 1
S Galega officinalis *L.* . . 2
— orientalis *Lam.* . . . 2
— persica *Pers.* . . . — 3
Blühen bis spät in den Herbst.
Galium purpureum *L.* . — 8
S Gaura biennis *L.* . . . — 5
— Lindheimeri *Engelm.* — 5
F Gentiana acaulis *L.* . — 5
H — asclepiadea *L.* . . — 5
S — Catesbaei *Walt. Nutt.* . — 10
— Gebleri *Ledeb.* . — 10
S* — lutea *L.* . . . . — 15
S — macrophylla *Pall.* . — 5
— Pneumonanthe *L.* . . — 5
— pannonica *Scop.* . . — 10
S* — purpurea *L.* offic. . — 12
S * — Saponaria *L.* . . — 8
F — verna *L.* . . . . — 4
S Geranium aconitifolium *L'Her.* — 2
S — Endressi *Gay.* . . . — 6
— Lancastriense *Hort.* . — 2
— macrorrhizum *L.* . — 4
— phaeum *L.* var. lividum — 4
— reflexum *L.* . . . . — 5
— sanguineum *L.* . . . — 3
— sibiricum *Hort.* (nec *L.* pratense *L.*) . . . . — 2

Thlr. Ngr.

Geum aurantiacum . . — 10
* — canadense *Murray.* . — 3
S* — coccineum *Schlb. Sm.* — 5
S* — — *L.* var. atrosanguineum 6
* — japonicum *Thbg.* . — 10
— virginianum *L.* (geniculatum *Mchx.*) . . — 10
S Gillenia trifoliata *Moench.* (Spiraea *L.*) . . . . — 10
Glaucium Fischeri *Bernh.* . — 8
— squamigerum . . — 5
— tricolor *Bernh.* . . — 10
WS Glossocomia clematides *Fisch.* — 8
Glycyrrhiza dubia *Bernh.* (foetida *H. Par. Jacq.* non *Dsf.*) — 7
— foetida *Dsf.* . . — 7
S — foetidissima *F. & M.* — 8
S — glabra s. Techn. Pfl.
— glandulifera *W. Kit.* (? laevis *Pall.*) . . . — 5
— lepidota *Pursh.* . . — 6
— uralensis *Fisch.* . — 5
S Gnaphalium margaritaceum *L.* (Antennaria) . . — 2
Hübsche Immortelle.
S Gypsophila altissima *L.* . — 8
— perfoliata *L.* . . . — 3
— Rokejeka *Delil.* . — 5
— scorzonerifolia *Desf.* — 3
— Stevenii *Fisch.* . . — 3
Mit der Fülle reinweisser oder rosa Blumen auf zarten Stengeln und Stielchen, grossartig, höchst reizend.
R Gynerium argenteum *N. ab Es.* 10
Ein imposantes Gras.
W Hablitzia tamnoides *M. B.* — 6
S Hedysarum alpinum *L.* . — 5
— altaicum *Fisch.* . — 5
— elongata *Fisch.* . . — 4
H Helenium autumnale *L.* . — 3
H — pumilum *W.* . . — 2
S F Helianthemum roseum *DC.* — 5
S — Fumana *Mill.* . . — 6
— vulgare pl. . . . — 5
— — diverse gemischt . — 3
R H. Helianthus angustifolius *Mx.* — 4
RH — altissimus *L.* . . — 5
Eine sehr ansehnliche Pflanze.
RH — decapetalus *L.* . — 3
— giganteus *L.* (altiss. *Jcq.*) — 5
H — laetiflorus *W.* (atrorubens *L.*) 3
RS — Maximiliani *Schr.* . — 3
RH — orgyalis *D. C.* . . — 5
Sämmtliche Blätter der 8-10 Fuss hohen Pflanze sind gekrümmt, zu Boden geneigt, so dass die Büsche gleich einer Menge regelmässiger Säulen emporragen.
— rigidus *Desf.* . . — 3
— strumosus *L.* . . . — 3
F — tuberosus *L.* . . . — 5
*Helleborus albicans . . — 15
— angustifolius *Hrt.* . — 5
F* — antiquorum *A. Br.* . — 24
— atrorubens *W. & K.* (atropurpureus *Schult.* odorus *B K.*) — 6
— chinensis . . . — 15
E — colchicus *Rgl.* . . — 30
— cupreus *Hort.* . . — 6
— dumetorum *W. & K.* — 4

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Helleborus graveolens *Hort.* | — | 5 |
| — guttatus *A. Br. & Lam.* | — | 20 |
| — lividus *Ait.* | — | 4 |
| — niger *L.* officinell | — | 5 |
| — — *L.* v. grandifl. | — | 10 |
| — olympicus *Lindl.* | — | 8 |
| — pallidus *Hort.* | — | 3 |
| — pedatus | — | 12 |
| — purpurascens *Krt.* | — | 8 |
| — ruber *Hort.* fl. pl. | 1 | — |
| — sp. e Abchasia | — | 10 |
| — viridis *L.* | — | 2 |

H. niger zeigt seine grossen weissen Blumen meist schon zu Weihnachten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| SHemerocallis chinensis *Hort.* | — | 4 |
| — disticha *D. Don.* | — | 4 |
| S — Dumortieri v. H. (rutilans) ? | | 5 |
| S — flava *L.* | — | 2 |
| — fol. striatis | — | 10 |
| S — fulva *L.* | — | 2 |
| S — graminea *Andr.* | — | 2 |

Duftend, herrlich, besonders graminea.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — undulaepetala | — | 20 |
| SRHeracleum auritum *Lehm.* | — | 5 |
| — cordatum *Presl.* | — | 4 |
| — dissectum *Ledeb.* | — | 3 |
| RS — flavescens *W.* | — | 3 |
| — granadense *Boiss.* | — | 5 |
| — palmatifidum *Fisch.* | — | 5 |
| — Panaces *L.* (setosus *Lap.*) | — | 5 |
| — persicum *H. Pav.* | — | 2 |
| — pubescens *M. B.* | — | 3 |
| — pyrenaicum *Lam.* | — | 3 |
| — sibiricum *L.* | — | 3 |
| — Wilhelmsii *Fisch. & Lall.* | — | 2 |

Riesige Pflanzen mit herrlichen Blättern und nicht unansehnlichen Blüthen ausgezeichnet als Rasenpflanzen.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hesperis matronalis fl. albo pl. *L.* | — | 4 |
| — — tristis *L.* | — | 2 |

Besonders letztere duftet herrlich.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| SHibiscus Moscheutos v. roseus | — | 10 |

Grossblüthig s. schön.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| — palustris L. | — | 6 |
| — roseus *Thore.* | — | 6 |

Stattliche Pflanzen mit grossen Blumen, die als Rasenpflanzen benutzt werden können; sonnig und feucht zu halten.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| ASHieracium albidum *Vill.* (intybaceum *Wulf.*) | — | 5 |
| FSHieracium aurantiacum *L.* | — | 3 |
| — glaucum | — | 3 |
| SEHoteia japonica *Morr. & Dc.* (Spiraea *Thbg.*) | — | 2 |
| FHydrophyllum virginicum *L.* | — | 2 |
| Hyoscyamus orientalis *M. B.* | — | 5 |
| — physaloides *L.* | | |
| SA Hypericum boeoticum *Boiss.* | | 5 |
| S — pyramidatum *Ait.* (amplexicaule *Lam.*) | — | 5 |
| Hyssopus officinalis *L.* (Schleicheri *G. Don.*) | — | 5 |
| SE Iberis Carrexiana *All.* | — | 3 |
| SE — saxatilis *L.* | — | 3 |
| Imperatoria Ostruthium *L.* | — | 10 |
| Inula germanica *L.* | — | 2 |
| RS — Helenium *L.* off. | — | 3 |
| S — verbascifolia *Poir.*) thapsoides *Poir.*) | — | 2 |
| SIris anglica *Hort.* (xiphioides *Ehrh.*) prachtvoll | — | 2 |
| F — arenaria *W. & K.* | — | 3 |
| S — aurea *Lk.* | — | 3 |
| — biglumis *Vhl.* (spuria *Spch.*) | — | 3 |
| S — Blandowii *Ldb.* | — | 3 |
| S — conglomerata | — | 3 |
| S — constantinopolitan. *Hort.* | — | 3 |
| — Charmeznii | — | 3 |
| — decutanum | — | 3 |
| — flexuosum furcata *M. B.* | — | 3 |
| — foetidissima *L.* | — | 6 |
| S — fragrans *Salisb.* | — | 3 |
| — germanica fl. alba *L.* | — | 3 |
| — — fl. coerulea *L.* | — | 3 |
| — — germanica *L.* | — | 2 |
| — — Agathe | — | 4 |
| — — Alma. | — | 5 |
| — — Apollon. | — | 5 |
| — — Ariadne. | — | 3 |
| — — Aristote. | — | 5 |
| — — Choisine. | — | 5 |
| — — Confucius. | — | 4 |
| — — Cornelie. | — | 5 |
| — — Hericard. | — | 4 |
| — — Nemesis | — | 3 |
| — — Saturne | — | 5 |
| — — Sultane | — | 5 |
| — — tricolor | — | 5 |
| — — Van Gaerthii | — | 5 |
| — — Virgine | — | 4 |
| — — Wallner | — | 5 |
| — Güldenstaedtiana *Lep.* | — | 2 |

à Stück 3 Ngr.

SIris haematophylla *F.*
S — halophylla *Pall.*
S — iberica *Stev.*
S — italica.
S — japonica *Thbg.*
S — laevigata *Fisch.*
— livida *Tratt.*
— maculata.
S — maritima *Mill.*
S — Matthioli *Tausch.*
— mongolica *Fisch.*
S — Monnieri *Red.*
— multiflora.
— neglecta *Hrn.*
— notha *M. B.*
S — nudicaulis *Lam.*
— ochroleuca *M. B.*
SIris pallida *Lam.*
— pluviale.
S — pomeridiana *Fisch.*
FE — pumila *L.* coerulea.
FE — — *L.* fl. violaceo.
F — — *L.* var. versicolor.
— prismatica *Pursh.*
S — Redouteana *Spach.*
*F — reticulata *M. B.* 1j.
— rigida.
S — sambucina *L.*
— sibirica var. leucanth.
S — sordida *W.*
— squalens *L.*
— — flavescens 4 Ngr.
— Schmidti.
— stenogyna D. C.
Iris Swertii *Lam.*
— tridentata *Pursh.* (tripetala *Elt.*)
— triflora *Balb.*
— variegata *L.*
— verna *Pursh.*
S — versicolor *L.*
— virescens *Red.*
S — virginica *L.*
S — Xiphioides *Ehr.* (Xiphium *Jcq.* angelica *H.*)
S — Xiphium *L.* (hispanica *H.* variabilis *Jcq.*)

Die durch Farbenpr. ausgez. Art., bes. Xiphium, s. wechs., so dass selt. 2 ganz gleiche auf 1 Beete vork.

Thlr. Ngr.
FJeffersonia diphylla *Bart.* — 5
RSKitaibelia vitifolia *W.* . — 5

Wegen raschen Wuchses nnd riesiger Dimensonen zum Ausfüllen der Lücken in Gruppen sehr anwendbar.

SLactuca perennis *L.* . — 3
SLamium Orvala *L.* . — 8
RLappa edulis *Sieb.* (L. major?. — 10
Riesiger Stellvertreter der Mohrrübe.
— ferox *W. & K.* . — 3
— Kotschii *Boiss.* . — 3
Laserpitium glabrum *Koch* (Libanotis *Lam.*) . . — 5
— Siler *L.* . . . . — 5
SLasiagrostis *Lk.* (argenteum *P. B.*) Schönes Gras. . . 8
Lathyrus californicus *Dougl.* r — 10
S — giganteus roseus *Hort.* r — 10
— grandiflorus *Sims.* . — 4
— incana . . . . — 5
— Lanzyi . . . . — 5
WS — latifolius *L.* . . . — 6
— magniflorus . . . — 5
— oroboides *E. Mey.* . — 5
WS — rotundifolius *W.* . — 6
— tuberosus W. essbare Wurz. 5
Lavandula Spica *L. W.* vera *D. C.* (officinalis *Cchaix.* angustifolia *Ehrh.*) . . — 3
SALeontopodium alpinum *Cass.* — 10
SR Leuzea carthamoides *D. C.* — 5
S*Liatris graminifolia *W.* — 10
— odoratissima *W.* . — 5
*S — spicata *W.* B. macrostachya *Mchz.* . . . — 15
Ligularia altaica *D. C.* . — 5
— Fischeriana . . . — 6
RS — macrophylla *D. C.* (Cineraria *Ledeb.*) . . . — 6

Die Pflanze sowohl durch prachtvolle Belaubung, als dicke goldgelbe Rispe ausgezeichnet.

— sibirica *Cass.* . . . — 5
RS — speciosa *Fisch.* . — 6
Ligusticum alatum *Spgl.* (Cnidium myrrhifolium *M. B.*) — 5
— Seguierii *Koch.* . — 5
SHLinaria Cymbalaria *L.* . — 2
— — fol. arg. var. . — 8

Hübsche Ampelpflanzen, auch geeignet zum Beziehen von Felsen und alten Mauern.

SA — origanifolia *D. C.* . — 3

Sehr zierlich.

S purpurea *Mill.* . . . — 2
Linosyris vulgaris Cassin. *D. C.* (foliosa *Cass.* Chrysocoma Linosyris *L.*) . . . — 5
Linum alpinum *Jacq.* . . . — 5
SA — flavum *L.* . . . — 5
— Levisii *Pursh.* B. . — 6
— perenne *L.* . . — 3
— variegatum . . — 10
SHKLobelia cardinalis *L.* . — 3
— Etoile du matin *Hort.* — 5
— Limburgensis *Hort.* — 3
— texensis *Raf.* (cardinalis var. atrosanguinea *Hort.*) — 5

Thlr. Ngr.
Lobelia Vierge Marie . . — 5
— Vulcain *Hort.* . . — 5
SLupinus arboreus *W.* (fructicosus *Curt.*) . . . — 4
SH*— Hartwegii *Lind.* . — 3
S — Marshallianus *Swt.* . — 3
S — variegatus *Fisch.* . — 4
FALychnis alpina *L.* . . — 10
— coronaria *Desv.* . — 4
S — chalcedonica rubra pl. — 10
Wurzel liefert die Tartarenseife.
S — dioica *L.* fl. rubro pl. — 3
S — flos Cuculli *L.* alba pl. — 6
* — Haageana *Hort.* . — 12
Eine prachtvolle Hybride.
* — Sieboldii *V. H.* (grandiflora alba *Sieb.*) . — 7
— Viscaria *L.* rubra pl. — 3
— — *L.* splendens . — 2
Sämmtlich prächtige Pflanzen.
SLysimachia ciliata *L.* . — 3
— Dyrsifolia? . . — 3
— Ephemerum *L.* (salicifolia *Mill.*) . . . . . — 5
— punctata *L.* . . — 2
— thyrsiflora *L.* . . — 5
— verticillata *Pall.* . — 4
Lythrum myrtifolium *Sivert.* — 3
— ramosissimum (amannia?) 3
S — Salicaria *L.* . . . — 2
— tomentosum *Mill.* . — 2
— virgatum *L.* . . — 3
Lieben feuchte Stellen, sind langblühend und schön.
S Malva Alcea L. . . — 6
— Morenii *Poll.* (albulensis *Cav.* Alcea *L.* var. *D. C.*) . — 5
RMagydaris tomentosa *K.* (Cachrys panacifolia *Vahl.*) . — 15
Mandragora vernalis *D. C.* Alraunwurzel, Springwurzel, s. technische Pfl.
SMelica altissima *L.* . . — 5
Hübsches Gras.
S — Magnolii *Gr. & Godr.* — 3
— pyramidalis *Desf.* — 3
Melittis grandiflora *Sm.* — 5
S— Melissophyllum *L.* — 3
Melissa Calamintha *L.* — 3
— Nepeta ; . . . — 4
— officinalis *L.* (corsica *Hort.*) 3
Schöne, duftende Schattenpflanze.
Mentha crispa *L.* . . — 2
— crispata *Schrad.* (cordifolia *Opiz.*) . . . — 5
— piperita *L.* . . . — 4
— Requieni *Benth.* . — —
— sylvestris *L.* . . — 3
— undulata *W.* (crispa *Tenore.* dulcissima *Dumort.*) — 5
— viridis *L.* (balsamea *Rchb.* glabra *Mill.*) . . — 5
S— rotundifolia *L.* fol. var. — 2
Liebt Feuchtigkeit; recht hübsch.
SMeum athamanticum *Jcq.* — 5
Blätter hübsch.
S*Michauxia campanulata *Juss.*— 5
Eine der brillantesten Glockenblumen.
S* Mimulus moschatus *Dougl.* — 2
Moschuspflanze; feucht.

Thlr. Ngr.

Moehringia muscosa *L.* . — 5
Molinia coerluea *Mch.* (var. *Schreck.*) . . . . — 5
SMonarda didyma . . — 5
S— fistulosa *L.* (purpurea *Pursh.*) . . . . . — 3
— Kalmiana *Pursh.* . . — 2
Riechen sehr angenehm.
S* Morina longiflora *D. C.* . — 8
RS Mulgedium floridanum (Sonchus *L.*) 5
S — hispidum *D. C.* . . — 3
— Lindheimerianum *Engelm.* — 3
— macrorhyzum *Royle.* — 5
— Plumieri *DC.* . . — 3
Lieben Schatten; recht hübsche Pflanzen.

FMuscari botryoides *Mill.* (Hyacinthus *L.*) . . . — 3
— comosum *Mill.* (Bellevala) — 5
— minus *Fisch.* . . — 5
S— racemosum *W.* . . — 5
FSMyosotis alpestris *Schm.* — 6
— — fl. albo (lactea *Böningh.*)— 3
Sehr wohl als Einfassung zu benutzen, blüht sie vom Frühjahr bis Spätsommer ausserordentlich dankbar.

RSNapaea-laevis *L.* (Sida Nap. *Cav.*) 10
Stattliche Rasenpflanze.
FNarcissus biflorus *Curt.* — 3
— incomparabilis *Mill.* — 1
— Jonquilla *L.* . . — 1
— — fl. pl. . . . — 1
— montanus *Ker.* . . — 2
— poeticus *L.* . . . . — 1
— — fl. pl. . . . . — 2
— Pseudonarcissus *L.* fl. pl. — 1
— radiiflorus *Sal.* . . — 5
SNepeta grandiflora *M. B.* (colorata *W.*) . . . . — 3
S— macrantha *Fisch.* (Dracocephalum sibiricum *L.* — 3
S— tuberosa *L.* . . . . — 3
— violacea *L.* . . . . — 2
FENordmannia cordifolia *Benth.* (Borrago orientalis *L.*) — 3
Eine der frühestblühenden schönen Pflanzen. blau mit weiss.
SObeliscaria aurantiaca (Rudbeckia) 8
S— pulcherrima (Rudbeckia *DC.*) 6
Oenanthe crocata *L.* . . . — 5
— pimpinelloides *L.* (chaerophylloides *Pour.*) . . . — 6
SOenothera cuprea . . . — 3
S— Fraseri *Pursh.* . . . — 4
— fruticosa *L.* . . . . — 5
— missouriensis *Sims.* (macrocarp. *Pursh.*) . — 4
Sehr grossblumig.
SOmphalodes longiflorus *DC.* — 3
FE— verna *Mchx* (Cynoglossum Omph. *L.*) . . . — 2
SOnonis Natrix *L.* . . . — 5
— rotundifolia *L.* . . . — 6
Onopordon Acanthium *L.* (macrocanthum *Schult.*) . . . — 5
RS— illyricum *L.* . . . — 3
SR — tauricum *W.* . . . — 5
— virens *DC.* (elatum *Sm. Sbth.*) . . . . — 5
Schöne Blattpflanze.

Thlr. Ngr.

Ornithogalum galegiformis. — 6
— tenuifolium *Redoute.* — 6
F— sulfureum *R. & S.* 1jährig. — 6
RF Opopanax Chironium s. techn. Pfl.
Orobus angustifolius *L.* . — 8
S*— atropurpureus *Desf.* . — 5
— aurantiacus *Stev.* . — 6
S — aureus *Stev.* . . . . — 8
F — canescens *L.* . . . — 3
F — digitatus *M. B.* . . . — 8
F — flaccidus *Kit.* . . . — 3
S — lathyroides *L.* var. Smouthii 5
F — lilacina *Hort.* . . . 3
F — Menghalii *Hort.* . . . 4
S — niger *L.* . . . . . . 4
— ochroleucus *W. K.* . . 6
F — repens *Hort.* . . . . 3
F — roseus grandiflorus *Hrt.* (vernus *L.* var.) . . . . . 5
F — stenophyllus *Steud.* . . 6
FA— variegatus *Ten.* . . . 5
— venetus *Mill.* . . . 3
— venosus *W.* (paucifl. *Hort.*) 6
— vernus *L.* . . . . . 2

ROriganum Onites *L.* . . . . 3
Oxytropis argyrea *Fisch.* . . 5
FPachysandra procumbens *Mx.* . 5

Im Blühen einer der ersten, und wenn gleich nicht schön, doch herrlich duftend.

SPaeonia albiflora *Pall.* (edulis *Salisb.* Pottsii *Sab.* sinensis *Hort.*) . 5
— arietina *Anders.* . . . 5
— chrysanthemiflora. . . 7
— Duchess de Nemours . . 7
— elegans superba *Buyck.* . 6
— lutea variegata *Guérin* . 8
— intermedia *C. A. M.* . 4
— mutabilis . . . . . 6
— Napoleon . . . . . 5
— nec plus ultra *Talot.* . . 6
— officinalis *L.* carnea pl. . 3
— peregrina *Mill.* (compacta) 5
— prolifera tricolor *Lemon.* . 7
— pulchella pl. . . . 8
— pulcherrima . . . 6
— Reveesii *Sab.* . . . 6
— tenuifolia L. . . . 5
— Victoria Modeste *Guérin.* 8
— Witleyi rosea *H. Ang.* (albiflora Pall. var. *J. Booth.*) . 8

SPapaver alpinum *L.* gelb — 5
— bracteatum *Lindl.* — 5
— croceum *Ledeb.* orange — 8
S — hispidum *Desf.* . — 3
RS — involucratum *H. Jen.* — 5
RS — maculatum superbum *Hort.* 12
— nudicaule *L.* . . . — 5
RS — orientalis *L.* . . . — 5
S — pinnatifidum *Mor.* . — 4
Die mit RS. bezeichneten sind die leuchtenden und grössten, erstere scharlach, letztere zinnoberroth s. grossbl.

S*Pardanthus chinensis *Ker.* — 6
Eine s. schöne Schwertlilie.
FParietaria diffusa *N. & K.* (judaica *Auct.*) . . — 5
Pascalia glauca *Orteg.* . — 8

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Peganum Harmala *L.* (crithmifolium *Retz.*) . . . . | — | 8 |
| FPeltaria alliacea *L.* . . . | — | 5 |
| *Pentstemon acuminatus *Dougl.* | — | 3 |
| S — Alfred Pellier *Lam.* | — | 8 |
| Violett, Schlund weiss, carmois. gead. | | |
| K — Arthur . . . . | — | 7 |
| K — atrocoeruleum . . . | — | 5 |
| K — barbatum *Nutt.* (Chelone) | — | 5 |
| K — — fl. albo . . . . | — | 6 |
| — Bradburii *Pursh.* (grandiflorum *Fras.*) . . . . | — | 3 |
| K — campanulatus W. *Ait.* | — | 5 |
| K — claussii *H. Belg.* . | — | 6 |
| K — Comte de Lamberty | — | 8 |
| K — Comtesse de Ramberg | — | 5 |
| — congestus . . . . . | — | 3 |
| K — fruticosus, *Booth.* (Hartwigii *Benth.* Colvilli *Hort.* gentianoid. *Lindl.* non *G.Don.* (coccinea *Hffg.* puniceus *Lilga*) | — | 5 |
| K — gentianoides *G. Don.* (Chelone gent. *H. B. K.*) . | — | 5 |
| K — — *a* albus *Hook.* . | — | 5 |
| K — — *b* coccineus . . | — | 6 |
| K — — *c* elegans . . . | — | 5 |
| — giganteum elegans *Hort.* | — | 5 |
| — glandulosus *Dougl.* . | — | 3 |
| K* — glaucus *Grah.* . . . | — | 5 |
| — gracilis *Nutt.* . . , | — | 3 |
| K — Isis *Salters.* . . . | — | 8 |
| — laevigatum *Ait.* . | — | 3 |
| K — Lemoinei . . . . | — | 3 |
| K — magniflorus . . . | — | 6 |
| K — Mme. Godin . . . | — | 8 |
| K — mon caprice *R.* . . . | — | 8 |
| RSHK — Murrayanum *Hook.* verus! Der prachtvollste von allen. | | 12 |
| — ovatus *Dougl.* . . . | — | 5 |
| s. früh blühend. | | |
| RSH — perfoliatus *A. Brogn.* (connatus *Deppe.*) . . . | — | 5 |
| * — procerus *Dougl.* . | — | 5 |
| K — purpureus hybridus . | — | 5 |
| K — premices de Rantier | — | 6 |

## Phlox.

Die besten älteren, und neueren Züchtungen.

niedrige zu Einfassungen.

Sämmtlich reich und frühblühend.

| | Ngr. |
|---|---|
| Phlox canadensis *Sw.* (divaricata *L.*) | 4 |
| — frondosa *Hort.* . . . . . | 8 |
| S Phlox *L.* . . . . . . . | 3 |
| — pilosa *L.* (canadensis *Hort.*) . | 3 |
| — procumbens *Lehm.* (setacea *L.*) | 5 |
| — reptans *Mch.* (stolonifera *Curt.*, prostrata *Ait. fil.*) . | 5 |

## Phlox decusata, Varietäten, hohe späterblühende, à 3 Ngr.

2 admirabilis *Fontaine.*
3 Amelie Ferry *Lierval.*
5 Brillant *W.*
5 Comtesse de Rudepont *Lem.*
7 crépuscule *Font,*
8 de Lademelle.
11 Kramer.
14 Mme. Bis *Lem.*
16 Mlle. Judith *Lem.*
17 — Lecerf *Lem.*
18 — Lemichez *Lem.*
19 — Mathilde.
20 magnificent *Font.*
21 Mr. Bodier *Lem.*
9 — Devonchez *T.*
22 — Herincq *Font.*
23 — Gros *Lem.*
24 — Guézon Duval *Lem.*
25 — Guldenschuh *Lem.*
26 — Margontin *Font.*
27 — Sancerotte.
28 — Vidal *D.*
29 — Zimmermann *W.*
30 purpurea superba *Font.*
32 Roi Leopold.
34 Souvenir de l' 29. Octobre *Lem.*
36 — d'un ami *T.*
31 virginiana.
35 Wilhelm Scheurer *R.*

## Neue, à $7^1/_2$ Ngr.

38 Absalon *Hook.*
39 Ami Rendatler *W.*
40 Claire de Pruines *Rend.*
41 Croix de St. Louis *Lem.*
42 Dilschneider *Rend.*
44 Freund Rücker.
45 Helène Gaynel.
47 Imperatrice Eugenie *Baron.*
59 John Salters.
48 Oriental *F.*
49 la Vestale *Font.*
51 Mlle. Fontaine.
57 Mme. Godin.
58 — Sonntag.
33 Mr. Roger *Rend.*
54 Schneeball.

## Neueste Phlox.

Eigene Zucht; hübsch gezeichnet, erinnern sie an die Browallien, durch stattliche Rispen mit einer Fülle von Blumen ausgezeichnet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| 61 Arminius, *Gtn.*, rosalila mit weiss. Stern. dunkel gerandet . . | — | 10 |
| 62 Arndt, *Gtn.*, lila, innen weiss . . . . . . . . . | — | 10 |
| 65 Bart, *Gtn.*, roth, Mitte des Kronenwipfels heller . . . . . | — | 10 |
| 63 Beethoven, *Gtn.*, lila m. w. St. Mtt. d. Krwpfl. dkler gestr. grossbl. | — | 10 |
| 64 Berthold, *Gtn.*, schwarz, rosa lila, innen strahlig, heller, grossblumig | — | 10 |
| 65 cinerea, *Gtn.*, fast aschfarb. Schlund weiss mit dunkleren Streifen | — | 10 |

| | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 67 | Diesterweg, *Gtn.*, hellrosa, innen weiss mit rothen Streifen, sehr schön | — | 20 |
| 68 | Dowe, *Gtn.*, rosa violett, nach innen heller, Schlund dunkler . | — | 10 |
| 69 | Gluck, *Gtn.*, rosa, nach innen heller, roth gestreift . . . . . | — | 10 |
| 71 | Goethe, *Gtn.*, dunkelrosa, über dem Schlunde dunkel gefleckt . | — | 10 |
| 70 | Graun, *Gtn.*, rosa, s. sch. w. gest., Kronenwpf. dkl. gernd. u. gestreift | — | 20 |
| 72 | Haendel. *Gtn.*, purpur, s. zart, weiss gestreift, Centrum roth . . | — | 20 |
| 74 | Kaulbach, rosa und dunkelrosa veränderlich . . . . . . | — | 10 |
| 75 | Moser, *Gtn.*, rosa, Mitte dunkel, gross . . . . . . . . . . | — | 20 |
| 76 | Overweg, *Gtn.*, rosa, innen dunkler . . . . . . . . . | — | 10 |
| 77 | Pfeffel, *Gtn.*, gleicht fast Nr. 67, jedoch dunkler . . . . . . | — | 20 |
| 78 | Schiller, *Gtn.*, lichtrosa mit dunkler Aderung, grossblumig . . . | — | 20 |
| 60 | Thelemanni *Gtn.* (striata formosissima) mlchw. rs. viol. punkt. & gstr. grbl. | 1 | 20 |
| 77 | Tiedge, *Gtn.* hellrosa mit dunk. Flecken . . . . . . . . . | — | 10 |
| 80 | Vogel, *Gtn.* rs. m. dkl. St. & Fleck Schlund milchwss. s. gross. . | — | 20 |
| 81 | Waterloo, *Gtn.* lila, weiss & rosa gezeichnet, gross. . . . . . | — | 20 |
| 82 | Wieland. *Gtn.* rosa mit dunkl. Streif . . . . . . . . . . | — | 10 |
| 83 | Wolf, *Gtn.* rosa innen heller . . . . . . . . . . . . . | — | 10 |

Ngr.

SPhysalis Alkeckengi *L.* Judenkirsche, officinell . . . . 2
SPhysostegia imbricata *Hook.* (Dracocephalum) . . . . . 3
— virginica *Benth.* . . . . 3
Blühen noch im Spätherbst.

ASPhyteuma campanuloides *M.B.* 5
SPityrosperma acerifolium *Sieb.* . 15
SPlumbago Larpentae *Lindl.* . 3
SPodophyllum peltatum *L.* . . 4
SPolemonium boreale . . . . 2
S — coeruleum *L.* . . . . 2
SA — montanum . . . . . 3
EF*— pulchellum *Hook.* . . . 5
SAPolygonum alpinum *All.* . . 3
*S* — Bistorta *L.* liebt feucht, kann jedoch auch sonnig, trocken steh. 3
— salignum *W.* . . . . . 4
— sericeum *Pall.* . . . . 2
*S* — Sieboldii . . . . . . 10
Potentilla alba *L.* . . . . . 4
*S* — amabilis . . . . . . 4
— atropurpurea . . . . . 3
— atrosanguinea *Don.* nova . 5
— — Fintelmanni *Hort.* . . 3
— — Russeliana *Lindl.* . . 3
*S* — aurantiaca pl. . . . . 10
F — aurea *L.* . . . . . . 4
— Bainesi . . . . . . 5
— bicolor . . . . . . . 5
— Brauneana *Hoppe.* (minima *Hall. fil.* frigida B *P.* verna p. *D. C.*) 5
*SA*— caulescens *L.* . . . . 8
— coccinea semipl. . . . . 5
— eximia . . . . . . 3
*S* — geoides *M. B.* . . . . 5
— Gesneriana . . . . . 5
— grandiflora . . . . . 4
— Hopwoodiana *Sw.* (hybrida) 5
— Luciae . . . . . 5
*S* — lutea pl. . . . . . 10
— Mac-Nabiana *Hrt. Angl.* . 3
— Menziessii *Hort.* . . . . 5
— miniata . . . . . . 5
— nepalensis *Hook.* . . . . 3
*SA*— nivalis *Torr.* . . . . 6
— ochracea . . . . . 3
— Oliveriana . . . . . 5
— Oswaldiana . . . . . 5
— picta . . . . . . 5
— purpurea . . . . . . 5
— Queen Victoria *Hort.* . . 5

Ngr.

Potentilla reptans *L.* fl. pl. . . 2
Sowohl als Ampelpflanze, wie zum Beziehen niedriger Gruppen sehr empfehlenswerth.
— resplendens . . . . . 5
— rupestris *L.* rein weiss . 3
*S* — — *L.* v. grandiflora . . 5
— sanguinea . . . . . 4
— Smouthii . . . . . . 4
— striata formosissima . . 8
— vulgaris superba . . . 6
Vereinigt bilden sie Gruppen, die durch Farbenpracht wie Blüthenreichthum während der Zeit vom Juni bis Spätherbst das Auge erfreuen.

Prenanthes purpurea *L.* . . . 5
FEPrimula acaulis *L.* Cerise pl. . 30
— — alba pl. . . . . . 20
— — lilacina pl. . . . . 24
— — rosea pl. . . . . . 6
— altaica *Lehm.* . . . . 5
—* Boveana *Decaisn.* (involucrata *Swt.*) . . . . . 5
— Auricula *L.* . . . . . 2
— ciliata *Schrk.* . . . . . 5
— cortusoides *L.* . . . . . 6
— denticulata *L.* . . . . . 5
— erosa *Wall.* . . . . 8
— farinosa *L.* liebt Sumpf. . 8
— inflata *Lehm.* (macrocalix *Bunge.*) . . . . . . 2
— integrifolia *D. C.* . . . . 4
F*— scotica *Hook.* . . . . . 5
— verticillata *Forsk.* (involucrata *Hort.*) . . . . . . 5
*— villosa *Jacq.* . . . . . 10
Herrliche Frühlingspflanzen, sowohl zur Felsenbepflanzung, als zur Einfassung brauchbar.

Pulmonaria montana *Lej.* (tuberosa *Schrank* angustifolia *L.* . . . 5
— mollis *Wolff.* (media *Hort.*) . 5
— saccharata *Mill.* (grandiflora *D. C.*) . . . . . . . 5
Pulsatilla Halleri W. (All.) . . 10
— montana *Rchb.* (Anemone intermedia *Hopp.* . 10
— vernalis *Mill.* . . . . 8
FPyrethrum Balsamita *W.* (Balsamita suaveolens *Desf.*) . . . . 2
— carneum *M. B.* . . . . 5

Ngr.

Pyrethrum carneum purpureum . 5
— corymbosum W. . . . . 3
— Delhayi . . . . . 5
— Duchesse de Brabant . . 5
— fistulosa pl. . . . . . 6
— macrophyllum W. . . . . 5
— Model fl. pl. . . . . . 10
— Mülleri . . . . . . 6
— niveum Lagasc.. (parthemifolium M. B. pulverulentum W.) . 8
— roseum M. B. . . . . 4
— Themisterii . . . . . 4
— Tom Pouce . . . . . 5
— uliginosum W. K. . . . . 6
— Vilmorin fl. pl. . . . . 10

Sämmtlich schön blühend, oft vom Juni bis Spätherbst; liefern das persische Insectenpulver.

SF Ranunculus acris fl. pl. . . 2
— caucasicus M. B. . . . 6
S — gramineus L. . . . . . 4
— millefoliatus Vahl. . . . 5
Die schönsten der goldgelben.
S*— monspeliacus L. B cuneatus 10
MS — pedatus W. & K. . . . 3
— repens fl. pl. L. . . . 2
— tuberosus Lapey. . . 4
SRehmannia sinensis F. & M. (glutinosa Liebosch.) . . . 7
SReseda undata L. . . . . 5
SRRhaponticum cairnatum . . 6
S — cynaroides Less. . . 8
— pulchrum Fisch. . . . . 3
Rheum australe D. Don. (Emodii Wall.) . . . . . . . 10
— compactum L. . . . . 8
— crassinervium Fisch. . . 10
RS — crispum Ledeb. . . . . 6
— Emodi Wall. (australis D. Don.) 10
— giganteum . . . . . 20
— leucorrhyzon Pall. . . . 6
— macropteron L. . . . . 6
— nepalense . . . . . 10
— Myatto Queen . . . . 10
— palmatum L. . . . . 10
— Rhaponticum L. (sibiricum Pall.) . . . . . . . . 8
— rugosum Def. . . . . 10
— sibiricum Pall.? . . . . 6
— speciosum . . . . . 10
— tataricum L. . . . . 8
— tauricum Hort. . . . . 10
— tetragonopus Mart. . . . 6
— tetragonum . . . . . 10
— undulatum L. . . . . 8

Officinell (Rhabarber), sind durch prächtige Blätter nicht weniger, als durch stattliche Blüthenrispen zu Rasenpflanzen geeignet; die jungen, noch gelben Blätter werden von den Engländern sehr geschätzt, zumal es das früheste Gemüse ist.

SRhexia virginica L. . . . . 8
FRhodiola rosea L. . . . . 6

Wurzeln duften nach Rosen.

Rubia peregrina L. (anglica Huds.) 10
FRubus articus L. . . . . . 10

Sehr zierlich; liefert die köstlichste Frucht des Nordens.

Ngr.

SRudbeckia Drummondi Pax. . 5
RH — digitata Mill. . . . . . 3
SR — fulgida Ait. . . . . . 4
S — hirta L. . . . . . 3
RH — laciniata L. . . . . . 2
— moschata Lodd. . . . . 3
S — Neumanni . . . . . 6
S — nitida Agh. . . . . . 5
SRuellia strepens L. (v. Acanthac.) 5
Rumex alpinus L. . . . . 3
— obtusifolius L. . . . . 3
— scutatus L. . . . . . 5
SSaccharum strictum Spgl. (Erianthus strictus Trin. non Ell.) . 3
Sagina saxatile . . . . . 6
Salicornia fruticosa L. . . 5
RS*Salvia argentea L. . . . 6
* — azurea Lam. . . . . 5
* — — Lilleana Hort. . . . 5
K — albo-coerulea Ldl. . . . 5
S — barbata alba . . . . 10
— bracteata Russel. . . . 5
K — boliviana H. v. H. . . . 5
K — Candelabrum Boissc. . . 6
RS — candidissima Vahl. (crassifolia Sibth.) . . . . . . 5
K — gesneriflora H. v. H. . . 5
K — Grahami Benth. . . . . 5
— gigantea Hort.. . . . . 5
K — Heerii Regl. . . . . 5
K — ianthina Lk. & C. . . . 5
K — involucrata Cav. . . . 5
K — Lambioni . . . . . 4
K — Littae Vis. . . . . . 5
— officinalis fol. varieg. L. . 5
R — patens Cav. Benth. (macrantha Schlechtd.) . . . . . 5
— pendula Less. non Vahl. (nutans L.) . . . . . . . 5
— pomifera L. (fragifera Ell.) 5
K — porphyrantha Dcne. . . . 2
— rubra Spgl. . . . . . 5
RS — Sclarea L. . . . . . 4
K — splendens Ker. Souvenir de Crauchaut . . . . . . 6
* — tricolor . . . . . . 10
— variegata W. K. . . . . 6
— verticillata L. . . . . 5

S. argent., bract. & Sclarea sind herrliche Rasenpflanzen, sowohl durch silberfarbige Blätter, als die anders gefärbten prächtigen Blüthendeckblätter.

Die übrigen mit Ausschluss von gigantea (letztere besser im Kalth. überw.), blühen im Sommer in Freilandgruppen sehr dankbar, die i. S. nichtblühenden entwickeln während des Winters im Kalthause eine Fülle prächtiger Blumen.

Samolus Valerandi L. (aquat. Lam.) 10
FSanguinaria canadensis L. . . 6
SSanguisorba alpina Bunge. . . 4
S — canadensis L. . . . . . 3
SSanseviera carnea Andr. (Sanseviella Rchb.) . . . . . 3
KSantolina Chamaecyparissus L. (cupressiformis Lam. dentata Mich.) 10
*Saponaria depressa Rivo. . . 5
S — ocimoides L. . . . . 6

Eine zierliche, höchst dankbar blühende Pflanze.

| | Ngr. |
|---|---|
| Saponaria officinalis L. fl. pl. Seifwrz. | 3 |
| Satureja Thymbra L. (S. Tragoriganum Tausch. Thymus Trag. L. mant.) | 6 |
| SSaxifraga aizoides L. (autumnalis L.) | 6 |
| S — Aizoon Jcq. | 5 |
| FN — aspera L. | 5 |
| — crassifolia L. | 3 |
| S — crustata Vest. | 6 |
| S — Cotyledon L. (pyramidalis Lap.) | 8 |
| Eine der schönsten. | |
| FE — cuneifolia L. | 4 |
| S — elatior M. et K. | 6 |
| FF — Geum L. | 4 |
| FE — geranioides L. | 6 |
| S — gibraltarica Boiss. | 15 |
| S — Guthriana Schott. | 20 |
| FE — hypnoides L. | 3 |
| F — ligulata Wall. v. speciosa | 6 |
| — Malyi Schott. | 20 |
| AF — muscoides Wulf. | 6 |
| S — rotundifolio L. | 4 |
| K* — sarmentosa L. (chinensis Dour. stolonifera Jcq.) | 4 |
| — sedoides L. (trichodes Scop.) | 10 |
| — serrata Haw. (serratif. Mack.) | 10 |
| — tenella Wulf. | 5 |
| FE — umbrosa L. wie Primula | 3 |
| SScabiosa banatica Rochel. | 5 |
| — caucasica b. connata | 5 |
| — Fischeri D. C. | 5 |
| — pyraenaica | 8 |
| Scilla amethystina | 3 |
| FE — amoena L. | 2 |
| — alata | 5 |
| — autumnalis L. | 5 |
| — bifolia L. | 5 |
| R — maritima | 10 |
| — nutans Sm. | 4 |
| — — B. praecox W. | 3 |
| — non scripta Lk. (nutans Sm. Hyacinthus L.) | 2 |
| — — fl. rubro | 2 |
| — — — roseo | 2 |
| — sibirica Sims. | 2 |
| FAScopolina atropoides Schulz. (Hyosciamus L.) | 5 |
| SEScutellaria alpina | 3 |
| S — altissima L. | 3 |
| SE — japonica Morr. | 4 |
| — lateriflora L. | 3 |
| — nigrescens Spgl. (hirta Spr.) | |
| — orientalis L. | 5 |
| S — peregrina L. (rubicunda Hornm.) | 5 |
| — polybotrya Bernh. | 5 |
| — variegata | 6 |
| — viscida Spr. | 8 |
| SSedum Anacampseros L. | 5 |
| S — Aizoon L. | 5 |
| S — album L. | 3 |
| AS — Beyrichianum | 3 |
| — Eversii Ledeb. | 2 |
| — galioides Ait. | 3 |
| — hybridum L. | 2 |
| — ibericum Stev. | 2 |
| — involucratum M. B. | 2 |
| — Kamtschaticum Hort. | 2 |
| — laxifolium? | 5 |
| — lividum | 3 |
| — pallidum M. B. | 3 |
| — pulchellum Mx. | 2 |

| | Ngr. |
|---|---|
| Sedum purpurascens | 5 |
| — roseum Stew. | 5 |
| — Telephium L. | 3 |
| SASempervivum alpinum Grisb. | 5 |
| S — arenarium Koch. | 5 |
| AS — Braunii Funk. | 5 |
| — Camolli | 6 |
| — Funkii Br. | 5 |
| — montanum L. | 4 |
| — ruthenicum Fisch. | 5 |
| — soboliferum Sims. | 5 |
| — tectorum L. | 4 |
| — Wulfeni Hoppe. | 5 |
| Als Mittel gegen den Krebs empfohlen. | |
| ASSenecio abrotonifolius L. | 5 |
| RH — Cacaliaster Lam. | 4 |
| RH — Doria L. | 3 |
| Lieben schattige feuchte Stellen. | |
| RS — macrophyllus M. B. | 6 |
| SSerratula gigantea Hort. | 2 |
| SRSeseli glaucum | 8 |
| RS* — gummiferum Sm. (Bubon eriocephalus Sp. B. rigidus Spgl.) | 8 |
| Reich an Gummi. | |
| — tortuosum L. | 10 |
| Siebbaldia cuneaia | 8 |
| RSSida dioica Cav. Eine stattliche Rasenpfl. | 10 |
| Sieversia geoides | 10 |
| — triflora Spgl. | 5 |
| SSilene alpestris Jcq. | 4 |
| S — bupleuroides L. | 3 |
| — catholica Ait. | 4 |
| — exaltata Fries. | 5 |
| — fimbriata Sims. (Cucubalus M. B.) | 8 |
| — grandiflora | 5 |
| — maritima W. fl. pl. | 5 |
| — nemoralis W. Kit. | 4 |
| — pelidna Rchb. | 5 |
| — Pseudo-Otites Bess. | 3 |
| — quadridentata D. C. (quadrifida) | 4 |
| — rupestris L. (Kaulfussii Spgl.) | 3 |
| SA — saxatilis R. Br. | 4 |
| — Saxifraga L. | 5 |
| — Schafta Gmel. | 3 |
| S — tartarica P. | 2 |
| — vallesia L. | 5 |
| RSSiler trilobum Scop. (S. aquilegifolium Gaertn.) Eine herrl. Bltpfl. | 8 |
| KSSilphium connatum L. | 10 |
| — erythrocaulon Bernh. | 8 |
| RH — Hornemannii D. C. | 10 |
| — integrifolium Mchx. | 10 |
| — perfoliatum L. | 5 |
| — ternatum Retz. | 3 |
| — terebinthinacea L. | 12 |
| — trifoliatum L. (ternifolium Mchx.) | 8 |
| FSmilacina racemosa Desf. (Convallaria L.) | 6 |
| F — stellata Desf. (Convallaria L.) | 5 |
| WSmilax herbacea L. | 10 |
| Smyrnium perfoliatum Mill. | 10 |
| FSoldanella alpina L. | 6 |
| F — Clusii Gaud. (pusilla Baumg.) | 5 |
| Alpenglöckchen. | |
| SASolenanthus appeninus Hohenack. (Cynoglossum L.) | 6 |

Ngr.
HSolidago altissima *L.* . . . 2
— canadensis *L.* . . . . . 8
H— elliptica *Ait.* (latissimifolia *Mill.*) 2
H— flexicaulis *L.* (scrophularif. *Mill.*) 2
H— gigantea *Ait.* . . . . . 2
H— graminifolia *Ell.* (lanceolata *W.*) 2
— grandiflora *Desf.* . . . 5
— lithospermifolia *W.* . . . 5
— Ridellii *Frank.* . . . . 5
— rigida *L.* . . . . . . 5
— scabra *Mühlb.* . . . . . 3
H— villosa *Pursh.* (Bosciana *Sm.*) 2
Sophora alopecuroides *L.* . . 10
R*S*Spartina cynosuroides *Roth.* . 15
Schönes Gras, ähnlich d. Gynerium.

KSpigelia marylandica *L.* . . 12
Spiraea acuminata . . . . . 5
R*S*— Aruncus *L.* . . . . . 5
— — rubella, liebt Halbschatten und feucht, stattliche Pflanze 5
*S*— caucasica *C. Koch.* . . . 3
*S*— Filipendula *L.* fl. pl. . . 3
*S*— Humboldtii . . . . . 5
*S*— kamtschatica *L.* . . . 6
*S*— lobata *Jcq.* . . . . . 5
*S*— — venusta . . . . . 6
— palmata *Thub.* . . . . 5
S — Ulmaria *L.* fl. pl. . . . 8
Sämmtlich schön.
— Ulmaria *L.* fol. var. . . 10
SStachys alpina *L.* . . . . 2
SH—lata *Jcq.* . . . . . 3
Blätter glänzen wie Silber.

Statice auriculata *Bess.* . . 10
— altaica *Hort.* . . . . 10
— Avei . . . . . . 10
— cuneata *Hort.* . . . . 10
*— bellidifolia *D. C.* . . . 10
— caspica *W.* . . . . . 6
— coerulea *Hort.* . . . . 5
— compacta . . . . . 8
*S**— Dodartii *Giroud.* . . . 8
— Echinus *W.* (acerosa *M. B.*) 10
— echioides *L.* . . . . . 10
— elata *Fisch.* . . . . . 5
— erilepis . . . . . . 10
— Erinus . . . . . . 8
— Gmelini *W.* . . . . . 5
— gracilis . . . . . . 6
— lychnidiflora . . . . 15
— latifolia *Sm.* . . . . 8
R— lanceolata *Lk.* . . . . 10
— Limonium *L.* . . . . 8
— — fl. albo . . . . . 10
— occidentale . . . . . 10
— purpurata *L.* . . . . 10
— psilocladesBoiss . . . . 10
— reticulata *L.* . . . . 10
— scoparia *Pall* . . . . 5
— Sareptana . . . . . 10
— spathulata *Desf.* . . . 5
— speciosa . . . . . . 8
— Scopellii . . . . . 10
— tartarica *L.* . . . . 6
— Thouini *Viv.* (elata *W.*) . 10
— Wildenoviana *Poir.* (auriculaefolia *Poir.*) . . . . . 10
Zierliche, immortellenartige Pflanzen,
HSternbergia lutea *Ker.* (Amaryllis) 4

Ngr.
H Stevia Eupatorium *W.* . . 4
— Lindleyana *D. C.* . . . . 4
K — ovata *Lag.* Blüht im Topfe bis gegen Frühjahr . . . 5
— purpurea *W.* . . . . 4
*S*Stipa capillata *L.* . . . . 3
RS — gigantea *Laguse* . . . 10
*S* — pennata *L.* . . . . . 5
Beides schöne Gräser, letzteres bekannt unter Pfauenschweif, Federgras, liebt trocknen Kalkboden.
*S** — plendens *L.* . . . . . 6
*S*Succisa australis *Rchb.* (Scabiosa *L.*) Steht am besten an feuchten Stellen . . . . . . 2
*S**Symphiandra pendula *D. C.* . 6
Symphytum bullatum *Jacq.* (tauricum *W.*) . . . . . . 5
— caucasicum *M. B.* . . . 5
— coccineum *Hort.* . . . 3
— cordatum W. *K.* (cordifolium *Baumg.*) . . . . . . 5
— echinatum *Ledeb.* . . . 5
— orientale *L.* . . . . . 5
— tauricum *W.* (— ? borragineum *Tausch.* — bullatum *Horn.*) 5
WTamus communis *L.* . . . 10
Stark rankend, liebt sie keinen zu sonnigen Standort, im Herbst glänzen die gleich korallenrothen Perlschnüren, aufgereihten ziemlich grossen Beeren, ren, die bis Anfang Winters hängen bleiben.
R*S*Teleckia speciosa *Baumg.* (Buphth. cordifolium *W.* & *K.*) . . 4
Liebt feuchte Stellen, vor Allen den Rand von Gewässern, sowohl durch Blumen als den Habitus ausgezeichnet.

Teucrium canadense *L.* . . . 8
— Chamaedris *L.* . . . . 10
— formosum . . . . . 10
— lucidum *L.* . . . . . 5
— massiliense *L.* . . . . 8
Sehr reich.
Thalictrum allinum *L.* . . . 6
*S* — angustifolium *L.* . . . 2
*S* — aquilegifolium *L.* . . . 3
— — *L.* fl. albo . . . . 6
— — coccineum *W.* . . . 8
— flavum *L.* . . . . . 5
— floribundum *Schrad.* . . 6
— foetidum *L.* . . . . . 5
— galioides *Nestl.* (Bauhini *Crtz.*) 8
— glabratum . . . . . 8
— grandiflorum . . . . 8
— leucostemon . . . . . 4
— mediterraneum *Jord.* . . . 5
*S* — petaloideum *L.* (stamineum *L.* suppl.) . . . . . . 6
— purpurascens *L.* . . . . 5
— rugosum *Ait.* (discolor *W.*) 6
— sibiricum *L.* . . . . 4
— tuberosum *L.* . . . . 6
Blühen alle Ende Frühlings, sowohl Blätter als Blumen schön.
Thermopsis fabacea *D. C.* (Thermia alpina *Spgl.*) . . . . . 5
— lupiniodes *Link.* (lanceolata *M. B.*) . . . . . . . 5
F — scabra . . . . . . 5

| | Ngr. |
|---|---|
| EFTiarella cordifolia *L.* | 2 |
| *S*Tradescantia Lyoni *Hort.* | 3 |
| *S* — virginica *L.* | 3 |
| Tragopogon parviflorus *Hornem.* (angustifolius *Bell.*) | 8 |
| Trautvetteria palmata *Fisch* & *Mey.* | 10 |
| Trifolium fragiferum *L.* | 5 |
| *S* — pannonicum *L.* | 3 |
| *S*E — repens *L.* v. nigrum | 2 |
| Fast schwarze Blätter machen sie zum schönsten Schmuck für Gräber. | |
| F — rubens *L.* | 3 |
| F Trillium erectum *L.* rhomboideum *Mx.*) | 10 |
| — grandiflorum *Salisb.* (erythrocarpum *Bot. May.*) | 10 |
| — sessile *L.* | 10 |
| Tripsacum dactyloides *L.* | 8 |
| — monostachyum *W.* | 8 |
| Triticum junceum *L.* v. giganteum *Roth.* | 5 |
| *S*Trollius altaicus *C* & *M.* | 5 |
| — altissimus *Citz.* (europaeus *L.*) | 4 |
| — americanus *Mühlbg.* (laxus *Salisb.*) | 4 |
| SA Tunica Saxifraga *Scop.* (Gypsophila *L.*) | 3 |
| FTussilago alba *Hoppe* (Petasisites *Gärtn*) | 2 |
| — Farfara *L.* | 2 |
| F — fragrans *Vill.* (Nardosmia) | 2 |
| — gigantea (japonica *L.*?) — | 10 |
| Eine der brillantesten Blattpflanzen. | |
| FA— nivea (Petas. *Gärtn.*) | 2 |
| Schöne Blattpflanzen, geeignet zur Decoration von Aquarien und feuchten Stellen; letztere duftet nach Vanille. | |
| S* Umbilicus pendulinus *D. C.* (Cotyledon H. *L.*) | 10 |
| Merkwürdige Blattpflanze, liebt Trockenheit. | |
| S* — chrysanthus *Boiss* | 3 |
| SUniola latifolia *Mx.* (schönes Gras) | 3 |
| Urtica canabina *L.* | 5 |
| FUvularia flava *Sm.* | 3 |
| RS Valeriana alliariaefolia *Vahl.* (macrophylla *M. B.*) | 8 |
| — montana *L.* | 10 |
| — sambucifolia *Mill.* | 8 |
| — officinalis *L.* | 2 |
| Lieben feuchte, nicht zu sonnige Stellen; riechen sehr angenehm. | |
| RS Veratrum album *L.* (B- Lobelianum *Bernh.* var. viridifl. *W.* & *Gr.*) | 10 |
| RS — nigrum *L.* | 10 |
| Beide officinell, letztere durch die fast schwarze, sehr stattliche Blumenrispe auffallend, stehen gern etwas schattig, erstere liebt feuchten Standort. | |
| SVerbascum speciosum *Schrd.* | 3 |
| Verbena officinalis *L.* | 5 |
| — urticaefolia *L.* | 5 |
| HVernonia noveboracensis *W.* (praealta *W.*) wird sehr hoch. | 8 |

| | Ngr. |
|---|---|
| *S*Veronica austriaca *L.* (polymorpha *W.*) | 2 |
| *S* — Bachofeni *Heuff.* | 2 |
| *S* — corymbosa *Loud.* | 2 |
| RS — exaltata *Maund.* | 4 |
| *S* — fruticulosa *L.* | 4 |
| F — gentianoides *Vahl.* | 3 |
| F — — angustifolia | 8 |
| *S* — gracilis *R. Br.* | 2 |
| — grandis *Fisch.* | 4 |
| *S* — incana *L.* | 3 |
| *S* — Jacquini *Schott.* | 2 |
| — latifolia | 3 |
| *S* — longifolia *L.* | 2 |
| *S* — maritima *L.* (oxyphylla *Stev.*) | 2 |
| — pinnata *L.* | 5 |
| — praealtata *Lodd.* | 4 |
| — saxatilis *Jacq.* | 3 |
| *S* — scaberrima *Hort.* | 2 |
| *S* — sibirica *L.* | 3 |
| — spuria *L.* | 2 |
| — violacea | 4 |
| *S* virginiana *L.* (Leptandra *Nutt.*) | 3 |
| *S* — Waldsteiniana *Schott.* (confusa *R.* & *S.*) | 2 |
| WSVicia dumetorum *L.* | 4 |
| — pisiformis *L.* | 3 |
| FVinca herbacea *W.* & *K.* | 2 |
| — minor *L.* fol. arg. var. | 3 |
| — — fol. aur. mac. | 3 |
| — major *L.* v. reticulata | 4 |
| Viola biflora *L.* | 3 |
| — canina *L.* fol. var. | 5 |
| FK — cornuta *L.* | 3 |
| — cuneata | 5 |
| FA — dissecta *Led.* | 6 |
| — elatior *Fr.* (persicifolia *M.* & *K.* montana *Roth.*) | 6 |
| AF — multifida *W.* (punctata *Gmel.*) | 3 |
| — nummolarifolia *All.* | 5 |
| — obliqua *Ait.* alba | 3 |
| — — rubra pl. | 5 |
| — — var. striata | 2 |
| — odorata *L.* arborea pl. | 3 |
| — — fl. coer. pl. | 3 |
| * — — — — pallid. pl. | 3 |
| F — — *L.* fol. var. | 6 |
| — — semperflorens | 3 |
| — — tricolor pl. | 10 |
| F — Patrini *D. C.* (primulaefolia *Ham.*) | 6 |
| * — pinnata *L.* | 8 |
| F — pratensis *M.* & *K.* | 3 |
| — pyrolaefolia *Poir.* | 10 |
| — suavis *M. B.* | 2 |
| *S*Wahlenbergia grandiflora *D. C.* | 5 |
| — hederacea *Rchb.* | 10 |
| FE Waldsteinia geoides *W.* | 2 |
| * — trifoliata *Roch.* | 8 |
| Woodsia ilvensis *R. B.* (vestita *Spgl.* rupicola *Hffm.*) | 10 |
| *Wulfenia carinthiaca *Jacq.* | 3 |
| *Zauschneria californica *Presl.* | 3 |
| RZozymia absinthifolia *Hoffm.* (orientalis *M. B.* | 10 |
| S* Zygadenus glaberrimus *L. C. Rich.* | 7 |

# Ziersträucher & Bäume.

## Immergrüne.

Bei dem ungewöhnlichen Aufschwunge, welchen die Landschaftsgärtnerei genommen, darf man sich nicht wundern, dass alle Augen auf die immergrünen Gehölze gerichtet sind, da nur sie es vermögen, der Landschaft im Winter einige Abwechslung zu verleihen. — Zur besseren Uebersicht schied ich sie von den übrigen Gehölzen.

Die mit * bezeichneten müssen im Winter gedeckt werden. — s bedeutet Schlingpflanze.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Abies v. Coniferae. | — | — |
| Andromeda axillaris *Mx.* (Leucothoë *G. Don.*) | — | 8 |
| — calculata (Cassandra *G.Dn.* Chamaedaphne *Mach.*) | — | 5 |
| — Catesbaei *Walt.* (Leucothoë *G. Don.*) | — | 12 |
| — ligustrina *Mühlb.* (Lyonia *D. C.* paniculata *Nutt.*) | — | 15 |
| — floribunda *Sims.* (Portuna *Nutt.*) | 1 | — |
| — membranacea | — | 8 |
| — pulverulenta *Bartr.* (dealbata *Lindl.* Zenobia) | — | 12 |
| — speciosa *Mx.* (Zenobia *D. Don.*) | — | 12 |
| — tomentosa *Dum.* | — | 12 |
| — Walteri *W.* | 1 | — |
| *Arctostaphylos actica. Frucht essbar. | — | 12 |
| *Aucuba japonica *Thunb.* v. latimaculata | — | 8 |
| *Benthamia japonica *S. & J.* (Viburnum Awabuki *Hort.* japonica *Spr.*) | — | 10 |
| *Berberis actinacantha *Mart.* | — | 2 |
| — aristata *D. C.* 1jähr. | — | 7½ |
| * — arauhuacensis *Lehm.* (glauca *Benth.*) | — | 24 |
| — buxifolia *Lam.* (dulcis *Sm.*) | | 10 |
| — Chitria *Don.* (aristata *D. C.*) | | 10 |
| — cuneata *Banks.* | — | 24 |
| — Darwini *Hook.* | — | 10 |
| — empetrifolia *Lam.* | — | 18 |
| — Hookeri | 1 | — |
| — ilicifolia *Forst.?* | 1 | — |
| — Jamessoni *Veitsch.* | 1 | 10 |
| — Knightii *Hook.* | 1 | — |
| — macrophylla *Hort.* (Wallichiana *D. C.*) | 1 | 10 |
| — Neuberti *Baum.* | — | 12 |
| — Pangharanghensis *V. Houtt.* (macrophylla) | — | 15 |
| — tinctoria *Leschen.* | — | 15 |
| *s Bignonia capreolata *L.* (Tecoma) | | 5 |
| Biota s. Coniferae. | | |
| *Buxus balearica *Lam.* | — | 5 |
| — sempervirens *L.* v. arborescens | | 5 |
| — — B. fol. var. | — | 5 |
| — — suffruticosa | — | 5 |
| * — — rosmarinifolia (?microphylla *S. & Z.*) | — | 10 |
| Calluna vulgaris *Salisb.* alba (Erica *L.*) | | 10 |
| — — Alfordii | — | 10 |
| — — argentea | — | 10 |
| — — aurea | — | 10 |
| Calluna vulgaris fl. pleno | — | 10 |
| — — nana | — | 10 |
| — — Reginae | — | 10 |
| — — rubra | — | 10 |
| Cedrus s. Conif. | | |
| Cephalotaxus s. Conif. | | |
| s* Clematis trifoliata *Thnb.* | — | 10 |
| Clethra pubescens *Willd.* | — | 12 |
| * Cotoneaster acuminata *Ldl.* 1j. | — | 7½ |
| * — buxifolia *Wall.* | — | 8 |
| — microphylla *Wall.* | — | 10 |
| — thymifolia *Hort.* | — | 8 |
| Allerliebste Sträucher, deren zinnoberrothe Beeren während des Winters ausserordentlich zieren, daher auch zur Decoration für kalte Zimmer geeignet. | | |
| Cryptomeria s. Conif. | | |
| Daphne Cneorum *L.* | — | 10 |
| — Houtteana *Lindl.* | — | 30 |
| — Laureola *L.* | — | 7½ |
| * Deeringia Amherstiae fol. var. | | 6 |
| * Daboecia polifolia *D. Don.* var nana | | 5 |
| *s Elaeagnus reflexa *Hort.* (parviflora *Royl. Wall.*) | — | 8 |
| Empetrum nigrum *L.* Frucht essbar, diuretisch | — | 10 |
| Erica carnea *L.* (herbacea *L.*) | — | 6 |
| * — multiflora *L.* | — | 6 |
| * — ciliaris *L.* | — | 5 |
| — cinerea *L.* | — | 7 |
| — — alba | — | 7 |
| — — atropurpurea | — | 10 |
| * — — coccinea | — | 10 |
| * — Makayana *Hook.* | — | 6 |
| * — multiflora *Hds.* alba | — | 10 |
| — Tetralix *L.* | — | 10 |
| — — alba | — | 7 |
| — — carnosa | — | 6 |
| — vagans *L.* alba | — | 10 |
| *Evonymus japonicus *Thnb.* fol. albo-marg. | — | 5-10 |
| * — fol. aur. marg. | — | 5-10 |
| — nanus *Hort.* (angustif. *Pursh.*) | | 5 |
| * — fimbriata *Wall.* | — | 10 |
| * Gaultheria coccinea *H. B. K.* | — | 12 |
| * — procumbens *L.* | — | 8 |
| * — Shallon *Pursh.* | — | 10 |
| Hedera algeriensis latifolia | — | 5-10 |
| — — Helix *L.* | — | 5 |
| — — fol. aur. var | — | 5 |
| — — digitata *Lodd.* | — | 5 |
| — — hibernica *Hort.* | — | 5 |
| — — — fol. aur. var. | — | 5 |
| — — ponderata | — | 15 |
| — — taurica | — | 5 |
| — — vitifolia | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Hedera Roegneriana *Hort.* (colchica *C. Koch*) | — | 5-20 |
| Hypericum calycinum *L.* | — | 5 |
| Ilex aestivalis *Lam.* (prinoides *Ait.* decidua *Walt.*) | — | 12 |
| * — Aquifolium *L.* | — | 5 |
| — — Altaclarense *Loud.* | — | 15 |
| — — atrovirens *Hort.* | — | 15 |
| — — bumeliaefolia *Hort.* | — | 15 |
| — — canadensis fol. var. | — | 15 |
| — — dentata | — | 20 |
| — — echinata *Mill.* fol. arg. | — | 15 |
| — — elongata fol. alb. marg | — | 20 |
| — — excorticata *Hort.* | — | 15 |
| — — calamistrata *H. Booth.* (senescens *Swt.*) | — | 10 |
| — — ciliata *Hort.* | — | 10 |
| — — ferox *Ait.* | — | 10 |
| — — — fol. aur. var. | — | 15 |
| — — — fol. arg. var. | — | 15 |
| — — — — marg. | — | 15 |
| — — — aur. — | — | 15 |
| — — latifol. nova | 2 | — |
| — — luteis pictis | — | 15 |
| — — *L.* var. umbraculifera | 2 | — |
| Ist von allen Aquif. Varietäten die grösstblättrigste | | |
| — — integrifolia *Hort. Rinz* | — | 15 |
| — — laurifolia *Loud.* | — | 15 |
| — — macrophylla *Hort.* | — | 15 |
| — — maderensis *Hort. Versch.* | — | 12 |
| — — nigricans *Hort. V. Houtte.* | — | 10 |
| — — Porteriana *Hort.* | — | 10 |
| — — prinoides *Hort.* | — | 15 |
| — — scotica *Hort.* | 1 | — |
| — — serrata *Desf.* (recurva *Lk.*) | | 15 |
| — — Shepherdii *H. Booth.* | — | 20 |
| — — undulata *Hort.* | — | 15 |
| — — vulgaris *Goepp.* | — | 5 |
| — — zamiaefolia *Hort.* | — | 20 |
| — balearica *Desf.* (maderensis *W.*) | — | 12 |
| — — cordata *Hort.* | — | 15 |
| — — fol var. *Hort.* | — | 20 |
| — brexifolia *Hort v. Houtte.* | — | 15 |
| — gigantea *Hort.* (latifolia? Othera japonica *Thnbg.*) | — | 25 |
| — opaca *Ait.* (quercifolia *Meib*) | — | 10 |
| — ovata *Goepp.* | — | 10 |
| — Tarajo *Goepp.* | — | 10 |

Wenn Ilex Aquifolium und Varietäten, die zu unseren schönsten immergrünen Sträuchern gehören, geschützt stehen, bedürfen sie nur bei starker Kälte Bedeckung; die scharlachrothen im Winter ausdauernden Früchte zieren ausserordentlich; trotz starker Nachfrage meist gut vermehrt und abgebbar.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Juniperus s. Conif. | | |
| *Kalmia angustifolia *L.* | — | 8 |
| — glauca *Ait.* | — | 10-15 |
| * — — *Ait.* stricta | — | 10 |
| — latifolia *L.* | — | 10 |
| — lucida *Hort.* | — | 10 |
| — pumila *Hort.* | — | 10 |
| — rubra *Hort.* | — | 15 |
| Ledum angustifolium | — | 15 |
| * — buxifolium *Berg.* (Ammyrsine *Pursh.*) | — | 18 |
| * — intermedium | — | 18 |
| — latifolium *Ait.* | — | 9 |
| *Ligustrum Ibota *Bth. Cat.* | — | 8 |
| — lucidum (ovalifolium *Hort.*) | — | 8 |
| — sinense *Loud.* | — | 8 |
| — spicatum *Don.* (nepalense *Wall.*) | — | 8 |
| — syringaeflorum | — | 8 |
| *Linnaea borealis *L.* (*Hb.* diaphoretic.) | — | 6 |
| *Mahonia aquifolium *Nutt.* (Berberis) | — | 12 |
| * — — repens | — | 12 |
| * — diversifolia *Swt.* (fascicularis *D C.*) | — | 12 |
| * — glumacea *D. C.* Sampfl. (Berberis nervosa *Pursh*) | — | 20 |
| — magnifica *Hort.* | — | 10 |
| Mespilus Pyracantha *L.* | — | 5 |
| — — fr. albo 1jähr. | — | 6 |
| Myrica cerifera *L.* | — | 8 |
| Aus den Beeren w. Wachs gewonnen. | | |
| Oxycoccus macrocarpus *Wats.* (Vaccinium *Ait.*) | — | 10 |
| Frucht essbar. | | |
| — palustris *Pers.* (Vaccinium O. *L.*) Moosbeere. | — | 5 |
| *Phillyraea angustifolia *L.* | — | 5 |
| — latifolia L. | — | 5 |
| Pinus v. Coniferae. | | |
| *Prunus Laurocerasus *L.* Kirschlorbeer | | 5 |
| *Pernettya floribunda (Arbutus) | — | 10 |
| Rhododendron (vide Sortiment) | — | 5 |
| *Ruscus aculeatus *L.* Mäusedorn | — | 8 |
| * — racemosus *L.* | — | 6 |
| Taxodium v. Conif. | | |
| *Ulex europaeus *L.* Verlangt trocknen schattigen Standort | — | 5 |
| *Yucca filamentosa *L.* | — | 50 |
| Eine herrliche Rasenpflanze mit gr. weissen lilienförm. in langen Rispen stehenden Blumen. | | |
| — gloriosa *L.* | 1 | — |

# Laub werfende.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acer colchicum *Hort.* rubrum | — | 8 |
| — dasycarpum *Ehrh.* | | |
| — dissectum *Thbg.* | — | 10 |
| — Lobelli *Ten.* | — | 8 |
| — macrophyllum *Pursh.* | — | 7 |
| — monspessulanum *L.* | — | 6 |
| — Negundo fol. varg. | 1 | 15 |
| Der schönste zierlichste aller Art. | | |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acer Negundo *L.* (Negundo fraxinifolia *Nolte.*) 3jähr. | — | 8 |
| — — v. californica Topfpflanzen | | 6 |
| — — v. crispa | — | 10 |
| — opulifolium *Vill.* 1jähr. | — | 5 |
| — Pavia *H. Geltow.* | — | 12 |
| — pensilvanicum *L.* (striatum) | | 8 |
| — platanoides *L.* v. laciniat. | | 6 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Acer Pseudo-Plantanus *L.* 5—6 Fuss. | — | 4 |
| — — — fol. arg. var. hochstämmig | — | 5-10 |
| — — — palmatum *Thnb.* | — | 10 |
| — — — purpureum | — | 10 |
| — rubrum *L. Ehrh.* 1jähr. | — | 4 |
| — saccharinum *L.* 2jähr. | — | 6 |
| Zuckerahorn. | | |
| — spicatum *Lam.* (montanum *Ait.*) 1jähr. | — | 7 |
| — tartaricum *L.* | — | 4 |
| — Wagneri *Hort B.* laciniata | 2 | — |
| Aesculus Hippocastanum *L.* 3jähr. | | 2 |
| — — fl. pl. | — | 10 |
| — — fol. incisis | — | 8 |
| — — macrostachya *Mchx.* (parviflora *Walt.*) | — | 8 |
| — Pavia *L.* fol. lutea varg. | 2 | — |
| — — v. rosea nana (Pav. rubra *Lam.*) | — | 10 |
| — pumila *Hort. Angl.* fl. pl. | — | 10 |
| — rubicunda Lois *D. C.* (Pavia rubra *Lam.*) | — | 12 |
| Ailanthus erythrocarpa *Hort.* | — | 12 |
| — glandulosa *Desf.* | — | 5 |
| Alnus amer. longifolia | — | 10 |
| — cordifolia *Tenore.* | — | 5 |
| — glutinosa *Gaertn.* | — | 5 |
| — incana *W.* var. imperialis | 1 | — |
| — — — 4—6 Fuss | — | 8 |
| — montana superba | — | 15 |
| — pyrifolia | — | 7 |
| — tiliaefolia | — | 15 |
| — v. laciniata | — | 6 |
| Amelanchier ovalis *D. C.* (Pyrus *D. C.*) | | 8 |
| Amorpha croceo-lanata *W.* 1j. | — | 5 |
| — glabra *Desf.* | — | 5 |
| — nana *Nutt.* | — | 10 |
| Amygdalus cochinchinensis fl. alba pl. | | 10 |
| — nana *L.* (Besseriana *Schott.*) | — | 10 |
| — Persica *L.* fl. pl. | — | 10 |
| *b* — pumila *Sims.* rosea pl. (Prunus sinensis *P.* japonica *Thb.*) | | 10 |
| *b* — — alba pl. | — | 10 |
| Andromeda arborea *L.* | 1 | — |
| *Androsaemum officinale *All.* | — | 5 |
| Aralia vide Araliaceae. | | |
| *s*Aristolochia Sipho *L'Herit.* | — | 5 |
| *s*Atragene alpina *L.* (Clematis) | — | 8 |
| — sibirica *L.* 1jähr. r | — | 5 |
| *b*Azalea pontica 3jähr. Sämlinge | — | 5 |
| Berberis aristata *D. C.* 1jähr. | — | 7½ |
| — elegans *Hort.* | — | 12 |
| — macrocarpa *Schd.* 1jähr. | — | 7½ |
| — microphylla *Forst.* (serrata) | — | 18 |
| — vulgaris *L.* | — | 2 |
| — — *L.* fructo albo | — | 10 |
| — — *L.* — dulce | — | 18 |
| — — fol. marg. aur. | — | 15 |
| — — luteo | — | 10 |
| — — sanguinolenta | — | 7 |
| *s*Bignonia radicans etc. vide Tecoma. | | |
| Betula alba *L.* v. laciniata | — | 10 |
| — grandis *Schrd.* | — | 10 |
| — macrophylla | — | 10 |
| — nana *L.* | — | 10 |
| — urticaefolia *Curt.* | — | 8 |
| *b*Broussonetia papyrifera *Vent.* | — | 10 |
| — — dissecta | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *b*Calycanthus floridus *L.* | — | 15 |
| — occidentalis *Hk. & Arn.* 1j. | — | 8 |
| Caragana arborescens *Lam.* | — | 2 |
| — Gerardiana *Royle.* (Astragalus *Grah.*) | — | 15 |
| — grandiflora *D. C.* | — | 15 |
| — pendula *Hort.* | — | 15 |
| — pygmaea *D. C.* (gracilis *Hrt.*) | — | 6 |
| — — var. arenaria *Sims.* | — | 6 |
| Carpinus Betulus *L.* | — | 5 |
| Castanea vesca *G.* | — | 5-20 |
| *b*Catalpa Kaempferi *D. C.* | — | 15 |
| — syringaefolia *Sims.* (Bignonia *Cat. L.*) | — | 5 |
| *Ceanothus americanus *L.* | — | 2 |
| — Baumanni *Hort* | — | 10 |
| — intermedius *Pursh.* | — | 3 |
| — microphyllus *Mx.* | — | 3 |
| — ovatus *Desf.* | — | 8 |
| *r*Celastrus scandens *L.* | — | 5 |
| Rinde brechenerregend. | | |
| Celtis australis *L.* 1jähr. | — | 5 |
| — occidentalis *L.* | — | 8 |
| Cercis canadensis *L.* | — | 6 |
| — Siliquastrum *L.* 1jähr. | — | 5 |
| Chionanthus virginica *L.* | — | 10 |
| *Clematis anemoniflora *Don.* | | 24 |
| * — aristata *R. K.* | — | 15 |
| *sb*— azurea *Sieb.* (coerulea *Lindl.*) v. grandiflora | — | 10 |
| — — francofurtensis | — | 12 |
| — — Guascoi *Hort.* | — | 10 |
| — — Louise | — | 15 |
| — — monstrosa | — | 15 |
| — Buchaniana *Don.* | — | 20 |
| * — calycina *Ait.* | — | 20 |
| — campaniflora *Brotr.* r | — | 6 |
| * — capensis *Poir.* | — | 25 |
| * — cirrhosa *L.* (balearica *Pers*). | — | 25 |
| *s* — flammula *L.* | — | 6 |
| *bs*— florida *Thnb.* | — | 8 |
| *bs*— — var. bicolor *Ldl.* | — | 8 |
| *rs*— — — fl. pl. | — | 6 |
| — glauca *W.* | — | 15 |
| — Hendersoni *Hort.* var. | — | 10 |
| — odoratissima *Hort.* | — | 10 |
| — orientalis *L.* | — | 8 |
| * — patens *Morr. & Dcne.* (Amalia) | — | 20 |
| Sb— patens v. Sophie | — | 12 |
| — pulchella | — | 6 |
| *bs* — Viorna *L.* | — | 10 |
| *s* — Viticella *L.* fl. pl. | — | 3 |
| *s* — — pulchella *Pers.* | — | 8 |
| — — *L* venosa *r* | — | 10 |
| S*Cocculus japonicus *D. C.* (Menispermum *D. C.*) | — | 8 |
| Colutea arborescens *L.* | — | 5 |
| — cruenta *Ait.* (oriental. *Lam.* humilis *Scop.*) | — | 5 |
| — halepica *Lam.* (Pococki *Ait.*) 1jähr. | — | 3 |
| Cornus alba *L.* (tartarica *Mill.*) | — | 3 |
| — — sibirica *Lodd.* | — | 8 |
| — florida *L.* | — | 8 |
| — mas *L.* (mascula) | — | 5 |
| — sanguinea *L.* (foemina *Raf.*) | — | 3 |
| Coronilla Emerus *L.* | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Corylus Avellana *L.* v. atropurpurea wurzelächt | — | 15 |
| — — laciniata | — | 10 |
| *Cotoneaster acuminata *Lindl.* | — | $7^1/_2$ |
| — Fontanesia *Spch.* 1jährig | — | 5 |
| — Granatensis *Boiss.* | — | 18 |
| — melanocarpa *Led.* 1jährig | — | 5 |
| *b* — Nummularia *F. & M.* | — | 10 |
| — princeps *Hort.* 1jährig | — | 6 |
| — tomentosa *Lindl.* | — | 5 |
| Crataegus Azarolus *L.* 1jährig | — | 5 |
| Früchte essbar. | | |
| — coccinea *L.* | — | 5 |
| — Crus galli *Desf.* | — | 5 |
| — flabellata *Spach.* 1jähr. | — | 5 |
| — glandulosa *Ait.* 1jähr. | — | 6 |
| — melanocarpa *M. B.* | — | 8 |
| — monogyna *Jcq.* v. pendula | — | 12 |
| — ovalifolia *Hornem.* | — | 15 |
| — Oxyacantha *L.* 3j. 12 St. | — | 20 |
| — — *L.* albo pl. | — | 10 |
| — — fl. rubro pl. | — | 5-15 |
| — — *L.* B. macroc. 1jähr. | — | 5 |
| — prunifolia *Bosc.* 1jähr. | — | 5 |
| — pyrifolia *Ait.* 1jähr. | — | 5 |
| Cydonia japonica Moerlosii T. | — | 20 |
| — — 1jährige Sampflanze | — | 5 |
| *b* — — Mallardi *Hort.* | 3 | — |
| — vulgaris *P.* v. lusitanica *Mill. Duhm.* | — | 6 |
| — — maliformis *Mill.* | — | 6 |
| — — pyriformis *Hort. Blackw.* | — | 6 |
| Cytisus aethnensis (Genista aeth.) 1j. | | 8 |
| — alpinus *Mill.* | — | 5 |
| — — purpurascens (Adami) | — | 10 |
| — biflorus *L'Herit.* (supinus *Jcq.* ratisbonnensis *Schaeff.*) | — | 5 |
| — capitatus *Jacq.* | — | 5 |
| — confertus | — | 10 |
| — elongatus *W. & K.* | — | 2 |
| — elongato-versicolor *Hort.* | — | 6 |
| — Laburnum *L.* | — | 5-15 |
| — — bullatum | — | 9 |
| — — intermedium | — | 8 |
| — nigricans *L.* (Lembotropis *Griseb.*) | — | 5 |
| — — pendulum | — | 8 |
| — — quercifolium *Hort.* (incisum *Hort.*). | — | 10 |
| — polytrichus *M. B.* T. | — | 5 |
| — purpureus *Scop.* | — | 6 |
| — — superbus | — | 15 |
| *b* — purpureo-elongatus *Hort.* | — | 8 |
| — sessilifolius *L.* 1jähr. (Spartocytisus *Bark.*) | — | 3 |
| — supinus *L.* 1jähr. | — | 3 |
| * — Weldeni *Vis.* (Laburnum fragrans *Gries.*) 1j. | — | 5 |
| Daphne Mezereum *L.* | — | 3 |
| — Houtteana *Lindl.* | — | 25 |
| Deutzia crenata *Sieb. Zucc.* | — | 5 |
| *b* — Godohokeri | — | 6 |
| — gracilis *Zucc.* vera | — | 5 |
| — japonica *Hort.* | — | 5 |
| — scabra *Thunb.* | — | 5 |

Die dritte, und die letzte lassen sich gut treiben, vor allen jedoch gracilis, welche sich durch Fülle und Zierlichkeit der Blumen auszeichnet.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| *Diospyrus Lotus *L.* 1jährig | — | 5 |
| Frucht essbar. | | |
| — virginiana *L.* | — | 12 |
| Eleagnus angustifolia *Pursh.* | — | 5 |
| Evonymus europaeus *L.* (vulgaris *Scop.*) | — | 3-5 |
| — — fr. albo | — | 7 |
| — — fol. variegatus | — | 15 |
| — — *L.* fol. purpur. | — | 10 |
| — latifolius *Scop.* | — | 5 |
| — verrucosus *Scop.* | — | 5 |
| Fagus sylvatica *L.* 5 Fuss | — | 3 |
| — — asplenifolia *Lodd.* | — | 10 |
| — — purpurea *Ait.* | — | 10 |
| — — americana *Loud.* | — | 20 |
| — — quercoides (cristata *Lodd.*) | | 10 |
| — — tricolor | 1 | 15 |
| — ferruginea *Ait.* | — | 10 |
| Fontanesia phillyraeoides *Labill.* | — | 8 |
| Forsythia suspensa *Vahl.* | — | 15 |
| — viridissima *Thbg.* | — | 5 |
| Fraxinus angustifolia *Vahl.* | — | 8 |
| — amarissima *Lodd.* | — | 8 |
| — coriacea | — | 8 |
| — excelsior aucubaefol. *Hort.* | — | 8 |
| — — aurea *Willd.* | — | 8 |
| — — calabrica | — | 14 |
| — — crispa *Loud.* (atrovirens *Desf.*) | — | 8 |
| — — fol. varg. | — | 20 |
| — — horizontalis *Desf.* | — | 10 |
| — — nana *Bosc.* | — | 8 |
| — — pendula | — | 8 |
| — — verrucosa *Desf.* | — | 8 |
| — — excelsior *L.* 4 Fuss. | — | 8 |
| — heterophylla *Vahl.* | — | 8 |
| — juglandifolia *Lam.* | — | 5 |
| — lentiscifolia *Desf.* | — | 8 |
| *b* — — pendula | — | 8 |
| — longifolia *Bosc.* | — | 8 |
| — Ornus *L.* (Ornus floribunda) | — | 8 |
| — pallida *Bosc.* | — | 8 |
| — pannosa *Vent.* | — | 8 |
| — paniculata *Mill.* (Ornus pan.) | — | 8 |
| — salicifolia *Loud.* (angustif. *Willd.*) | — | 10 |
| — sambucifolia *Lam.* | — | 8 |
| *Genista aetnensis *Spgl D. C.* (Dendrospartum *Spnch.*) | — | 5 |
| — decumbens *Ait.* | — | 6 |
| * — cinerea *D. C.* | — | $7^1/_2$ |
| — hispanica *L.* | — | 5 |
| — radiata *Scop.* | — | 8 |
| — ovata *W. & K.* | — | 5 |
| — polygalaefolia *D. C.* (exaltata *Lk.*) | — | 5 |
| — procumbens *W. & K.* | — | 2 |
| — sagittalis *L.* (Genistella racemosa *Mnch.* | — | 10 |
| — thyrsiflora | — | 5 |
| — virgata *D. C.* 1jährig | — | 5 |
| — — *Prsl.* var. multibracteata 1jährig | — | $7^1/_2$ |
| Gleditschia latisiliqua *Lodd.* 1j. | — | 5 |
| — sinensis *Larg.* (horrida *W.*) 1j. | | 8 |
| — triacanthos *L.* (spinosa *Dh.*) | — | 4-8 |
| *bs*Glycine chinensis *Curt.* (Wistaria *D. C.*) | — | 12-15 |
| — — fl. albo | — | 24 |
| *bs* — frutescens *L.* var. magnifica (Wistaria *D. C.*) | — | 10 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Gymnocladus canadensis *Lam.* (Guilandina dioica *L.*) | — | 10 |
| Halesia parviflora *Mx.* | — | 10 |
| — tetraptera L. 2j. | — | 8 |
| Halimodendron argenteum *Fisch.* (Caragana Halodendron) | — | 10 |
| Hamamelis virginica *L.* | — | 6 |
| *b*Hibiscus syriacus *L.* | — | 3 |
| — — fl. rubro pl. | — | 8 |
| — fol. var. | — | 8 |
| Hippophaë rhamnoides *L.* | — | 3 |
| — salicifolia *D. Don.* (conferta) | | 15 |
| Hydrangea hortensis *Sm.* B. mutabilis . T | — | 10 |
| *b* — — — fl. pl. | — | 10 |
| — — fol. var. fl. pl. | — | 8 |
| Vorzügliche, weiss gescheckte Decorationspflanze. | | |
| *b* — japonica *Sieb.* | — | 5 |
| *b* — nivea *Mx.* | — | 5 |
| *b* — quercifolia *L.* | — | 6 |
| Hypericum canariense *L.* | — | 5 |
| *b* — kalmianum *L.* | — | 10 |
| †Jasminum fruticans *L.* | — | 5 |
| *b* — humile *L.* | — | 6 |
| *b* — nudiflorum *Ldl.* | — | 5 |
| Japanische Medicinalpfl. | | |
| — officinale | — | 5 |
| Juglans fertilis *Hort.* (praepartuiens) stark | — | 25 |
| — — laciniata | — | 30 |
| — nigra *L.* (americana nigra) 1j. | | 5 |
| — regia *L.* 2-3jähr. | — | 3 |
| — — *L.* var. heterophylla | — | 10 |
| Koelreuteria paniculata *Lam.* klein. | | 6 |
| *b*Laurus Benzoin *L.* officinell | — | 15 |
| Leycesteria formosa *Wall.* | — | 5 |
| Ligustrum vulgare *L.* | — | 2 |
| — — fol. aureo var. | — | 8 |
| — — fructu luteo | — | 8 |
| — — italicum *Mill.* (foliosum, sempervirens) | — | 4 |
| Liquidambar Styraciflua *L.* (officin.) | | 10 |
| Liriodendron Tulpifera *L.* kl. | — | 5 |
| *rLonicera coccinea superba *Hort.* | | 20 |
| — coerulea *L.* | — | 5 |
| — dioica *L.* (parviflora *Lam.*) | — | 5 |
| *b* — Ledebourii *Eschsch.* | — | 5 |
| — macrophyllum (? Symphoricarp. microph. *H. B.* & *K.*) | | 10 |
| — nigra *L.* | — | 5 |
| — pyrenaica *L.* 1j. | — | 5 |
| *r* — sempervirens *L.* rubra | — | 8 |
| *r** — splendens *Boissen* | — | 8 |
| — tartarica *L.* | — | 2 |
| — Xylosteum *L.* | — | 5 |
| *s* — Caprifolium atrosanguineum *Hrt.* | | 5 |
| *s* — — *L.* B. praecox *D. C.* | — | 6 |
| — brachypoda *Hort.* | — | 5 |
| — chinensis *Wats.* v. purpurea | | 5 |
| — canadensis *R. & S.* | — | 5 |
| *bs* — confusa *D. C.* | — | 8 |
| *s* — Douglasii *D. C.* | — | 5 |
| *s* — etrusca *Santi.* | — | 6 |
| *bs* — fragrantissima *Hort.* | — | 10 |
| *s* — Fraseri Hort. (flava *Sims.*) | — | 6 |
| *s* — Goldii Sprgl. | — | 5 |
| *es* — hirsuta *Eaton.*(pubescens *Scot.*) | — | 6 |
| — italica *Schmidt.* var. rubra | — | 3 |
| *bs* — Mangevilleae (Caprifolia *Bth. Cat.*) | — | 5 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Lonicera occident. *Ldl. Hook.* | — | 5 |
| — prolifera *Booth.* | — | 5 |
| — sempervirens *L.* | — | 4 |
| — sinensis *Hakon.* | — | 8 |
| *os* — villosa *Mhlb.* | — | 5 |
| bMaclura aurantiaca *Nutt.* | — | 5 |
| Magnolia acuminata *L.* | — | 18 |
| — cordata *Mx.* | — | 20 |
| *b* — gracilis *Sab.* | — | 25 |
| *b* — glauca *L.* | 2 | — |
| — macrophylla *Mx.* | — | 20 |
| *c* — purpurea *Crt.* (obovata *Thnb.*) | | 30 |
| — tripetala *L.* (Umbrella *Lam.*) | | 20 |
| *b* — Yulan *Desf.* | 1 | 10 |
| — — Fischerii | 2 | — |
| — — speciosissima *Hort.* | — | 25 |
| — — triumphans *Hort.* | — | 25 |
| *S*Menispermum canadense *L.* | — | 8 |
| Mespilus Chamaemespilus *L.* | — | 9 |
| — germanica *L.* | — | 5 |
| — — var. macrophylla | — | 7 |
| *Ononis fruticosa *L.* | — | 5 |
| *b* Paeonia Moutan *Sims.* (arborea *Hort.*) | — | 10 |
| — — Bella | 1 | 20 |
| — — Carl | 1 | 5 |
| — — Charles Morren | 2 | — |
| — — Debugny | — | 25 |
| — — Deutsche Flagge | 1 | 10 |
| — — Duc d'Aumale | — | 25 |
| — — Elisabeth | 3 | — |
| — — Edwardsii | 3 | — |
| — — Grand Duc de Bade | 1 | — |
| — — Kaiser Leopold | 1 | — |
| — — Louise Mouchelet | 3 | — |
| — — Neumanni. | — | 25 |
| — — phoenicea pl. | 1 | 20 |
| — — regia | — | 20 |
| — — Rococo | 1 | — |
| — — rosea superba | 1 | 15 |
| — — Rossini | 1 | 20 |
| — — Soleil | 1 | — |
| — — splendidissima | 1 | 20 |
| — — Triomphe de Malines | 2 | — |
| *Paliurus aculeata *Lam.* (Baccae diureticae) | — | 10 |
| Parrotia persica *C. A. M.* (Hamamelis *D. C.*) | — | 15 |
| Paulownia imperialis *S. & Zcc.* | — | $7^1/_2$ |
| Einer d. schönst. Bäume für Anlagen. | | |
| sPeriploca graeca *L.* | — | 5 |
| Philadelphus coronarius *L.* | — | 5 |
| — — *L.* fol. var. | — | 6 |
| — floribundus *Schrd* | — | 6 |
| — Gordonianus *Ldl.* | — | 8 |
| — grandiflorus *Wb.* (laxus *Schrdr.*) | — | 7 |
| — hirsutus *Ntt.* (villos. *Lod.*) | — | 5 |
| — latifolius *Schw.* | — | 8 |
| Pirus Amelanchier (P. Botryap. *L.* Amelanch. Botr. *DC.*) | — | 3-5 |
| — baccata *L.* | — | 8 |
| — cerasifera *Tausch.* 1jährig | — | 5 |
| — communis | — | 5-10 |
| — — fol. var. | — | 6 |
| — elaeagnifolia *Pall.* (orient. *Pall.*) | | 6 |
| — prunifolia *W.* (bract. *Hrt.*) | — | 5-10 |
| — — fr. luteo | — | 6 |
| — — — nigro | — | 6 |
| — — — pellucido | — | 6 |
| — — — striato | — | 6 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Pirus prunifolia transparente | — | 6 |
| — spectabilis *Ait.* (sin. *Dum.*) | — | 5-10 |
| — sphaerocarpa *Wender.* 1j. | — | 5 |
| *Planera Kejaki (Ulmus *Sieb.*) | — | 18 |
| — Richardii *Mx.* (Ulmus nemoralis *Ait.*) . . . . | — | 10 |
| *b*Platanus cuneata *Willd.* . | — | 7 |
| — occidentalis *L.* . . . | — | 8 |
| — orientalis *L* (digitata) . | — | 8 |
| — pyramidalis *Hort.* . | — | 8 |
| *b* — umbraculifera . . . | — | 15 |
| Populus alba *L.* var. nivea *Lodd.* | | 5 |
| — laurifolia *Ledeb.* . . . | — | 8 |
| — Lindleyana *Hort.* . | — | 8 |
| — macrophylla *Lindl.* (candicans *Ait.*) . . . . . | — | 8 |
| — pendula *Lodd.* (tremula *Loud.*) | | 10 |
| — viminalis *Lodd.* (balsamifera *L.*) | | 4 |
| Potentilla floribunda *Pursch.* (fruticosa *L.* v. tenuifolia *Schlchtd.*) | | 4 |
| Prunus auccubaefolia . . . | — | 8 |
| — Avium *L.* fl. pl. serot. | — | 10 |
| — cerasus *L.* fl. pl. . . . | — | 5 |
| — cartilaginea *Lehm.* . | — | 4 |
| — domestica *L.* fol. var. | — | 5 |
| — floribunda *Hort.* (depressa *Psh. H.* sehr zierlich.) . | — | 5 |
| — hyemalis *Mx.* . . . | — | 5 |
| — Mahaleb *L.* . . . , | — | 8 |
| — Padus *L.* . . . . | — | 5 |
| — — v. rubra *Ser.* . . . | — | 6 |
| — serratifolia . . . . | — | 12 |
| — serotina . . . . . | — | 5 |
| — spinosa *L.* fl. pl. . . | — | 8 |
| — virginiana *L.* . . . | — | 2 |
| — — rubra *Ait.* . . . | — | 5 |
| Ptelea trifoliata *L.* . . . | — | 5 |
| Quercus Banisteri *Mx.* (ilicifolia *Wngh.*) . . . . | — | 8 |
| — bicolor *W.* (Prinos tomentosa *Mx.*) . . . . | — | 6 |
| — Cerris *L.* . . . . | — | 8 |
| — filicifolia *Bth. Cat.* . | — | 25 |
| — coccinea *Wngh.* . . | — | 8 |
| b — Mirbecki *Bth. Cat.* . | — | 25 |
| — macrocarpa *Mx.* , . | — | 15 |
| — olivaeformis *Mx.* . . . | — | 20 |
| — rubra *L.* . . . . . | — | 10 |
| — Tauzin *Pers.* (Toza *Bosc.* pyrenaica *W.* stolonifera) | — | 15 |
| — tinctoria *W.* Quercitronholz | — | 10 |
| — pedunculata *Ehrh.* (asplenifol.) | | 15 |
| — — crispa *Bth. Cat.* (Cerris) | 1 | 10 |
| — — cucullata . . . . | 1 | — |
| — — cupressoides *Hort.* . | 2 | — |
| — — — fol. cupreis . | — | 18 |
| — — dissecta . . . , | — | 24 |
| — — fastigiata *Lam.* (pyramidal. *Hort.*) . . . . | — | 12 |
| — — — fol. arg. marg. . | — | 10 |
| — — — — atropurp. . | — | 5 |
| — — — — aur. . . | 1 | — |
| — — — pulverulentis . | — | 24 |
| — — heterophyll. *Loud.* . | — | 15 |
| — — filicifol. *Hort.* (Parmentieri) | | 30 |
| — — pyramidalis *Hort.* (fastigiata *Lam.*) . . . . | — | 15 |
| Rhamnus Erythroxylon *Pall.* | — | 8 |
| — Frangula *L.* offic. . | — | 5 |
| — tinctoria *W. & K.* 1j. , Zum Gelbfärben. | — | 5 |
| Rhus Cotinus *L.* . . . . | — | 5-10 |
| — elegans *Ait.* (glabra cocc. *Ait.*) | | 5 |
| bs— Toxicodendron *L.* offic. Giftbaum. | — | 10 |
| Ribes alpinum *L.* . . | — | 5 |
| — aureum *Pursh.* (Chrysobotrya revoluta *Spach.*) | — | 3 |
| b — Beatonii *Hort.* (Calobotrya) | — | 5 |
| — Cynosbati *L.* . . . | — | 15 |
| — macrobotris *R. & P.* . | — | 4 |
| — nigrum *L.* var. aquifolium | — | 6 |
| — — heterophyllum . | — | 20 |
| — petraeum *Wulf.* . . | — | 5 |
| — sanguineum *Pursh.* (Calobotrya *Spach.*) stark . | — | 10 |
| — — albidum stark . . | — | 8 |
| — — fl. pl. stark . . | — | 8 |
| — — *Pursh.* praecox . | — | 9 |
| b — subvestitum *Hook. & Arn.* | — | 8 |
| Robinia hispida *L.* . . | — | 8 |
| — — belle Rose . . | 1 | — |
| — hispidissima inermis . | — | 5 |
| — Pseudacacia *L.* 3jähr. . | — | 5 |
| — — amorphaefolia *Lk.* . | — | 8 |
| — — Bessoniana *Hort.* . | — | 15 |
| — — coluteoides nova . | — | 20 |
| — — cylindrica *Hort.* . . | — | 8 |
| — — Dampieri . . . | — | 16 |
| — — fastigiata nova . | — | 15 |
| — — floribunda *Hort.* . | — | 6 |
| — — fol. aur. . . . | — | 12 |
| — — glaucescens nova . | — | 15 |
| b — — inermis *D.C.* rubra | — | 20 |
| — — macrophylla *Lodd.* | — | 15 |
| — — nigra nana *Hort.* . | — | 12 |
| — — patula nova . . | — | 20 |
| — — revoluta nova . . | — | 15 |
| b — — tortuosa *D.C.* . . | — | 10 |
| — — var. inermis *Dum.* Rhederi | | 12 |
| — — viscosa *Vent.* . . | — | 6 |
| — — — macrophylla *Lodd.* | — | 12 |
| — — — *Pursh.* v. alba . | — | 6 |
| — — volubilis *Hort.* . | — | 10 |
| sRubus corylifolius *Sm.* fl. pl. | — | 6 |
| b — fruticosus *L.* fol. var. . | — | 6 |
| s — laciniatus *W.* . . . | — | 6 |
| s — nobilis *Hort.* . . . | — | 6 |
| — odoratus *L.* . . . . | — | 2½-5 |
| — — *L.* fl. albo . . | — | 8 |
| Salix americana pendul. . | — | 19 |
| — babylonica *L.* . . . | — | 5 |
| — — undulata (Napoleonensis) | | 4 |
| — Caprea *L.* pendula . | 1 | — |
| — — *L.* v. bicolor . . | — | 8 |
| — laurina *Sm.* . . . . | — | 4 |
| — nigra *Marsch.?* var. pendula (Napoleonis nova) . . | — | 10 |
| — pendula de Souchet . . | — | 15 |
| — regalis *L.* . . . . | — | 8 |
| b — retusa *L.* Zwergalpenweide | — | 5 |
| — sericea pendul. . . | 1 | — |
| Sambucus nigra *L.* . . | — | 2 |
| — — elegans . . | — | 5 |
| — — fol. arg. var. . | — | 4 |
| — — — laciniatus *Mill.* | — | 5 |
| — — — luteis . . | — | 10 |
| — — — pulverulentis | — | 8 |
| — semperflorens *Hort.* | — | 10 |
| Solanum Dulcamara *L.* fol. v. T. | — | 8 |
| Sophora japonica *L.* B. eleg. | — | 15 |
| — — *L.* 2jährig . | — | 8 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Sorbus americana *W.* 1jährig | — | 3 |
| — Aucuparia *L.* . . . | — | 8 |
| — — fr. luteo . . . . | — | 10 |
| — — lucida . . . . | — | 8 |
| — — pendula . . . . | — | 8 |
| — — quercifolia . . . | — | 8 |
| — graeca *C. Koch.* . . . | — | 6 |
| — hybrida *L.* . . . . | — | 8 |
| — intermedia *Pers.* . . | — | 8 |
| — latifolia *P.* . . . . | — | 6 |
| — nepalensis *Hort.* (vestita *Lodd.*) | | 8 |
| — lanuginosa *Kit.* . . | — | 10 |
| Shepherdia argentea *Nutt.* (Elaeagnus macrophylla) . | — | 5 |
| bSpartium junceum *L.* . | — | 6 |
| — scoparium *L.* (Sarothamnus *Wimm.* & *Grab.* vulgaris *Wimm.* Genista *Lem.*) . | — | 3 |
| Spiraea adianthoides (thalictroides *L ?*) . . . . . | — | 5 |
| b — ariaefolia *Sm.* . . | — | 8 |
| b — bella *Sims.* v. coccinea | — | 6 |
| b — bethlehemensis *Hort.* . | — | 5 |
| b — Billardieri rubra *Hort.* | — | 4 |
| b — Blumei *G. Don.* . . | — | 8 |
| — cana *W.* & *K.* . . | — | 3 |
| — candida *Hort.* . . | — | 10 |
| — carpinifolia *W.* incarnata | — | 2 |
| b — callosa *Thnb.* (Fortunei *Planch.*) | | 5 |
| — decumbens *Kit* (flex. *Rchb.*) | — | 3 |
| — Douglasii *Hook.* . . | — | 5 |
| b — eximia *Hort.* . . | — | 10 |
| b — expansa *Ldl.* . . | — | 5 |
| — flexuosa *Fisch.* . . | — | 6 |
| b — grandiflora *Sw.* . . | — | 6 |
| — hybrida Regeliana . | — | 8 |
| — incisa *Thnb.* . . . . | — | 5 |
| — laevigata *L.* (altaica) . | — | 6 |
| — lancifolia *Hort.* (angustifolia *O. & D.*) . . . . | — | 3 |
| b — Lindleyana *Wall.* (Schizotus *Wall.*) . . . . | — | 4 |
| b — Nicoudertii *Hort. Gelt.* | — | 6 |
| — nivea . . . . . | — | 5 |
| — opulifolia *L.* . . . . | — | 5 |
| — prunifolia *Sieb. & Zucc.* fl. pl. | — | 5-10 |
| — Reveesiana *Lindl.* (corymb. *Roxb.* non *Raf.*) . . | — | 5-10 |
| — — *Lindl.* fl. pl. . . | — | 8 |
| b — rotundifolia *Hort.* . | — | 6 |
| — ruberrima *Hort.* . . | — | 5 |
| b — rubra . . . . . | — | 6 |
| — salicifolia *L.* . . . | — | 5 |
| — — fl. rubro . . . . | — | 6 |
| — sanssouciensis *H. Gelt.* | — | 6 |
| — tomentosa *L.* . . . | — | 6 |
| — Thunbergia *Sieb. & Zuccar.* (crenata *Thbg.* non *L.*) | — | 10 |
| Symphorycarpos montana *H.B.K.* | — | 5 |
| — orbiculatus *Moench.* (racemosa *Hort.* fol. var.) . | — | 5 |
| Einer der zierlichsten Sträucher. | | |
| b — Polucensis Hort. . . | — | 5 |
| — racemosa *Mx.* . . . | — | 3 |
| bStaphylea colchica *Stev.* . | — | 6 |
| Syringa chinensis *W.* (dubia *P.*) | — | 5 |
| — — fl. albo . . . . | — | 5 |
| — Josikaea *Jcq. f.* . . . | — | 5 |
| — persica *L.* . . . . | — | 5 |
| — vulgaris *L.* . . . . | — | 3 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Syringa vulgaris azurea pl. | — | 15 |
| — — Charlemagne . . | — | 6 |
| — — Croix de Brachy . | — | 15 |
| — — de Marly . . . | — | 10 |
| — — Eckenholm . . | — | 10 |
| — — fl. pleno . . . | — | 8 |
| — — gigantea de Marly . | — | 15 |
| — — grandiflora . . | — | 8 |
| — — insignis rubra . . | — | 15 |
| — — Liberty . . . | — | 15 |
| — — Marly blanc . . | — | 6 |
| — — pallida . . . . | — | 8 |
| — — spectabilis . . | — | 6 |
| — — Versaliensis . . | — | 6 |
| — — virginalis (alba major) | — | 6 |
| *Tamarix africana *Desf.* . | — | 6 |
| — caspica . . . . . | — | 6 |
| b — germanica *Scop.* (Myricaria *Desf.*) . . . . | — | 4 |
| b — indica *W.* . . . . | — | 5 |
| — libanotica *Lodd.* . . | — | 8 |
| — parviflora *D. C.* (tetrandra var. brevifolia *Gris.*) . | — | 10 |
| sbTecoma Benthami . . | — | 5 |
| b — grandiflora *Sw.* . . . | — | 5 |
| sb — radicans *Juss.* v. flammea | — | 5 |
| sb — — flava speciosa . . | — | 5 |
| sb — — humilis . . . | — | 5 |
| sb — — sanguinea praecox . | — | 5 |
| sb — punicea . . . . . | — | 5 |
| Tilia argentea *Desf.* (alba *W. & K.* var. pendula) . . | — | 20 |
| — dasystyla *Stev.* . . | — | 15 |
| — europaea grandifolia . | — | 15 |
| — — *L.* fol. var. . . | — | 8 |
| — macrophylla argentea . | — | 12 |
| — nigra *Borkh.?* v. longidentata | — | 10 |
| — pendula *Hort.* . . | — | 20 |
| — pubescens *Ait.* 3jähr. . . | | 3 |
| *b* Ulmus antarctica *Hort.* (gracilis *Hort.*) . . . . | — | 10 |
| — americana pendula . | — | 8 |
| — betuloides *Hort.* . . | — | 8 |
| b — campestris *L.* fol. var. | — | 8 |
| — corylifolia *Hort.* (montana *Pursh.* var.) . . . | — | 8 |
| — Dampieri . . . . | — | 8 |
| — effusa *W.* 2jähr. . . | — | 2 |
| — — crispa . . . . | — | 10 |
| — — cucullata . . . . | — | 8 |
| — fulva *Mx.* (scabra *Hort.*) | — | 8 |
| — — gigantea . . . . | — | 8 |
| — gracilis *Hort.* fol. arg. var. | — | 10 |
| — intermedia . . . . | — | 8 |
| — oxoniensis *Hort.* . . | — | 8 |
| — purpurea *Hort.* . . | — | 10 |
| — rugosa *Lodd.* . . | — | 8 |
| bUlex europaeus *L.* verlangt trocknen Standort . . | — | 5 |
| Vaccinium formosum *Andrew.* | — | 10 |
| — amoenum *Ait.* . . | — | 20 |
| Viburnum dentatum *L.* . | — | 5 |
| — Lantana *L.* . . | — | 5 |
| — Lentago *L.* fol. marg. | — | 8 |
| *V—macrophyllum . . | — | 15 |
| — Opulus *L.* * . . . . | — | 5 |
| — Oxycocos *Pursh.* . | — | 8 |
| Beeren essbar. | | |
| *Vietex Agnus Castus *L.* . | — | 5 |
| Virgilia lutea *Mx.* (Cladrastis tinctoria *Raf.*) . . | — | 25 |

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Vitis odoratissima *Don.* (riparia *Mx.*) | | 25 |
| — quinquefolia *Lam.* (Ampelopsis hederacea *L.*) | — | 5 |
| Weigelia (Diervilla) amabilis *Planch.* | | 5 |
| — fol. varieg. | — | 20 |
| Als brillant abgebildet und beschrieb. | | |
| — flore albo | — | 20 |
| — hybrida | — | 8 |
| b — intermedia *Hort.* | — | 8 |
| b — Middendorfiana *Rgl.* (Calyptrostigma *Traut. & M.*) | — | 15 |
| Weigelia rosea *Lindl.* | — | 5-10 |
| b — splendens *Hrt.* (Diervilla *Hort.*) | | 5 |
| — — lutea *Pursh. Hrt.* (Diervilla *Pursh.*) | | 5 |

Herrliche Sträucher, für jeden Garten passend, sie halten starken Frost aus, blühen sehr dankbar und präsentiren sich in Weiss bis zum dunklen Roth und Gelb.

| | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|
| Xanthoxylon fraxineum *W.* | — | 8 |

# Obstbäume & Fruchtsträucher.

## A) Aepfel.

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 10 Ngr. — Niederstämme 5 Ngr.

**Bezeichnung: * bed. Tafelobst, ** 1. Ranges; — † Wirthschaftsobst, †† 1. Ranges.**

| Nr. | Sorte | Reifzeit. | Dauer. |
|---|---|---|---|
| 59 | Astrag. Somm.-Apf.*† | Aug. | Oct. |
| 17 | Admirable, Kew.*†† | Dec. | Somm. |
| 53 | Allant-Apfel | Nov. | März |
| 141 | Barbe blanch | | |
| 15 | Blutapfel *†† | Nov. | Frühj. |
| 131 | Borsdf. Mng. Zwieb.**† | Dec. | Frühj. |
| 137 | — rother, **†† | Dec. | Frühj. |
| 25 | Cardinal, blutrother,*† | Dec. | Febr. |
| 148 | — französ. * | | |
| 97 | Calville, Bastard, * | | |
| 87 | — echte rth. Wint.**†† | Dec. | Frühj. |
| 32 | — gestr glb.Herbst**† | Oct. | Nov. |
| 51 | — Georg | | |
| 82 | — Koenings *†† | Dec. | Frühj. |
| 65 | — Norman. Wint.**† | - | - |
| 41 | — Stern †† | - | - |
| 58 | Citron, gelb. Wint.*† | Sept. | - |
| 122 | Etiquette | | |
| 62 | Delic. v.Montbijou**†† | Jan. | März |
| 129 | Edler Apfel, gelber | | |
| 81 | — franz. Prinz-Apf.*†† | Dec. | Somm. |
| 69 | Edelkönig **†† | Sept. | Dec. |
| 75 | Engels-Apfel | | |
| 98 | Erdb.Apf. Schlesw.**† | Sept. | Oct. |
| 108 | Fenchel-Apfel, rth.**† | Oct. | Dec. |
| 143 | Franz Graf v. Egers | | |
| 150 | Gloria Mundi †† | Nov. | Frühj. |
| 43 | Gravensteiner **†† | Oct. | April |
| 51 | Gülderling franz. *†† | Dec. | Frühj |
| 53 | — langer grüner †* | Jan. | Mai |
| 102 | — Hossfeld's †† | Nov. | März |
| 89 | Haus-Apfel, gestreifter | | |
| 22 | Himbeer-Apfel, Mueschhaupts, gestr. ** | Nov. | Dec. |
| 29 | Imperial †† | Dec. | März |
| 113 | Joseph II. | | |
| 60 | Kais. Alex. v. Russl.*†† | Dec. | März |
| 73 | Karthäuser, glb. Wint.*†† | - | Frühj. |
| 72 | Kastanienapfel, gr. gestr. | | |
| 83 | Kurzstiel, grauer†† | Nov. | März |
| 94 | — königl. rth. **†† | Dec. | März |
| 20 | — neuer Brüss.*† | - | Somm. |
| 54 | Langdauernder Apfel | | |
| 121 | Luicken-Apfel †† | Oct. | Dec. |

| Nr. | Sorte | Reifzeit. | Dauer. |
|---|---|---|---|
| 52 | Mariage - *†† | Dec. | Frühj. |
| 6 | Martins - †* | Aug. | Sept. |
| 124 | Maat - braun.†† | Dec. | Somm. |
| 24 | Meklenb. - gelber*†† | - | März |
| 139 | Metzger - weisser | | |
| 34 | Milchapf. Braunschw.†† | Dec. | März |
| 63 | Mütz Apfel | | |
| 126 | Naphaeuser, süsser | | |
| 18 | Nonp. Braddik's**† | Nov. | Frühj. |
| 46 | — englische** | | |
| 13 | — neue engl. gr.*†† | Dec. | Frühj. |
| 144 | — Fairs*† | Nov. | Jan. |
| 103 | — Ross*† | - | März |
| 145 | Nordfolk Storing** | - | Decb. |
| 14 | Nativia Possarts† | Nov. | Jan. |
| 7 | Pearmain, Barcel.**†† | Dec. | Somm. |
| 120 | — engl. scharlr.**† | Oct. | Nov. |
| 133 | — Loa's*** | Jan. | Somm. |
| 142 | Pepp. Blenh. *† | Nov. | März |
| 11 | — Dowtons*† | Dec. | Frühj. |
| 49 | — Gold †† | Nov. | März |
| 81 | — marmor. **†† | Sept. | Nov. |
| 96 | — — Sommer ** | - | Oct. |
| 123 | — Monstreuse | | |
| 127 | — spanischer | | |
| 40 | — Walliser Limonen * | Dec. | Frühj. |
| 136 | Pilgrim, grss. rth. | | |
| 146 | Pomme de Lettre | | |
| 117 | — Poir, wahrer birnförm. | | |
| 19 | Prinzess. Aug. Geig.*† | Dec. | Somm. |
| 44 | Probstei-Apfel *†* | - | Febr. |
| 111 | Quarredon | | |
| 45 | Rambour, engl. Prcht.**†† | Spt. | Oct. |
| 64 | — reinettenart. **†† | Nov. | Frühj. |
| 56 | — roth. Wint. *†† | Dec. | März |
| 48 | Reinette Annan.**†† | Nov. | Somm. |
| 23 | — Bischoffs ** | Nov. | Frühj. |
| 119 | — Carmeliter**†† | Nov. | Frühj. |
| 61 | — Champagner*†† | - | Somm. |
| 188 | — Chartaeuser | | |
| 1 | — Crede's Quitt.**†† | Nov. | Frühj. |
| 16 | — de Versaille*† | Dec. | Somm. |
| 4 | — Diels*†† | | |

| Nr. | Sorte | Reifzeit. | Dauer. |
|---|---|---|---|
| 39 | Reinette franz. Edel.*†† | | |
| 118 | — — Quitten *†† | Nov. | Somm. |
| 3 | — Gaesdonker's *†† | Dec. | Frühj. |
| 93 | — gold.** | Dec. | März |
| 50 | — goldg. Sommer*†† | Sep. | Oct. |
| 9 | — gold. v. Mons†† | Nov. | Feb. |
| 67 | — gestr. Herbst† | Dec. | Somm. |
| 135 | — gr- Casseler**†† | März | Aug. |
| 90 | — Honig*†† | Dec. | Frühj. |
| 42 | — Kronen**†† | Nov. | - |
| 37 | — Muscat**†† | Jan. | Somm. |
| 10 | — Nonpareil**† | Dec. | - |
| 71 | — rth. Leder** | - | März |
| 149 | — - Meininger* | | |
| 70 | — schw. Blut* | | |
| 132 | — van der Lans gold* | | |
| 2 | — von Breda** | Dec. | März |
| 134 | — - Auvergne* | | |
| 76 | — - Canada**†† | - | Juni |
| 107 | — - Damason** | Oct. | Jan. |
| 104 | — - Siegruds | | |
| 128 | — Wellington*†* | Januar | Somm. |
| 28 | — Wyllins glb.*†† | Nov. | Frühj. |
| 99 | Ros. Aepf. Bendleb.**†† | - | Feb. |
| 36 | Ros. Apfel holländischer doppelt†† | | |
| 35 | — Sophiens süsser*†* | Nov. | Frühj. |
| 130 | Seidenhemdchen*†† | Dec. | Feb. |
| 110 | Rosm. Apf. Dorrel's** | | Febr. |
| 30 | Siebenschl. grüner | | |
| 101 | Spitz Apfel. Müllers | | |
| 55 | Stettiner. gold* | | |
| 125 | - wahr. glb. Winter†* | Dec. | Somm. |
| 72 | Streifl. echt. Wint.†† | Nov. | März |
| 106 | - rth. 3 Jahr dauernder†† | | |
| 114 | - Siegels edler Winter | | |
| 95 | Strich Apf., wss. Somm.† | Aug. | Sept. |
| 147 | Süss Apfel, glatter | | |
| 115 | - - von Seba | | |
| 47 | Sehr grss. schön u. bald tragender. | | |
| 5 | Taubling, Crede's blutrother Winter*†† | Nov. | Frühj. |
| 26 | Vater Apfel*†† | - | Jan. |
| 57 | Veilch. Apfel, Somm.*† | Sept. | Oct. |
| 12 | Venetianer | | |
| 109 | Weinquartling | | |
| 112 | Wie's Liebling | | |
| 91 | Winterfleiner gr. *†† | Dec. | März |
| 116 | Zwieb. Apfel, br.†† | Nov. | Frühj. |

## B) **Birnen.**

Hochstämme à Stück 12 Ngr. Niederstämme 6 Ngr.

| Nr. | Sorte | Reifzeit. | Dauer. |
|---|---|---|---|
| 129 | Ah, mon dieu, ou Poire d'Amour. Liebesbirne roth punktirt †* | Septemb. | |
| 133 | Argensons Birne* | Nov. | Dec. |
| 125 | Ahrenthals, grüne Herbst | October | |
| 157 | Beaumont. | | |
| 178 | Belle Alliance *†† | Dec. | — |
| 179 | — Angevine †† ausserordentlich gross. | - | — |
| 180 | — Sam period. | | |
| 146 | Bergamotte Crassane**† | Oct. | Dec. |
| 139 | — d'Aleneon. | | |
| 119 | — frühe Schweizer | Aug. | Sept. |
| 118 | — grüne lange Schweizer | Oct. | Jan. |
| 122 | — späte Schweizer *†† | - | - |
| 185 | — Mayii | | |
| 177 | — Sageret ** | Dec. | April |
| 120 | — Sonnlers †† | Feb. | März |
| 182 | Beurre Bretonneau *†† | Jan. | - |
| 183 | — Diehl *†† | Nov. | Jan. |
| 184 | — Hertrich. | | |
| 165 | — rouge d'automne. | | |
| 186 | Bezy de Chaumontel †† | Nov. | - |
| 162 | — de la Motte †† | Oct. | — |
| 137 | — — Montigny †† | — | — |
| 181 | Bon William's ** | Aug. | Sept. |
| 148 | Butterbirne, Coloma's Herbst **† | - | 3 Wch. |
| 152 | — Haffner's * | Oct. | Dec. |
| 101 | — rothe Herbst **† | Oct. | — |
| 187 | Caldam le grosa. | | |
| 189 | Colmars d'Aremberg Kartoffelbirne *†† | - | Nov. |
| 188 | Comeclur de la coeur. Carmeliterbirne. | | |
| 116 | Dechantsbirne. | | |
| 153 | — Frühlings. | | |
| 163 | — grüne. | | |
| 176 | — Winter. **† | Dec. | März |
| 190 | Delice d'Hartempont **† | Nov. | Dec. |
| 191 | Doyenni d'hiver ** | - | Jan. |
| 169 | d'Zoutmann. | | |
| 126 | Eierbirne. Sommer ††† | Sept. | — |
| 160 | Epargne, fürstliche Tafel** | Juli | Aug. |
| 103 | Forellenbirne ** | Nov. | Jan. |
| 123 | Franchipanne Sommer *† | Oct. | — |
| 142 | Gracieuse †† | Nov. | Jan. |
| 192 | Gorman panache. | | |
| 175 | Grumkower, Winter **† | - | März |
| 138 | Hardenpont's Colmars. | | |
| 121 | — Leckerbissen **† | - | — |
| 159 | Herbstbirne, mit ganz dünner Schale. | | |
| 171 | König von Würtemberg. | | |
| 164 | Kronprinz Ferdinand v. Oestreich **† | Dec. | März |
| 141 | Johannisbirne * | Juli | — |
| 150 | La bonne Louise † | Oct. | — |
| 149 | L'Espagne. | | |
| 124 | Margarethenbirne, frühe*† | Aug. | — |
| 170 | Mandelbirne. | | |
| 193 | Milan blanch. | | |
| 136 | Muscateller, grüne. | | |
| 194 | Napoleon, Napoleons gute Christbirne ** | Oct. | Nov. |
| 128 | Nelis, Winterbirne **† | Dec. | — |
| 173 | Poire Fortunée **†† (Berg P. Fort.) | Jan. | Aug. |
| 195 | — da cure ** (bouteille) | Sept. | — |
| 158 | Prinzessin Marianne **† | Nov. | — |
| 137 | Rettigbirne, Leipziger | Oct. | Nov |
| 127 | — rothe | - | - |
| 130 | Rousselet. | | |
| 131 | — de Rheims **† | Sept. | Oct. |
| 174 | Sabine d'hyver ** | Dec. | Jan. |
| 162 | Schmalzbirne von Marums. | | |
| 172 | Schwaneneibirne. | | |
| 154 | Winterbirne, Coloma's köstliche **† | Dec. | Jan. |
| 135 | — Erzherzog Karl. | | |
| 140 | Zuckerbirne grüne Herbst **† | Nov. | Dec. |

## C) Kirschen.

Hochstämme à Stück 10 Ngr. Niederstämme auf Mahaleb $7^1/_2$ Ngr.

A. Anfang. E. Ende. M. Mitte.

Amarelle, frühe königliche
— kleine
— — frühe
— rothe
— süsse
— Trauben od. Bouquet (*Rubens*) Juli
3-5, an älteren Bäumen oft bis 10 Kirschen an einem Stiele bald und stark tragbar.
Allerheiligenk. Aug. Oct.
Angleterre tardive Juli
Belle Audigevis (d'Angleterre)
Bigarreau Malacord neu
— de Montmorency
Big. sind bunte Herzk.
Bettenburger Kirsche von der Natte Juli
Cerise à gros fruit rouge pâle
— à Trochets
Cerise Duchesse d'Angoulême
— du Nord
— Guigne noir de Russie
— hâtive.
— Juinat.
— la belle magnifique.
Czerechy.
Dauphine.
de Chatenay (d'Espagel, d'Agencerise deSpa.) Aug.
Doctorkirsche.
Englische wahre.
Flamentiner, frühst.M.Juni
— neue früheste A. Juni
Flemische M. Juli
Folgerk. süs. Weichs.
Forellenk. schwarze
Frühk. span. schw. M. Juni
Glanzkirsche, rothe.
Glask. Braunauer, E. Jun.
Gobet, gr. Amar. (Excell.-
Portugaise à conetqueue, portug. extra) Juli
Griotte la gros.
Grottier à. Paris Aug.
Herzk. sp.† Maulb. E. Juli
— schw. *Brodans.*
Isar Kiras.
Jerusal.(Pyr.Wchs.)M.Aug.
Knorpelk., gr. w. M. Juli
— purpurrothe A. Juli
— Winkler,s schw. Juli
Lothkirsche A.Aug.
Muscateller, Prager M.Juni
Nonnenk. grosse E.Juli
Nouvelle Royal A.Juli
Ostheimer Weichsel
Perlk. bunte Herzk. E.Juli
Pleureux, häng. Trauerk.
Pommeranzenk. glatte Glaskirsche M.Juli
Schöne v. Choisy A.Juli
Steinhäusers, Säml. M.Juli
Weichsel, span. M.Juni

## D) Pflaumen.

Abgebbar Herbst, à Stück 12 Ngr.

Admiral Rigny E. Aug.
Apric.Pfl. Braun. n. E. Aug.
— — Dörells n. E. Aug.
Belle Agathe.
Downtons Kaiserin.
Eierpfl. blau ung. gr. E. Spt.
— gelbe A. Sept.
Frühe schwarze.
Goliath.
Imperatrice, enorm gr.
Mirabelle v. Biebrich.
New red Orleans E. Aug.
Peters gr. glb. s. ss. M Sept.
Transparent, drchs. E. Aug.
Reineclaude, echt gr.A.Spt.
— Aloyse.
— de Bavay *Trayl.* M.Oct.
Grösse d. Walln. grün späterbl.
— grosse grüne
— violette M. Sept.
Unvergleichliche Oct.
Waterloo-Pflaume
White (soll gz. weissfr. s.)
Zwetsche, Anan. s.gr.E.Juli
— Dörells neue gr.A.Spt.
— englische grosse
— Felsenberger
— ital. grüne M.Sept.
— Leipz. grosse
— ungarische.

## E) Weinreben.

Gut bewurzelte Senker à Stck. $7^1/_2$-15 Ngr. — † bed. frühst. Sorten.

Burgunder, weisser (Morillon blanc) E.Sept.
Calabreser Sept.
Captraube
†Gutedel (Perltr. Diamant) A.Sept.
Gutedel, roth. (roth Junker, Krachmost) A.Oct.
Jacobstr. (fr Clawner) Aug.
Liverdon Oct.
Margarethentraube Sept.
Muscateller, brauner E.Spt.
Muscatell.(Ssfähnl.) E.Spt.
Orastraube (aus Zell)
Riesling(Gewztr.)best. Spt.
Süssfärber
Tokayer E.Aug.
Ysabelle.

## F) Haselnüsse.

| | Ngr. |
|---|---|
| Aveline blanche, w. lange Lamperts | 10 |
| — rouge, rth. l. Lamp. | 10 |
| — espagnole . | 10 |
| Baas, Nuss m. blass. Kern | 10 |
| Barceloner . . | 12 |
| — eckige . . | 12 |
| Bond Nut, grossfr. | 6 |
| Cob Nut, s. grfr. Lmbtn. | 6 |
| Downstonslong Nut | 8 |
| Frizzletslong Nut . | 10 |
| Géant de Halle . | 10 |
| Gnom . . . . | 8 |
| Lambertsnuss, rothe | 6 |
| Mère de Bolwiller | 20 |
| Merveille de Bolwiller | 20 |
| Monstreuse de Luxembourg . . | 6 |
| Spanische Nuss . | 25 |
| Zellernuss, ital. grosse | 5 |
| Haselnuss, gewöhnl. | 3 |

# G) Stachelbeeren.

Grossfrüchtige englische, à Stück 3 Ngr.

76 Achilles Jared's.
26 Buerdsill's seedling.
50 Bunckers Hill Cappers.
142 Emperor.
63 Esmeralda Leighs.
144 Everlasting.
45 Farmers Glory Berrys.
4 Globe yellow.
55 Glory of Radkliff Allens.
137 Green yellow seedling.
112 — Willow Johnsons.
6 High Sheriff Perths.
224 Jolly anglers.
59 — Farmer.
13 Jolly printer.
12 Legs Britannia red.
19 Lord Douglas.
10 Maid of the mill Stringlers
93 Nettle green Hopleys.
158 Primrose Unsworth.
1 Queens seedling.
95 Ramsay seedling.
75 Red Beaumont.
88 — Warrington.
67 Rob. - Roi.
60 Sampson Cromptons.
190 Smiling Beauty Beaumonth yellow.
209 Smolensko.
138 Sparklet Knight's.
115 Sportsman Chadwecks.
212 Sproffons Goliath.
129 Thrasher white Peat's.
46 Toxhanter.
37 Victory.
111 Yellow seedling.
9 — Willow Bells
153 — — Kerhar's.
169 Zuccarina.

# H) Johannisbeeren.

Gertrude 6 Ngr.
Rosa, holländer 5 -
Rothe holländische 5 Ngr.
Schwarze buntbl. 6 -
Schwarze gelbfr. 5 Ngr.
— Victoria 4 -

# I) Erdbeeren.

Diese neueren und neuesten Erzeugnisse sind meist durch Ausstellungen gekrönte, daher man wohl auf deren Vorzüglichkeit bauen kann.

Neue, à Stück 3 Ngr.

Amazone.
Auguste van Geert.
Belle Bordelaine.
Burr's Scotia.
Black Prince.
Caroline superba, *Rittby.*
Capitain Cook, *Nicholson.*
Chili.
Coronation.
Goliath, *Rittley.*
Helena Jamin.
Imperatrice Eugenie.
Jucunda, *Salter.*
La Reine, *De Jonghe*
La Perle.
Le Baron, amer. Sorte.
Lucie.
Frag. lucida.
Mammouth.
Marqu. de Latour Maubourg.
Monatserdbeere, *Nietners.*
— weisse.
Monstreuse de Reine.
— de Robine.
Muscadin de Miège, *Lorw.*
Nanette.
Non plus ultra, *De Jonghe.*
Nimrod.
Princesse Royale, *Pelv.*
Psyche.
Ruby.
Sir Harry.
The Adair.
Triomphe.
Unique.
Vicomte Haricart de Thury.
Victoria, *Trollope.*
Virginiana.
Williams.
Wonderful.

Neuere à Stück 4 Ngr.

Bonté de St. Julien.
Charles Napier, *Shille.*
Chili Orange.
Duc de Malakoff, *Cloede.*
Eilisa Campin.
Exhibition, *Nicholson.*
Improved black Prince. *Togne.*
La constante.
La grosse Sucrée.
L'imperiale.
L'incomparable, *Blake.*
May Queen.
Mistresse Dr. Neilson, *Steward & Neilson.*
Prince Imperiale, *Graindorgex.*
Princ of Wales, *Steward & Neilson.*
Prince of Wales, *Togne.*
Rival Queen, *Tiley.*
Souvenir d' Emilie.

Neueste à Stück 5 Ngr.

Beauty of England.
Brigthon Pine.
Goire St. Genis immertr.
General Havelock, *Tiley.*
La constante, *De Jonghe.*
Mistresse Neilson, *St. & N.*
Oskar.
Perr's Scottia.
Princesse Fred. William.
Psyche.
Rubi.
Scott's Seedling.
Witzard of the North.

# K) Himbeeren.

| | Ngr. |
|---|---|
| Belle de Fontenay | 4 |
| Blanche de Cockson | 10 |
| Cassis à feuilles panachés dorés | 5 |
| Falstolf, eine der reichsttragenden | 2 |

| | Ngr. | | Ngr. | | Ngr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Holländische, rothe | 5 | Panachée dorrée | 5 | Blanche de Rochier | 5 |
| Hornet, sehr gross | 4 | Prince Napoleon | 5 | Antwerpener, gelbe | 4 |
| Lemercier, aus Belgien | 4 | Schwarze | 3 | Miracle de quatre saisons | 4 |
| Monats ohne Ranken | 4 | Falstolf Queen Victoria | 7 | Quatre saisons rouge | 4 |

# Kartoffel-Sortiment.

Bei der ungemeinen Wichtigkeit derselben, sammelte seit mehreren Jahren die erprobtesten, vorzüglichsten Sorten, und bin in den Stand gesetzt, von den meisten derselben hinlänglich Samenknollen ablassen zu können.

à Pfund berechne durchschnittlich à 1—2 Ngr. 5 Pfund 4—8 Ngr.

31 Algier-Kartoffel.
22 Bayrische Bauer-Jacobi.
16 Belgische Warry
25 Bisquit-Kartoff., Hamb., wohlschm.
27 — — ovalförm. sehr gut.
29 — runde steinschalige.
54 Blaue holländische.
33 Bunte Morgenrock.
11 Butter-Kartoffel, neue grosse.
4 Champignon, späte, erstaun. reichtr.
12b — späte volltragende.
33 De los Intermedo's
40 Deutsche echte sp. (auch Frankf. gen.)
48 Echte Metz, Sechs-Wochen-Kart.
23 Englische frühe feine.
40 — — Treibk.
7 — ganz frühe mehlige.
30 — späte. sehr gute Speisekart.
3 Eschenblättrige Nierenkart.
37 Familien-Kartoffel.
38 Farinosa, ausgezeichnete ertragreiche und mehlige Sorte.
10 Frühe, rundart. od. mehlige.
44 Jacobs gelbe frühe.
6 Jacobs-Kartoffel. sehr früh.
32 James- — grosse.
44 Johannis— gelbe frühe.
1a — — — runde.
51 Juli-Riesen.
20 Kastanien frühe blaue.
52 Lange aus Californien.
35 Lima, allerf. mittelfr. s. erg. Kart.
19 Magdeburger, feinste frühe.
39 Mangoldwurzel. holländ.
21 Marzipan, sehr gut.
28 Niedrige rothe.
24a Nieren-Zwerg, Hamburger, z. Treib. jährlich zweim. Ernte à Pf. 5 Ngr.
3b *Mäuse-Kartoffel.
26 Ockels rothe Rio-Frio.
24b Oschersleb'ner, frühe rothe rund.
2b Pfundkartoffel, grosse sehr fr. ergieb.
15 Rocks bunte, (Richter'sche blaue.)
5 Sago-Kartoffel, neuseel. schwarze.
8 *Sechswochen-Kart, allerfr. s. feinsch.
14 — — — neue.
53 — — — runde.
2a — — — Treib-Kartoff.
14 *Schlesische Hübner's neueste Sml.
18 Trauben-Kart. früh. fein. vølltr. aus Dassur, ist ausserord. frühzeit.
12a Traubenartige, längl. weisse, extra.
9 Wachs-Kart. früh.
36 Zucker-Kart. holländische.
1b Zwerg-Treib-Kart. früheste gelbe.
13 Zwiebel-Kart. sächs., ist eine der vorzüglichsten Speisekart. die ich kenne, springen bis ins späte Frühjahr auf, und beh. d. feinst. Geschm.
41 Rummel, 45 —, 47 —, 48 —, 49 — } Diese Sorten wurden, wegen ihrer Vorzüge. wenn auch ohne Namen beibehalten.

24 Kartoffelsorten, die vorzüglichsten, à 5 Pfd. 2—4 Ngr.
Ausserdem besitze noch 100 Sorten, die erst erprobt und im nächsten Jahre die besten davon ausgeboten werden sollen.

# Engros-Preise.

## Warmhauspflanzen.

Nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis 50 Stück; und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen. nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein. Da wo doppelte Preise vorgemerkt sind; steht es frei, die Wahl auf bessere Sorten oder stärkere Exemplare zu beziehen.

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Acanthaceen in 12 Species | 2 | — |
| 100 | Achimenes, m. Nam., ältere Sort. trocken à starke Knollen | 2 | — |
| 100 | Achim.m.Nam.,neu.Srt. à stk.Kn. | 8 | — |
| 12 | — Chir.(Scher. mex.) tr. à st. K. | — | 15 |
| 12 | Aechmea . . . . . | 18 | — |

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 6 | Aechmea splendens . . | 6 | — |
| 12 | Adianthum à 12 Sorten . | 3 | — |
| 12 | Aeschynanthus. in 12 Sort. stark für Ampeln. . . . | 2 | — |
| 12 | Acorus gramineus . . | 1½-3 | — |
| 12 | Allamanda, div. Spec. . | 2 | — |
| 12 | Alloplectus in 6 Sorten . | 3 | — |
| 12 | Amaryllideen, 12 Spec. . | 4 | — |
| 12 | Amorphophallus bulbifer. | 3-6 | — |
| 12 | Ampelpflanzen in 6 Sorten | 1 | 20 |
| 12 | — in 12 Sorten . . | 2 | — |
| 12 | Anthurium in 12 Sorten . | 3 | — |
| 12 | Aphelandra . . . | 3 | — |
| 6 | Araliaceen in 6 div. Spec. | 3-12 | — |
| 12 | Ardisia crenulata. blühbar | 2-4 | — |
| 25-50 | Aroideen in 25-50 Sorten | 4-8 | — |
| 12 | — für Blattgr. im Freien | 2 | — |
| 12 | Aristolochia in div. Spec. r | 2 | — |
| 12 | Aspidium 6 bis 12 Sorten | 12-6 | — |
| 12 | — in 6—12 Sorten . . | 2-6 | — |
| 12 | Begonia neu. m. gez. Bl. Rex. | ½-2 | — |
| 12 | — neueste gezeichnete . | 4 | — |
| 12 | — grossblätt. u. s. bl. o. get. | 2 | — |
| 25 | — in 25 Sorten, wor. die neu. | 4 | — |
| 12 | Billbergia . . . | 2-10 | — |
| 12 | Blechnum in 6 Sorten . | 2 | — |
| 12 | Bromeliaceae in div. Gat. | 2-4 | — |
| 25 | — — — . . . . . | 3-6 | — |
| 12 | Brugmansia (Datura) in 5 S. | 3 | — |
| 12 | Calodracon, Charlwoodia. Cordyline, Dracaena . . | 4 | — |
| 12 | — Jacquini purp. var. klein | 2 | — |
| 12 | — heliconiaef. kl. u. grösser | 2-6 | — |
| 12 | Caladium buntblättrige . | 3-6 | — |
| 12 | Canna div. st. Knollen . | 2 | — |
| 12 | Charlwoodia congesta stark | 2 | — |
| 12 | Cheilanthes diverse . . | 2-4 | — |
| 12 | Chlorophytum Sternb. Als Amp.- & Postamentspfl. . . . | 2 | — |
| 12 | Cissus discolor . . | 1½ | — |
| 12 | Clerodendron div. spec. . | 3 | — |
| 12 | Convolvulus, Batatas, Ipomaea diverse spec. . . . | 1 | 15 |
| 12 | Coleus Blumei var. lacin. zu Freilandgruppen . . | 1 | 20 |
| 12 | Cordyline fragr. kl. u. grössere | 3 | 10 |
| 12 | — salicifolia . . . | 3 | — |
| 12 | Curculigo recurvata . . | 1-3 | — |
| 12 | Cyrtanthera . . . | 1 | 15 |
| 12 | Dichronema . . . | 3 | — |
| 12 | Dieffenbachia in 6 Sorten. | 3 | — |
| 12 | Dionaea muscipula. Fliegenfalle der Venus . . . | 3-12 | — |
| 100 | — — . . . . | 22-90 | — |

Da sie sich im Zimmer gut cultiviren so wird sie für Handelsgärtner in netten Töpfchen mit kleinen Glassglocken eine allerliebste Nipptischpflanze.

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Dioscorea alata et discolor k | 1 | 20 |
| 12 | Dracaena arborea, dicht belaubt | 3-6 | — |
| 6 | Echites div. spec. | 1 | 15 |
| 12 | Eranthemum diverse | 1 | 20 |
| 12 | Farrn in 12 Species fürs Warm- oder Kalthaus oder fürs freie Land | 2-4 | — |
| 50 | — in 30 Species, die selt. | 10 | — |
| 12 | Ferdinandia eminens zu Blg. | 4 | — |
| 12-24 | Ficus. in 12—24 schönen Sp. | 3-8 | — |
| 12 | Franciscea Hopeana . | 3½ | — |
| 12 | — 6 Sorten . . . | 8 | — |
| 12 | Gardenia radicans, bis zum Sommer mit Knospen . . | 3 | — |
| 12 | Gardenia radic. Halbst., veredel. mit Kronen und Knospen. . | 6 | — |
| 12 | Gesneria und Dircaea k . | 2 | 15 |
| 12 | Gloxinien, mit Namen k | 2 | — |
| 12 | Gloxinia erecta in 6 div. S. k | 3 | — |
| 12 | Gramineae und Cyperaceae Decorationspflanzen . | 2 | — |
| 12 | Hebeclinium ianthinum . | 2-4 | — |
| 12 | Heliconia, div. spec. . | 3 | — |
| 12 | Heliotropium div. hybr. . | 1-1½ | |
| 12 | Hexacentris div. . . | 2 | 10 |
| 12 | Hibiscus, div. . . . | 2 | — |
| 12 | — in 6 div. spec. . . | 1 | 20 |
| 12 | Hippeastrum robustum (Amaryllis Tettaui) . . . | 6-12 | — |
| 12 | — rutilum . . . | 3-6 | — |
| 12 | — solandriflorum (Amaryllis) | 3-10 | — |
| 12 | Hoya div. spec. r stark . | 2-4 | — |
| 12 | Hymenocallis exp. (Pancrat.) | 4-30 | — |
| 12 | Illicium div. spec. . . | 3-4 | — |
| 12 | Ipomoea & Convolvulus in 6 S. | 3-5 | — |
| 12 | Isoloma. Kohleria & Locheria i.K. | — | 24 |
| 12 | — — — in Pflanzen . | 2 | — |
| 12 | Isolepis prol. et pygm. Ampelpfl. | 1 | 6 |
| 12 | Jasminum Sambac, multfl. blhb. | 1 | 20 |
| 12 | — — flore pl. gef. blüh. | 3 | — |
| 12 | Inga Saman et pulcherrima | 4 | — |
| 12 | Justicia, 8 versch. Sorten . | 1 | 15 |
| 12 | Lantana, 12 div. Sorten . | 1 | 15 |
| 12 | Ludolphia glaucescens. Hübsch. dekoratives Gras . . | 2 | — |
| 6 | Mannettia. div, . . | — | 20 |
| 12 | Mikania, 3 S. zum Beranken | 2 | — |
| 12 | Maranta, div. . . . | 1⅔-6 | — |
| 12 | Nymphaea div. spec. st. Kn. und blühbar . . . | 6-12 | — |
| 12 | Orchideen. - - je nach Stke. oder Schönheit, blühbar | 12-24 | — |
| 50 | — — — . . . . | 40-80 | — |
| 12 | Pancratium, div. . . . | 8 | — |
| 12 | Palmen, div. 1 Fuss. hoch | 36 | — |
| 6 | — Areca rubra ältere . | 30 | — |
| 12 | — Attalea speciosa Smpflz. | 36-60 | — |
| 50 | — — — . . . | 130-200 | — |
| 12 | — Cocos butyracea . . | 48 | — |
| 25 | — — — . . . | 80 | — |
| 12 | — Desmoncus horridus Smpfl. | 48 | — |
| 6 | — Rhapis flabelliformis ält. | 6-18 | — |
| 12 | Passifloren, i. dv. spc. st. u. blb. | 2-3 | — |
| 30 | — 30 Sorten . . . | 5 | — |
| 12 | Pereskien div. . . . | 2 | — |
| 12 | Philodendron 12 Sorten . | 3 | — |
| 12 | Phyllanthus . . . . | 5 | — |
| 12 | Pitcairnia 6—12 Sorten . | 3-6 | — |
| 12 | Plumbago, div. spes. . . | 4 | — |
| 12 | Polygonum pictum. Zu Gruppen ins freie Land . . | 1 | 10 |
| 12 | Polypodium 6—12 Sorten | 2-4 | — |
| 12 | Pothos, 4 spec. . . . | 1 | 20 |
| 12 | Pteris in 6—12 Sorten . | 2-4 | — |
| 12 | Puya 6 Sorten . . . | 3 | — |
| 12 | Psidium 4 Sorten . . | 3 | — |
| 12 | Rondeletien . . . | 2 | — |
| 12 | Rivinia 4 Sorten . . | 1 | 10 |
| 12 | Ruellien, div. spec. blühbar | 1 | 15 |
| 12 | Russelia juncea klein . | 2 | — |
| 12 | Schistocarpha, Blattgruppen | 2 | — |
| 12 | Scitamineen, div. Gatt. . | 2-6 | — |
| 12 | Selaginella, i. 12 S. (Lycopod.) | 2 | — |
| 12 | Siphocampylus, d. sp. blühb. | 1 | 20 |

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Scindapsus in 3 sp. Vorzüglich zum Berank. v. Warmh. . | 4 | — |
| 12 | Solanum crenulatum. Vorzüglich schön für den Winter . | 3 | — |
| 6 | — in 6 spec. . . . | 8 | — |
| 12 | Thunbergien, dv. sp. r/ blüh. | 1 | — |
| 12 | Torenia asiatica et concolor | 1 | 20 |
| 12 | Tradescantia, div. spec. blüh. | 1 | — |
| 12 | Tydaea, neue in 12 div. Spec. | 1 | 15 |
| 12 | — neueste argentea . . | 2 | — |
| 12 | Urtica diverse grossbl. , | 4 | — |
| 12 | Verbessina zu Blattgr. . | 1 | 20 |
| 12 | Warmhauspfl. z, Blattgr. im Fr. | 3 | — |
| 100 | Warmhauspfl. in 100 S. blüh. | 10-20 | — |
| 100 | Warmhaus-Decorationspfl. | 16-24 | — |
| 12 | Warmhauspflanzen rankende | 2 | — |
| 12 | — bundblättrige . | 3 | — |
| 25 | — rankende . . | 3 | 29 |
| 12 | Wasserpflanzen div. schöne spec. für Bassins blühb. . . | 2-4 | — |
| 12 | — — — — für Zimmer-aquarien . . . . | 2 | — |
| 12 | Xanthosoma 8 Sorten . | 2 | — |
| 12 | Zephyranthes div. . , | 1 | 20 |
| 12 | officinelle und techn. f. Wmh. | 6 | — |

# Kalthauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Abutilon, div. spec. . . | 2 | — |
| 12 | Acacia 6—12 Sorten . . | 2-4 | — |
| 21 | Acacia Lophanta 1jähr. . | 1 | 10 |
| 12 | Amaryllis Beladonna . | 2 | — |
| 12 | Azalea indica in 12 S. busch. | 2 | — |
| 12 | — neueste in 12 Sorsen . | 6 | — |
| 12 | — ohne Namen, stark blühbar | 1 | 20 |
| 100 | — mit Namen, gute Sorten je nach Stärke. . . . | 10-14 | — |
| 12 | Bignonien. div. spec, 1—2 F. r | 1 | 20 |
| 12 | Biota in 5 Sort. stk. Pflanzen | 4 | — |
| 12 | Bouwardia neueste . . | 5 | — |
| 12 | Callitris u. Frenella 5 Sorten | 8 | — |
| 12 | Camellien m. N. wecht. $^1/_2$-1 F. | 2 | 15 |
| 100 | — — — $^1/_2$-1 F. in d. am Schlus. aufgezählten Sorten. . | 14 | — |
| 12 | — neue & neueste S. $^1/_2$-1 J . | 4 | — |
| 50 | — — — — — — — | 12 | — |
| 12 | Chrysanthemum, st. Bü. z. Th. f. | 2 | — |
| 12 | — Pompon starke Pflanzen | 2 | — |
| 12 | — Zwerge d. Zw. st. - | 2 | 15 |
| 12 | Citrus sinensis . . | 2-6 | — |
| 12-24 | Conif. in 12-24 div. spec, ält. | 4-8 | — |
| 12-24 | Coniferae neue u. neues. 12-24 Sorten . . . . . | 6-11 | — |
| 12 | Crassula var., 6 Sorten neues. | 2 | — |
| 12 | Cuphea, diverse spec. . f | 1 | 6 |
| 100 | Cupressus Knigthii & Lindleyi 3-4 Fuss hohe Marktpfanzen | 10-12 | — |
| 1000 | — — — 3-4 Fuss h. Mpfl. | 80-100 | — |
| 12 | — in 12 Sorten . . | 4-6 | — |
| 12 | Cytisus, Genista etc. . | 2 | — |
| 12 | Daphne letztj. Verpd. 5 Sorten | $2^1/_2$ | — |
| 12 | Diosma alba (Coleonema) | $1^1/_2$ | |
| 12 | Dolichos lignosus. Hübsche dankbar blühende Schlingpflanze | 2 | — |
| 12 | Echeveria in 6 Sorten . | 2 | — |
| 12 | Erica grac. & sparsa busch. Pfl. | $1^1/_2$ | — |
| 12 | Eugenia australis . . | 2-6 | — |
| 12 | — Ugni . . . . . | 3 | — |
| 12 | Eupatorium et Agerat. div. S. | 1 | 20 |
| 12 | Fuchsia, in 12 neuer. Sort. f | 1 | 6 |
| 100 | — ältere stark . . . | 6 | — |
| 100 | — neuere . . , , | 8 | — |
| 12 | Georginen, die neuesten und besten in Knollen s . | 1 | 10 |
| 100 | — die n. u. neuesten i. Knoll. | 10 | — |
| 12 | Gladiolus div. . . . . | — | 20 |
| 12 | Habrothamnus div. spec. | 1 | 15 |
| 12 | Ilex in 12 Sorten . , | 4-6 | — |
| 24 | Ilex $^1/_2$ bis $1^1/_2$ Fuss hohe Pfl. | 7-11 | — |
| 12 | Juniperus in 12 Sorten . | 4-8 | — |
| 12 | Leptospermum in 6 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | Libocedrus in 5 Sorten meist Fuss hoch und darüber . | 8 | — |
| 12 | Lysimachia atroprp. sehr empf. | 2 | — |
| 12 | Melaleuca, div. spec., äst. 1-2 F. | 1 | 20 |
| 12 | Metrosideros semperfl., 1-2 F. | 1 | 15 |
| 12 | Mikania senecioides st. Rankpflanze für freien Grund | 1 | 24 |
| 12 | Mitraria. coccinea , . | 1 | 20 |
| 12 | Myrtus. diverse . . | 1 | 6 |
| 12 | Pelargonium, ältere , . | 2 | — |
| 12 | — neuere und neueste . | 3 | — |
| 12 | — Scarlet neue. u. neueste | $1^1/_2$-3 | — |
| 12 | Petunien, neueste . . | 2 | — |
| 12 | Phygelius capensis zu Grupp. | 1 | — |
| 12 | Phyllocladus rhomboid. & trich. | 6 | — |
| 12 | Pinus, neue. mexikaner von Roezl. 12 div. Sorten . | 6 | — |
| 24 | — 24 — — . . . | 10 | — |
| 50 | — 50 — — dar. d. selt. | 24 | — |
| 12 | — Pinea 1j, in Töpfen | 2 | — |
| 12 | — — ohne Töpfe . . | 1 | — |
| 12 | Pittosporum Tobira , . | 2 | — |
| 12 | Podocarpus in 6 Sort. . | 6 | — |
| 12 | Poinciana Gilliesii . . | 2 | — |
| 12 | Polygala in 4 Sort. . . | 2 | 15 |
| 12 | Punica $^1/_2$ F. hoch in 5 S. | 4 | — |
| 12 | Rhododendron arboreum . | 5 | — |
| 12 | — Sikkim Himalaya, Assam et Bhotan . . . . . | 10 | — |
| 12 | Rosa semperflorens, Noisettiana et Thea, nur gute Sort. e . | 1 | 6 |
| 12 | — div. ohne Namen, uur gute Sorten, sehr stark. . . e | 1 | — |
| 12 | Rosen, rank., wie Banksiana, Noisett multiflora etc. . | 1 | 15 |
| 12 | Senecio Farfugium . . | 3 | — |
| 12 | Serissa foetida. Fussh. | 1 | 10 |
| 12 | Statice brassicaefolia . | 10-18 | — |
| 12 | Stylidium adnatum, Die Griffel der niedl. Bl. berührt, schnelln plötzlich zurück . , | 2 | — |
| 12 | Swainsonia in 5 Sort. . | 2 | 15 |
| 12 | Taxus in 6 Sort. . . | 3-4 | — |
| 12 | Thuja in 10 Sorten . . | 4 | — |
| 12 | Tropaeolum neueste , . | 1 | 20 |
| 12 | Verbenen in 12 Sort. . | 1 | — |
| 50 | — in 25 Sort. . . . | 3 | — |

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Veronica, dv. sp. neu. u. neuest. | 1 | 20 |
| 12 | Viburnum Tinus | 1 | 15 |
| 12 | — verschiedene | 3 | — |
| 6 | Xerotes longifolia ähnl. der Dracaena indivisa | 9 | — |
| 12 | Yucca aloifolia 1jährig | 2 | — |
| 12 | — recurva klein. | 8 | — |
| 12 | Zephyranthes candida | 1 | 14 |

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 100 | Kalthauspflanzen, blühbar, | 10-20 | — |
| 12 | Kalthaus-Rankpflanz. 12 Sort. | 2 | — |
| 12 | — — Blattpflanz. z. Auspflanz. in freien Grund | 3 | — |
| 12 | Succulente als Miniaturpflanzen in kleinen Töpfen | 1 | 20 |
| 12 | Techn. u. officin. Kalthauspfl. | 2-4 | — |

# Camellien,

à 100 Stück 14 Thaler.

Um öfteren Anfragen zu begegnen, welche Sorten bei obigem Preise gegeben werden, lasse ich hier die betreffenden Nummern folgen:

№ 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 23, 35, 40, 48, 60, 64, 69, 71, 77, 82, 90, 93, 95, 99, 101, 106, 112, 116, 122, 123, 130, 139, 140, 145, 149, 153, 158, 161, 162, 176, 177, 181, 186, 198, 199, 200, 210, 225, 230, 224, 242, 256, 257, 263, 272, 277, 278, 282, 288, 290, 293, 304, 306, 310, 311, 321, 336, 343, 349, 350, 357, 359, 362.

# Freiland-Pflanzen,

## A) Stauden

jedoch nur nach meiner Wahl.

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Aconitum in 6 Sorten | 1 | 6 |
| 12 | Adlumia, schöne Rankpfl. | 1 | — |
| 12 | Amaryllis formisissima (Sprekelia) | — | 24 |
| 12 | Anemone coronar. div. Farb. | 1 | 10 |
| 100 | — - dito | 8 | — |
| 12 | — in 6 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | — Hepatica div. Farb. | 1 | 15 |
| 100 | - - coerulea z. Einf. | 1 | 15 |
| 12 | Aquilegia in div. Sort. & Var | 1 | 10 |
| 12 | Aralia in 3 Sorten | 3 | — |
| 13 | Armeria in 6 Sorten z. Einf. | 1 | — |
| 12 | Aster in 12 Sorten | 1 | — |
| 12 | Bellis | — | 15 |
| 100 | — div. Sorten ohne N. | 3 | — |
| 12 | Bulboc. vernum. z. Treib. | — | 24 |
| 12 | Calystegia pubesc. fl. pl. | — | 15 |
| 12 | Campanula in 6 Sorten | — | 24 |
| 12 | Chelone in 5 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | Colchicum div. Sort. u. Farb. | 2 | — |
| 12 | Convallaria majalis, st. Keime | — | 12 |
| 12 | Cyclamen | — | 24-30 |
| 100 | — | 7 | — |
| 12 | Dianthus chinensis Hedewigii & giganteus versch. Frb. | 1 | — |
| 12 | Dielytra spectabilis | 1/2 1 | — |
| 100 | — | 3-6 | — |
| 12 | Drosera rotundifolia | 2 | — |
| 12 | Epimedium alpinum & purpureum, zu Einfassungen | 1 | — |
| | Vorzüglich zum Treiben. | | |
| 12 | — macranthum, z. Einfass. | 1 | — |
| 12 | — Musschianum | 1 | — |
| 12 | — in 8 Sorten | 1 | 10 |
| 12 | — Erythronium. in Töpf. blüht im Kalthause im Februar | 1 | — |

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Ferraria tigridia | — | 20 |
| 12 | Funkia in 6 Sorten | 1 | 20 |
| 12 | Galatella in 6 Sorten | 1 | — |
| 12 | Gentiana acaulis z. Einf. | 1 | 15 |
| | in Töpfen blühen sie schon im Febr. | | |
| 12 | — in 9 Sorten | 1 | 6 |
| 12 | Gypsophila in 5 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | Helianthus in 5 Sorten | 1 | 10 |
| 12 | Helleborus in 8 — | 3 | — |
| 12 | Heracleum in 6 — | 1 | — |
| 12 | Hieracium aurantiacum | — | 8 |
| 12 | Hoteia japon. | — | 20 |
| 12 | Iris in 12 Sorten | 1 | — |
| 12 | Lilium lancifolium | 2-6 | — |
| 12 | — (L. lancifl. ausgeschlss.) | 3 | — |
| 12 | Lobelia in 4 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | Lychnis in 6 Sorten | 1 | 20 |
| 12 | — — 10 — | 2 | — |
| 13 | Myosotis alpestris & alba | 1 | 15 |
| 12 | Omphalodes verna, z. Einf. | — | 15 |
| 12 | Orobus in 6 Sorten | 1 | 15 |
| 100 | Oxalis tetraphylla | — | 20 |
| 12 | Paeonia in 6 Sorten | 2 | — |
| 12 | — in 12 Sorten | 3 | — |
| 12 | Papaver in 6 Sorten | 1 | 15 |
| 12 | Pentstemon in 12 Sorten | 1 | 20 |
| 12 | — im Freien ausd. 8 Sorten | 1 | — |
| 12 | Phlox decussata in 12 Sorten | 1 | — |
| 24 | — — in 24 — | 2 | — |
| 12 | — neueste eigener Zucht | 3 | — |
| 24 | — do. d. ganze Sortiment | 8 | — |
| 12 | Pinguicula vulgaris | 1 | 20 |
| 12 | Polygonum Sieboldti | 1 | — |
| 12 | Potentilla in 12 Sorten | 1 | 6 |
| 24 | — in 24 Sorten | 3 | — |
| 24 | reptans fl. pl. | — | 20 |

| Stück. | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Primula diverse. . . | 1 | 6 |
| 12 | Pyrethrum in 8 Sorten , | 1 | 15 |
| 12 | — carn. & ros. gemischt | 1 | — |
| 12 | Ranunculus in 8 Sorten . | 1 | 15 |
| 12 | Rheum — 8 — . | 2 | 15 |
| 12 | Salvia in div. Species . | 1 | — |
| 12 | Saxifraga in 12 Sorten . | 1 | — |
| 11 | Sempervivum s Spec. . | 1 | 6 |
| 12 | Sedum in 8 Sorten . . | 1 | 15 |
| 12 | Spiraea diverse . . | 1 | 15 |
| 12 | Statice in 12 Sorten . · | 3 | — |
| 12 | Thalictrum .n 5 Sorten . | 1 | 15 |
| 12 | Trifolium repens nigrum . | — | 24 |
| | Schwarzer oder Trauerklee, hübsch zur Verzierung von Gräbern und hellblühenden Gruppen. | | |
| 12 | Trollius 5 Sorten . . | 1 | 15 |
| 12 | Tussilago in 4 S. . . | 1 | — |
| 12 | Umbilicus pendulinus . | 2 | — |

| Stück. | | Thll. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Veronica in 10 Sorten | 2 | — |
| 12 | Vinca in div. Sort. und Var. | 1 | — |
| 12 | Viola in "verschied. Sorten | 1 | — |
| 12 | — obliqua schön z. Einf. | — | 15 |
| 12 | Gräser in 8 Sorten . . | 2 | — |
| 12 | Einfassungsstauden. 12 Sorten | 1 | — |
| 12 | Buntblättrige in 12 Sorten | 2 | — |
| 12 | Felsen- und Alqenpfl., 12 Sort. | | |
| 24 | Alpenpfl. in 24 Sorten . | 4 | 20 |
| 100 | — 50 Sorten . . . | 16 | — |
| 12 | officinelle u. techn.. 12 Sort. | 1/2-1 1/2 | — |
| 12 | Rasenstauden in 12 Spec. | 2 | — |
| 12 | Rankstauden und Ampelpfl. | 1 | 15 |
| 12 | Frühlingsstauden, 12 Sorten | 1 | — |
| 12 | Sommerstauden, — — | 1 | — |
| 12 | Herbststauden — — | 1 | — |
| 50 | Stauden in 50 Sorten | 3 | 15 |
| 100 | Stauden in 100 — . , | 6 | — |

## B) Gehölze.

Mit Ausnahme einjähriger Sämlinge, sind alle hier aufgeführten Gehölze, nicht nur mehrmals verpflanzt, sondern auch gut bewurzelt.

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 1000 | Acer dasycarpum 2jähr. | 16 | — |
| 100 | - - 2 - | 2 | — |
| 12 | - Negundo, 6 Fuss hoch | 1 | 20 |
| 100 | - Pseudo-Platanus 6-8 F. h. | 8 | — |
| 100 | - - 3 Mal verpflanzt | 10 | — |
| 12 | - tartaricum 4 Fuss hoch | 2 | — |
| 100 | Aesculus Hipocast 1-2 F. h. | 2-3 | — |
| 12 | Ailanthus glandulosa . | 1 | — |
| 100 | - - 1jähr. . . | 1 | — |
| 60 | Alnus incana, 8 Fuss hoch | 6 | 20 |
| 12 | Amelanchier ovalis 1-2 F. h. | — | 25 |
| 12 | Andromeda polifol. m. Knosp. | 2 | — |
| 12 | — calyculata . . . | 1 | 20 |
| 12 | Aucuba latimaculata . | 2 | — |
| 100 | Azalea pontica. busch .blühb. | 12 | — |
| 100 | — — 2jährig . | 2 | — |
| 100 | Berberis vulgar. stark . | 4 | — |
| 12 | — immergrün, div. Sort. | 4 | — |
| 12 | Buxus, div. Var. . . | 1 | 20 |
| 100 | — sempervirens, kurze gedrung. g. bew. Büsche zu Einfass. | 4 | — |
| 12 | Calycanthus occidentalis . | 1 | 20 |
| 60 | Caragana arborescens, 3j. | 3 | 15 |
| 12 | Castanea vesca, 2 F. h. . | 1 | 20 |
| 12 | Catalpa syringaefol. 4 F. h. | 3 | — |
| 12 | Ceanothus americanus . | — | 20 |
| 100 | — Delilianus, 1j. . . | 1 | 10 |
| 12 | Cercis siliquastrum, 1j. . | — | 15 |
| 12 | Clematis azurea . . | 3 | — |
| 60 | Colutea arborescens, 6 F. h. | 6 | — |
| 12 | Coniferen in 10 Sort. . | 3 | — |
| 12 | Corylus Avellana atrop. welcht. | 4 | — |
| 12 | Crataegus coccinea, 6 F. h. | 2 | — |
| 12 | — melanocarpa, 6 F. h. | 3 | — |
| 12 | — monogyne pendula, 4 F. h. | 2 | — |
| 12-50 | Cytisus Laburnum , . | 2-5 | — |
| 12 | — nigricans . . . | 1 | — |
| 12 | Deutzia gracilis, 1j. . . | 1 | — |
| 60 | — scabra 1j. . . | 4 | 15 |
| 12 | Evonymus, div. . . . | 1 | 20 |
| 12 | Fraxinus in 12 Sort. . | 3 | — |
| 12 | Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia) 1-3j. . . | 4 | — |

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 60 | Gleditschia triacanthos, 3j, | 3 | — |
| 12 | Glycine chinensis . . | 3 | — |
| 12 | Hedera in 4-8 Sort. . . | 1 1/2-2 | — |
| 12 | Hibiscus syriacus, 1j. . | 1 | 10 |
| 12 | Hippophaë rhamnoides . | — | 20 |
| 60 | Juglans americana nigra, 3j. | 10 | — |
| 12 | — regia, 4j. . , . | 2 | — |
| 100 | — — — . . , | 12 | — |
| 12 | Juniperus Sabina z. nd. Grp. | 2 | — |
| 12 | — virginiana, 2j. 6 Zoll hoch | 1 | 20 |
| 12 | — — 3j. 3 Fuss h. . | 3 | — |
| 12 | Kalmia glauca, st. Bsch. m. Kn. | 2-4 | — |
| 12 | — latifolia, 2j. . . , | 6 | — |
| 12 | Kölreuteria paniculata , | 1 | — |
| 100 | — — . | 6 | — |
| 12 | Ligustrum fructu luteo, 1j. | — | 2 |
| 60 | — vulg., 1-3j. . . | 1 | 15 |
| 12 | — .— immergrüne | 2 | 15 |
| 12 | Liriodendron Tulipifera 1j. | 2 | — |
| 100 | — — . , | 12 | — |
| 60 | Lonicera canadensis, 3j. , | 2 | 20 |
| 100 | — nigra, 3j. , . | 6 | — |
| 12 | — tartarica, 3j. . | 6 | — |
| 12 | Mespilus Pyracantha . | 1 | 20 |
| 12 | Paeonia arborea . . | 12 | — |
| 12 | Philadelphus latifol. 1-3j. | 1 | — |
| 12 | — laxus, 1-8j. . . | 1 | — |
| 100 | Pinus Abies, 1j. . . | — | 8 |
| 100 | Pinus Abies 2jähr. verpfl. | — | 15 |
| 100 | - austriaca . . | — | 20 |
| 12 | - canadensis 3j. . | 1 | 20 |
| 60 | - Larix 6 F. hoch . | 10 | — |
| 100 | - maritima, 1-2j. . | 2 | — |
| 100 | - montana, 2j. . . | 2 | — |
| 12 | - nigra . . . | 3 | — |
| 100 | - Picea 1j. . . | — | 8 |
| 100 | - - 3j. verpfl. , | — | 15 |
| 12 | - Pinsapo 1j. . , | 1 | 20 |
| 12 | - Pumilio , . , | 3 | — |
| 12 | - Strobus . . . | — | 20 |
| 100 | - sylvestris 1j. . . | — | 10 |
| 100 | - - 2j. . . . | — | 20 |

| Stück | | Thlr. | Ngr. |
|---|---|---|---|
| 12 | Prunus floribunda. 1-3j. | — | 15 |
| 60 | - Mahalep. 2j. | 2 | 20 |
| 12 | - Padus rubra, 3j. stark. | 1 | — |
| 12 | - serotina, 3j. stark | 1 | 20 |
| 12 | - virginiaua | 1 | — |
| 12 | - - rubra | 1 | — |
| 12 | Ptelea trifoliata stark | 2-3 | — |
| 12 | Quercus palustris | 1 | 15 |
| 100 | Rhododendron pontic. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{2}$ F. | 5 | — |
| 12 | Rhus Cotinus | 2 | — |
| 12 | Ribes sanguineum | 2 | 12 |
| 12 | - - fl. pfl. | 3 | — |
| 12 | Robinia in 12 div. Sorten. | 3 | — |
| 12 | Salix Caprea bicolor | 1 | 10 |
| 12 | - laurifolia | 1 | 10 |
| 12 | - regalis | 1 | 15 |
| 60 | Sophora japonica 3j. | 6 | — |
| 1000 | Spartium scorparium stark. | 20 | — |
| 100 | - - | 2 | 10 |
| 12 | - - | — | 15 |
| 12 | Spiraea adianthifol. 1-3j. | 1 | 15 |
| 60 | - callosa, 2j. | 3 | — |
| 12 | - Douglasi, 4 F. hoch. | 1 | 10 |
| 12 | - flexuosa | 1 | 20 |
| 12 | - lancifolia | 1 | — |
| 12 | Spiraea rotundifolia | 1 | 15 |
| 12 | - salicifolia | — | 20 |
| 60 | - tomentosa 1-3j. | 4 | — |
| 12 | Symphoricarpus orbicul. fol. aur. 1jähr. | 1 | — |
| 12 | - racemosa, 1-3j. | — | 20 |
| 12 | Tecoma radicans in 6 verschiedenen Sorten, klein. | 1 | 20 |
| 12 | Ulex europaea fl. pl. | 1 | 15 |
| 12 | Ulmns, div. spec., stark | 2 | — |
| 12 | Vitis quinquefol. | 1 | — |
| 12 | Weigelia amabilis 1j. | 2 | — |
| 12 | - lutea | 1 | — |
| 12 | - rosea 1j. | 1 | 15 |
| 12 | - Yucca filamentosa | 3 | — |
| 50 | Zierbäume & Sträucher in 25 S. | 10 | — |
| 100 | Ziersträucher in den beliebtesten Sorten und mehrmals verpflanzten gut bewurzelten starken Exemplaren | 12 | — |
| 12 | Buntblättrige Gehölze | 3 | — |
| 12 | Rankende do. | 3 | — |
| 100 | Asparagus officinalis, 2jähr. (Spagelpfl.) | 3 | — |

## C) Stein-, Kern- & Beerenobst.

| Stück | | Thlr. |
|---|---|---|
| 60 | Apfel-Hochstämme | 16 |
| 60 | — Niederstämme | 8 |
| 60 | Birn-Hochstämme | 20 |
| 60 | — Niedersämme | 10 |
| 60 | Kirschen-Hochstämme | 16 |
| 60 | — Niederstämme a. Mahaleb. | 12 |
| 60 | Erdbeeren neue u. neueste | 1 |
| 100 | — gute Rummel | 1 |
| 12 | Stachelbeeren engl. grossfr. | 1 |
| 60 | Himbeeren | 3 |
| 100 | — gute Rummel | 3 |

# Rosenwildlinge.

| | |
|---|---|
| Kräftige Wald-Stämmch. von 3-6 Fuss à 100 Stück | 2-3 Thlr. |
| — — — — — - 1000 — | 10-20 — |
| 100 Sämlinge von Bleistiftstärke cca. 1-2 Fuss hoch | 20 Ngr. |
| 1000 — — — - 1-2 - — | 5 Thlr. |
| 100 — - 4 - — | $1\frac{1}{2}$ — |
| 1000 — - 4 - — | 10 — |

# Schiefer-Etiquetten.

Als ich im Vorjahre hiermit auftrat, hatte nur im Auge, den kleinen arbeitslosen Händen unsres Gebirg's einige Beschäftigung zu verschaffen, nicht ahnend, dass diese, schon an der Wiege dieses neuen Industriezweig's, nicht mehr auslangten! Diese Etiquetts haben nämlich bei deren Billigkeit und Dauer einen solchen Anklang gefunden, dass, um den Nachfragen genügen zu können, Maschinen verwendet werden mussten; dadurch wurde es aber auch möglich, die gangbarsten Topfetiquetts, welche mit der Hand gefertigt hoch zu stehen kamen, um die Hälfte im Preise zu ermässigen, so dass sie jetzt denen von Holz im Preise nahestehen. Schon wenden auch andere Firmen denselben ihre Aufmerksamkeit zu, was wir nur dankend anerkennen.

Nicht unerwähnt kann bleiben, dass, als das Unternehmen bekannter wurde, sich ein alter Blumenfreund meldete, der angab, er sei schon vor 25 Jahren von meinem Vater darauf aufmerksam gemacht worden, wie gut sich Schiefer zu Etiquetts eignen müsse, er habe auch nicht gezögert und könne heut noch solche, damals selbst gefertigte Etiquetts vorzeigen! Seitdem verarbeiten wir aber auch nur solchen Schiefer und können für dessen Haltbarkeit Garantie leisten. Wie unten zu ersehen ist, haben wir die Verwendbarkeit des Fabrikats auf Fussbodenplatten und sogenannte Fensterbreter ausgedehnt, und können alle diese Artikel mit gutem Gewissen empfehlen!

| No. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1) | 12-15 Zoll lang. | 3 Zoll breit | | 100 | Stück | 1 | Thlr. | — | Ngr. |
| - 2) | $3^1/_4$ - - | $2^1/_4$ - | - ov. | 100 | - | — | - | 16 | - |
| - 3) | $7^1/_2$ - - | $1^1/_4$ - | - | 100 | - | — | - | $5^1/_2$ | - |
| - 4) | $5^1/_2$ - - | 1 - | - | 100 | - | — | - | 5 | - |
| - 5) | 12 - - | 5 - | - | 100 | - | 1 | - | — | - |
| - 6) | die laufende Elle | . . | . | . | | — | - | $^2/_5$ | - |
| - 7) | der Quadrat-Fuss | . . | . | . | | — | - | 8 | - |
| - 8) | - - - | . . | . | . | | — | - | 5 | - |

## Erklärende Bemerkung.

No. 1) empfehlen sich zur Etiquettirung von Stauden u. Gehölzen im Freien, No. 2) als Anhänger für Bäume, zu welchem Behufe sie gelocht sind, No. 3) & 4) für Topfpflanzen; No 5) in 2 Farben gefertigt sind unübertrefflich zur Einfassung von Beeten etc. No. 6) desgleichen, sind besonders bei geradlinigen Einfassungen zu verwenden, sie haben 3 glatte Seiten, während die 4. eingegraben wird; zu deren Empfehlung hat man nur darauf hinzuweisen, dass die vergänglichste Einfassung, also die von Bretern das Doppelte kostet. No. 7) dienen zu freilaufenden Fensterbretern, bedürfen nur einer Eisenschiene als Unterlage und sind auf allen Seiten glatt gearbeitet, während No. 8) nur oben und an den Seiten glatt gearbeitet und als Fussbodenplatten verwendet werden. Jede beliebige Form wird nach Zeichnung gefertigt und nach obigem Verhältniss berechnet; runde Formen stellen sich jedoch fast doppelt so hoch als geradlinige.

## Bleidraht und Band.

Die Vorzüglichkeit beider Fabrikate beim Etiquettiren im Freien, auch bei Mutterpflanzen in den Häusern sind anerkannte Thatsachen. Da ich selbst viel davon verconsumire, bin ich im Stande, Draht & Band à Pfund mit 4 Ngr. zu belassen.

## Laub- & Moorerde, Torf.

Viele Klagen über ungeeignete Erden veranlassen mich, auch hierin meinen geehrten Geschäftsfreunden entgegen zu kommen, und so liefere ich Lauberde à Scheffel 15 Ngr., und Moorerde à Schffl. 10 Ngr. 100 Stück Torf mit Emballage 1 Thlr. — Die Versendung geschieht in Säcken als ordinäre Fracht. Neue Säcke werden zum kostenden Preise à 12 Ngr. berechnet.

## Garten- und Glashäuser-Anlagen

übernehmen wir zu den billigsten Sätzen, doch lässt sich vorher nichts Bestimmtes hierüber sagen, weil Geschmack und Ausdehnung zu verschieden sind.



# INDEX.

**Engros-Preise.**



## Druckfehler.

Auf S. 2. des Vorworts, Z. 6 v. o. nach Wassereinfall lies vom Feuer st. durchs.

Seite 3 Spalte 2 lies: Cyrtoceras statt Crytoceras.
- 32 - 2 - Trichopilia coccinea statt coccina.
- 65 - 1 - Actinostrobus statt Aetinostrobus.
- 84 - 1 - Calystegia statt Callistegia.
- 86 - 2 - Epilobium Dodonai st. Doponaei.
- 86 - 2 - Eurybia statt Furybia.
- 91 - 2 - Phlox decussata statt decusata.
- 94 - 2 - Siebbaldia cuneata statt cuneaia.
- 95 - 2 - Stipa splendens statt plendens.
- 95 - 2 - Thalictrum alpinum statt allinum.

Schnellpressendruck von C. A. Günther in Zwickau.